

ଉତ୍ତର - ଦେଶ ଓ ଦେଶବାସୀ



# ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ

ସାମ୍ବିତ ଅଲ୍ଲା ଓ ଲାଲ୍ ଫଟେଅଲ୍ଲା

Digitized by PPRACHIN, SOA

ଭାରତ—ଦେଶ ଓ ଦେଶବାସୀ

ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ



# ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ

ସାଲିମ୍ ଅଲୀ

ଓ

ଲୁଇଜ୍ ପଡ଼େଅଲୀ

ଅନୁବାଦ :

ବସନ୍ତକୁମାର ବେହେରା

ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ





1980 (ଶିକାର 1901)

© ମୂଳ ରଚନା ସାଲିମ୍ ଅଲୀ ଓ ଲଙ୍କର୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, 1967

ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ © ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆ 1980

•

ମୂଲ୍ୟ ଟ 18-25

### *COMMON BIRDS (Oriya)*

This book has been published on the paper made available  
by Government of India at concessional rates

•

•

ଡାଇରେକ୍ଟର, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆ, A-5 ଗ୍ରୀନ୍‌ପାର୍କ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ-110016  
କର୍ତ୍ତୃକ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ, କଟକ-753001 ଦ୍ଵାରା ବିଷୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ  
ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଓ୍ଵାର୍କସ୍, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଦ୍ଵାରା କର୍ତ୍ତୃକ-ମୁଦ୍ରିତ ।

## ସୂଚୀପତ୍ର

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ	1
ପକ୍ଷୀବିଜ୍ଞାନ ଓ ପକ୍ଷୀପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ	7
ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ	18
ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଦେଶାନ୍ତର ବାସ	24
ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ	31
1. ହଂସଭୂଳ (Little Grebe) ବା	
ପାଣିହଂସ (Dabchick) ...	31
2. ଦଦରାହଣୀ (Spotted belled or Grey Pelican) ...	33
3. ପାଣିକୁଆ (Darter) ...	34
4. କ୍ଷୁଦ୍ର କର୍ମୋରାଣ୍ଟ (Little Cormorant) ...	35
5. କାଣ୍ଡିଆ ବଗ (Grey Heron) ...	37
6. ଗୁଣୀ ବଗ (Small Egret) ...	38
7. ନନ୍ଦୀ ବଗ (Cattle Egret) ...	39
8. ପ୍ଲେଟ କାଣ୍ଡିଆ ବଗ (Pond Heron or	
Paddy Bird) ...	40
9. ଚିତ୍ରିତ କୌଞ୍ଚ (Painted Stork) ...	42
10. ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ବା କାଆଁସ (Openbilled Stork) ...	43
11. ହାତଗିଳା (Adjutant Stork) ...	44
12. କଳାବାଜେଣି (Black Ibis) ...	47
13. ଚୁମ୍ବରଦାତ (Spoonbill) ...	48
14. ଫ୍ଲାମିଂଗୋ (Flamingo) ...	50
15. ଖର ହଂସ (Barheaded Goose) ...	52

16. ଲୁହମ ପାଉଁଶ (Spotbill or Grey Duck)	...	53
17. ହୁସୁଲି (Lesser Whistling Teal)	...	55
18. ଅଙ୍କୁ (Cotton Teal)	...	56
19. ମାଟିଆ ଚଳ (Pariah Kite)	...	58
20. ଶଙ୍ଖଚଳ (Brahminy Kite)	...	59
21. ବାଳ (Shikra)	...	60
22. ରାବଣ ଚଢ଼େଇ (White-backed or Bengal Vulture)	...	61
23. ଗୋଠ କୁକୁଡ଼ା (White or Scavenger Vulture)	...	62
24. ଶାହନ (Shaheen Falcon)	...	63
25. ରୁରୁମୁଣ୍ଡ (Redheaded Merlin)	...	64
26. କଳାତୁରି (Black Partridge)	...	66
27. ଚିତ୍ତୁରି (Grey Partridge)	...	67
28. ଚନକ-ଚନା ପୁଣ୍ଡୁଳ (Black-breasted or Rain Quail)	...	68
29. ଗୁଣ୍ଡୁର (Jungle Bush Quail)	...	70
30. ଜଙ୍ଗଲ କୁକୁଡ଼ା (Grey Jungle Fowl)	...	71
31. ମୟୂର (Common Peafowl)	...	72
32. ସାରସ ପକ୍ଷୀ (Saras Crane)	...	74
33. ଡାହୁକ (White-breasted Waterhen)	...	76
34. କା' ଆମ (Purple Moorhen)	...	77
35. ହୁକୁନା (Great Indian Bustard)	...	79
36. କାଳି ଝିଲ୍ଲେଇ (Bronzewinged Jacana)	...	81
37. ଟେଣ୍ଡେଇ (Redwattled Lapwing)	...	82
38. ଚା' ଚଢ଼େଇ (Common Sandpiper)	...	84
39. ଲିଟଲ ରିଙ୍ଗେଡ଼ ପ୍ଲୋଭର (Little Ringed Plover)	...	85

40. ଶ୍ଵାମା ଚଢ଼େଇ (Stone Curlew or Goggle-eyed Plover) ...	86
41. ମାଛଖିଆ (Brownheaded Gull) ...	88
42. ଲୁହୁରୁହ (Indian Whiskered Tern) ...	90
43. ସାଧୁ ଚଢ଼େଇ (Common Sandgrouse) ...	92
44. ହରିଡ଼ ଚଢ଼େଇ (Common Green Pigeon) ...	93
45. ପାଞ୍ଜବତ (Blue Rock Pigeon) ...	94
46. କପୋତ (Spotted Dove) ଓ ଲାଲ କପୋତ (Red Turtle Dove) ...	95
47. ଚଢ଼ିଆ (Roseringed Parakeet) . ...	97
48. କୋଇଲି (Koel) ...	98
49. କୁମ୍ଭାଟୁଆ (Crow-Pheasant or Coucal) ...	100
50. ଶ୍ଵାପେଶୁ (Spotted Owlet) ...	102
51. କାଳପେଶୁ (Great Horned Owl) ...	103
52. ଭୂଇଁ ଗୁମ୍ଫା (Indian Nightjar) ...	104
53. ଗୃହଶୁଭକ (House Swift) ...	106
54. ଗୋଲେଇଡ଼ି (Small Blue Kingfisher) ...	107
55. କଳକଳା (Pied Kingfisher) ...	109
56. ଛିନ୍ନି (Small Green Bee-eater) ...	110
57. ଭଦ୍ରଭଲିଆ (Indian Roller or Bluejay) ...	112
58. ଶାରଣ୍ଠା (Hoopoe) ...	113
59. କୋଚିଲାଣ୍ଡା (Malabar Pied Hornbill) ...	114
60. ସିନ୍ଧୁ ରମ୍ଭା (Coppersmith or Crimson-breasted Barbet) ...	116
61. କାଠହଣା (Mahratta Woodpecker) ...	117
62. ନବରଙ୍ଗୀ (Indian Pitta) ...	120
63. ଚୁଆ (Crested Lark) ...	121

64. ଦୁଗ୍ଧ (Ashycrowned or Black-bellied Finch-Lark) ...	122
65. ଲଲ-ନିତମ୍ବ ବାବୁଲ (Redrumped Swallow) ...	124
66. ଧଳା ଲଟୋରା (Grey Shrike) ...	126
67. ହଳଦି ବସନ୍ତ (Black-headed Oriole) ...	127
68. କଳଲପାତି (Black Drungo) ...	129
69. ବଣି ଚଢ଼େଇ (Common Myna) ...	131
70. ପଦ୍ମାଳିକା (Pied Myna) ...	132
71. କାଢ଼ (House Crow) ...	133
72. କରକର (Tree Pie) ...	135
73. ଜଙ୍ଗଲ ସୁନ୍ଦରୀ (Scarlet Minivet) ...	136
74. ସୌଖିନୀ ଚଢ଼େଇ (Common Iora) ..	138
75. ଜନକ ଚମ୍ପା (Jerdon's Chloropsis) ...	139
76. ରୁକ୍ମିଣୀ ବା ଡାଳଚମ୍ପା (Redwhiskered Bulbul) ...	141
77. ଚମ୍ପା ବା ଗୋବରା (Redvented Bulbul) ...	142
78. ନାବୁଣୀ ପକ୍ଷୀ (White spotted Fantail Flycatcher) ...	143
79. ଜନକ ଚଢ଼େଇ (Paradise Flycatcher) ...	145
80. ହଳଦି-ଆଖିଆ କୁଣ୍ଡାଖାଇ (Yellow-eyed Babbler) ...	147
81. ସାତଗ୍ରାସୀ ବା କୁଣ୍ଡାଖାଇ (Jungle Babbler) ...	148
82. ଚଲ୍-ଚଲ୍ (Common Babbler) ...	149
83. ଟିକି ଚଢ଼େଇ (Ashy Wren-Warbler) ...	151
84. ଦକ୍ଷିଣ ଟିକି ଚଢ଼େଇ (Tailor Bird) ...	152
85. ଦୟାଲ (Magpie Robin) ...	153
86. ଶାମା (Shama) ...	155
87. କଳାଗୁଡ଼ (Pied Bushchat) ...	155
88. ସ୍ୱାମୀ (Indian Robin) ...	156

89. କମ୍ବୁର (Malabar Whistling Thrush)	...	157
90. ଗ୍ରୀଷ୍ମଶ୍ରୀ ଚଢ଼େଇ (Grey Tit)	...	159
91. କାଠଫୋଡ଼ା ବା ଶୀର୍ଷା (Chestnut bellied Nuthatch)	...	160
92. ଗ୍ରେସ୍ (Grey Wagtail) ଓ ବଡ଼ ଖଞ୍ଜନ (Large Pied Wagtail)	...	162
93. ଗୁଆବାସୀ ଚରଚର (Tree Pipit)	...	164
94. ଟିକେଲ ଫୁଲପିକ୍ (Tickell's Flower Pecker)	...	166
95. ବାଇଗଣି ଫୁଲଚଞ୍ଚୁ (Purple Sunbird)	...	167
96. ବାବୁନା ପକ୍ଷୀ (White-eye)	...	169
97. ଘରଚଞ୍ଚିଆ (House Sparrow)	...	170
98. ବାୟା ଚଢ଼େଇ (Baya Weaver Bird)	...	172
99. (4) ଲଲ ବାରମାସୀ (Red Munia)	...	174
(3) ଢେଲିଆ ବାରମାସୀ (Spotted Munia)	...	174
100. ଉଦ୍ଧ ବା ଲଲ୍‌ଉଦ୍ଧ (Common Indian or Hodgson's Rosefinch)	...	175
101. କଳାମୁଣ୍ଡି ଗାଢ଼ାମ ପକ୍ଷୀ (Blackheaded Bunting)		
ଓ ଲଲମୁଣ୍ଡି ଗାଢ଼ାମ (Redheaded Bunting)	...	176





## ପ୍ରାରମ୍ଭିକ

ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ; ଯଥା— ସମତାପୀ ଓ ଅସମତାପୀ । କାହାରେ ଯେତେ ଉତ୍ତପ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାରେ ଖରବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମତାପୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ; ମାତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ପରିବେଷ୍ଟିମାନ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅସମତାପୀ ପ୍ରାଣୀ କହନ୍ତି । ମାଛ, ବେଙ୍ଗ ଓ ସରୀସୃପମାନେ ଅସମତାପୀ । ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଓ ପକ୍ଷୀ ସମତାପୀ । ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ । ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦେହ ଲୋମାବୃତ; ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରନ୍ତି ଓ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟଦାନ କରନ୍ତି । ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଦେହ ପକ୍ଷଦ୍ୱାରା ଆବୃତ । ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରସବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀରର ଉତ୍ତପଦ୍ୱାରା ଅଣ୍ଡାକୁ ଉଷ୍ମମାନ୍ତି ।

ପକ୍ଷୀ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଏହା ସ୍ଥିର କରିବା ସହଜ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପର ଅଳ୍ପ, ସେମାନେ ପକ୍ଷୀ । ପକ୍ଷୀ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ପର ନଥାଏ । ସେମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବୁଲନ୍ତି, ନାଡ଼ ରଚନା କରନ୍ତି ଓ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ସମାନ ମନେହୋଇପାରେ; ମାତ୍ର ନିରେଖି ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜାତି ଅପରଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅତି କମ୍ । ଷ୍ଟ୍ରୁଟ୍ଟର ପକ୍ଷୀଠାରୁ (1) ଆରମ୍ଭ କରି ବୃହତ୍ ଓଟ୍ଟ ପକ୍ଷୀ

(1) ଷ୍ଟ୍ରୁଟ୍ଟର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ Humming bird ବୋଲାଯାଏ । ଏମାନେ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ-ଗୋଲ୍ଡରେ ବାସକରନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଛୁଇଁପରି ସରୁ ଓ ଜିଭ ନଳାକାର । ତା' ସାହାଯ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରୁଟ୍ଟର ପକ୍ଷୀ ଫୁଲରୁ ମଧୁ ଚୁଷି ଖାଏ । କ୍ୟୁବାରେ ହେଲେନା ଷ୍ଟ୍ରୁଟ୍ଟର ପକ୍ଷୀ (Helena's humming bird) ପୃଥିବୀର ଷ୍ଟ୍ରୁଟ୍ଟର ପକ୍ଷୀ । ଏହା ଲମ୍ବରେ 5.7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ( $2\frac{1}{2}$  ଇଞ୍ଚ) ଓ ଓଜନରେ 2.8 ଗ୍ରାମ (1 ଓଉନ୍ସ) ହୋଇଥାଏ । ଷ୍ଟ୍ରୁଟ୍ଟର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ଚକଚକିଆ ବର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷଦ୍ୱାରା ଏକପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରୁଟ୍ଟର ଶବ୍ଦ ଜାତହୁଏ ।

—ଅନୁବାଦକ

ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ତେ ପକ୍ଷୀଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଗୁଞ୍ଜନ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷର ଚୂକାଙ୍ଗ କ୍ରୀଡ଼ା ବଡ଼ ହୁଏନାହିଁ ଓ ଓଷ୍ଟ୍ରାପକ୍ଷୀ (2) ତଟ୍ ପୋଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ହୁଏ । ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହଜାର ହଜାର କଲେମିଟର ପଥ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି । ପୁଣି ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ପକ୍ଷୀ ଆଦୌ ଉଡ଼ିପାରେନାହିଁ । ବାୟୁଚାପରେ ପର ପକ୍ଷୀ ଅତି ନିମ୍ନତମ ସହକାରେ ନଡ଼ା ରଚନା କରେ; ପୁଣି ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ନ କରି ସିଧାସଳଖ ଭୂମିଉପରେ ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । କେତେକ ପକ୍ଷୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଅପର ପକ୍ଷରେ ଶାଗୁଣୀ ପକ୍ଷୀ ଯଦି ମାଂସ ଖାଏ । ଅଧିକାଂଶ କାଉ ଧାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯାହା ପାଏ, ଖାଏ । ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଥର ଘରପଥ ଯାହାକରନ୍ତି । ପୁଣି ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନକାଳ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟାନ ନିକଟରେ କଟାଇଦିଅନ୍ତି । ଗୃହପାଳିତ କୁକୁଡ଼ା ପର ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଟାରୁ ଫୁଟିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ନିଶ୍ଚରେ ଖେଳାଇ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଣ୍ଟି ବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି । ଶୁଆ ଓ ଇଗଲ ପକ୍ଷୀର ଶାବକ ଅଣ୍ଟାରୁ ଫୁଟିବା ପରେ କେତେକ ସପ୍ତାହ ଗତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଡ଼ା ଛୁଡ଼ି ବାହାର ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବ୍ୟତିରେକେ ବହୁପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନେହୁଏ । ପୁଣି ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ବାସକରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାତାୟାତର ପଥ ଚିଆର କଲେ, ସେମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯାନ୍ତି ଓ କାଳକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ବିଲୁପ୍ତି ଘଟେ । ପକ୍ଷୀକୁଳ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ବିଭିନ୍ନତା ଥିଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ଅବଶ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ।

ସବୁପ୍ରଥମେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ (Aristotle) ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏକ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ କରିଥିଲେ । ତା'ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଲିଆ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସ୍ୱେଡେନର ପ୍ରକୃତବିଜ୍ଞାନୀ ଲିନିଆସ୍ (Linnaeus) ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଗୀକରଣ କଲେ, ତାହା କେତେକ ପରବର୍ତ୍ତନ ସହ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ଅନୁସୂଚିତ ହୁଏ ।

ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 27 ଗୋଟି ବର୍ଗ (order)ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ । ଏହି ବର୍ଗୀକରଣ ଗଠନ (structure) ଓ ବିକାଶ (development) ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୌଳିକ ପ୍ରଭେଦ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ । ଉଦାହରଣରେ,

(2) ଆଫ୍ରିକା ଓ ଆରବର ମରୁଭୂମିରେ ବାସ କରୁଥିବା ଓଷ୍ଟ୍ରାପକ୍ଷୀ (Ostrich) ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ପକ୍ଷୀ । ଏମାନେ ଉଚ୍ଚରେ 2.1 ମିଟର ଓ ଓଜନରେ 1336 କିଲୋଗ୍ରାମ (300 ପାଉଣ୍ଡ) ହୁଅନ୍ତି । ଏମାନେ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ମାତ୍ର ବାଲି ଉପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିପାରନ୍ତି ।

—ଅନୁବାଦକ

ଆମର ପରିଚିତ ଅଧିକାଂଶ ବୃକ୍ଷବାସୀ ପକ୍ଷୀ ପାସାରଫର୍ମିସ (Passeriformes) ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ପାଣିକୂଳରେ ବାସକରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବଗ ଓ ସାରସ ସିକୋନିଫର୍ମିସ (Ciconiiformes) ପକ୍ଷୀବର୍ଗ ଭିତରେ ଯାଆନ୍ତି । ପାତିହୁଂସ, ହୁଂସ ଓ ରାଜହୁଂସ ଆଦି ସନ୍ତରଣକାରୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆନସେରିଫର୍ମିସ (Anseriformes) ବର୍ଗର ।

‘ବର୍ଗ’ (order) କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ । ସମାନ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଗାଧୀନ କରାଯାଇଥାଏ । ଉଦାହରଣରେ, ପାସାରଫର୍ମିସବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃକ୍ଷଶାଖାବାସୀ ପକ୍ଷୀ 40 ଗୋଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନକ ଚଢ଼େଇ (Flycatcher) [ମାସ୍‌କାପିଡ଼ି (Muscicapidae) ବର୍ଗ], କାଉ [କରଭିଡ଼ି (Corvidae) ବର୍ଗ] ଓ ଫୁଲଚ଼଼ି (Sunbird) [ନେକ୍ଟାରିନିଡ଼ି (Nectarinidae) ବର୍ଗ] ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ପକ୍ଷୀବର୍ଗକୁ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ‘ବର୍ଗ’ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ଆଚରଣ ଓ ସ୍ୱଭାବରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ପକ୍ଷୀକୁ ଏକବର୍ଗାଧୀନ କରାଯାଏ । ବିବର୍ତ୍ତନବାଦର ନିୟମାନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଓ ଅଭ୍ୟାସରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ସମ-ସ୍ୱଭାବର ପକ୍ଷୀ ଜାତିମାନଙ୍କର ଏକା ଆକୃତିର ଅଣ୍ଟା ଓ ନାଶ ଥାଏ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଫସ, ସାଧାରଣ ଆକୃତି ଓ ଚଳନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଓ ନାଶ ଖାଇବା ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ପରେ ବିଶଦଭାବେ ଆଲୋଚିତ ହେବ । ଗୋଟିଏ ନୂତନ ବା ଅପରିଚିତ ପକ୍ଷୀ ଠିକ୍ କେଉଁ ଜାତିର ବୋଲି ଜଣା ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କେଉଁ ବର୍ଗର ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଜପକ୍ଷୀ (Hawk) ଦେଖିଛେ । ତା’ର ଉପରଅଣ୍ଟା ତଳଅଣ୍ଟା ଉପରେ ଆକୃଶୀ ପରି ବଙ୍କା, ଶକ୍ତ ଚଞ୍ଚ, ଚେପ୍ଟା ମୁଣ୍ଡ, ଉତ୍ସୁକର ଚଷ୍ମ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଡ଼ଣ—ଏ ସମସ୍ତ ସୂଚକ । ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଠିକ୍ କେଉଁ ଜାତିର, ତାହା ଜଣେ ନ ଜାଣିଥାଇପାରେ; ମାତ୍ର ତାହା ବାଜବର୍ଗର ପକ୍ଷୀ କି ନୁହେଁ, ଅନ୍ତତଃ ସେକଥା ଅନ୍ଧାର କରପାରିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ । ସେହିପରି ଫୁଲଚ଼଼ି (Sunbird) ମାନଙ୍କର ଚଞ୍ଚ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ଲମ୍ବା ଓ ସାମାନ୍ୟ ବଙ୍କା । ସେମାନେ ଅଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲର ନଳ ବା ଦଳନଳୀ (Corolla tube) ମଧ୍ୟରେ ପୁରାଇ ମଧୁ ଚଷନ୍ତି । ଏଭଳି ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଟା, ତା’ର ସାଧାରଣ ଆକୃତି ଓ ସ୍ୱଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜଣେ ନିରୀକ୍ଷକ ତାହା କେଉଁ ବର୍ଗର ପକ୍ଷୀ କହିବା ସହଜଯାଏ । ଅବଶ୍ୟ ସମୟ-

ସମୟରେ ଏସବୁ ବାହ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତିକର ହୋଇପାରେ । ଉଦାହରଣରେ, ଶୁଆ ଓ ବାଜ ଉଭୟ ବଂଶର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ବଙ୍କା । ଫଳକୁ କାଟି କୋର ଖାଇବା ପାଇଁ ଶୁଆ ଅଣ୍ଟା ବଙ୍କା ଓ ମାଂସକୁ ଚିରି ଛୁଣାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଜର ଅଣ୍ଟା ବଙ୍କା । ଏ ଦୁଇ ଜାତି ପକ୍ଷୀ କେବଳ ଯେ ଦୁଇ ବିଭିନ୍ନ ବଂଶର ଅଟନ୍ତି ତା' ନୁହେଁ; ସେମାନେ ଦୁଇଟି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେହିପରି, ନବ ଗୋଲ୍‌ଲ୍‌ (New World)ର ଗୁଞ୍ଜନ ପକ୍ଷୀ (Humming birds) ଓ ପୁରାତନ ଗୋଲ୍‌ଲ୍‌ (Old World)ର ଫୁଲ୍‌ବର୍ଡ୍‌ ପକ୍ଷୀ ବାହାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏକାପରି ଓ ଉଭୟ ଫୁଲ୍‌ରୁ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆରେକଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ।

ବର୍ଗୀକରଣର ନିୟମାନୁସାରେ, ବଂଶ ତଳକୁ ପ୍ରଜାତି (Genus)ର ସ୍ଥାନ । ଏହା ବର୍ଗୀକରଣ ଏକକ ହିସାବରେ ବଂଶ (Family) ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ପରସ୍ପର ଦନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଜାତି (Species) ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ । ‘ପ୍ରଜାତି’ ପୁରାପୁର ଭାବେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ । ସମାନ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା କେତେକ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଏକ ସମଷ୍ଟି ଭାବେ କରିବାର ସୁବିଧାପାଇଁ ପ୍ରଜାତିର ସୃଷ୍ଟି । ଲିନିଆସ (Linnaeus) ପ୍ରଜାତି ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବ ଆରୋପ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏବେ ତାହା ସେତେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ନାହିଁ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ ଜାତି କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ମତାନିକ୍ୟର ଅବକାଶ ରହୁଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁତ୍ବ ହେଲା, ତାହା କୌଣସି ଜାତି ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଗଠନ କରେ । କୌଣସି ପ୍ରଜାତିଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଏକ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଉମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସାଧାରଣ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ‘କରଷ୍ଟସ’ (Corvus) ପ୍ରଜାତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ପକ୍ଷୀ ବର୍ଗୀକରଣର ଶେଷ ବିଭାଗ ହେଲା ପ୍ରଜାତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିରେ ଭାଗ କରିବା । ‘ଜାତି’ (Species) କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଚିହ୍ନିହେବା ଭଳି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଏକକ । କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଏକ ଜାତିର କି ନୁହେଁ ତାହା ପରସ୍ପର-ପ୍ରମାନଦ୍ବାରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ । ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରଜନନଦ୍ବାରା ନିଜପରି ପକ୍ଷୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଏକା ଜାତିର । ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭେଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଗୋବରା ଚଢ଼େଇ (red-vented bulbul) ଗୋଟିଏ ଜାତିର, ଚଢ଼ିଆ ଚଢ଼େଇ ସବୁ (red whiskered bulbul) ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାତି, ଧଳାଗାଲ ଚୁଲୁଚୁଲ

(white-cheeked bulbul) ଆଉ ଏକ ଜାତି । ପ୍ରାୟଶଃ, ସ୍ଥାନର ଜଳବାୟୁ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଜାତିର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆକାର ଓ ପକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣର ଗାଢ଼ତାରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ହୁଏ । ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହଂସାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର ସେହି ଜାତି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆକାରରେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି । ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଷ୍କଭୂମିରେ ବାସ କରୁଥିବା ସେହି ଜାତି ପକ୍ଷୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଗାଢ଼ ହୁଏ । ଯେଉଁଠି ଏଭଳି ପ୍ରଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ଥିର, ସେ ସ୍ଥଳରେ ପକ୍ଷୀ-ବର୍ଗୀକରଣ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏକ ଜାତି ପକ୍ଷୀକୁ ପୁଣି ଉପ-ଜାତି (subspecies) ବା ରେସ୍ (race) ରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି । କୌଣସି ଜାତି ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଉପଜାତିର ପକ୍ଷୀ ପରସ୍ପର ସହଜ ପ୍ରଜନନ-କ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି; ମାତ୍ର ବର୍ଗୀକରଣରେ ଜାତିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏକକ ବୋଲି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ବର୍ଗ (order)ର ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ତା'ପରେ ତା'ର ବଂଶ (family) ଓ ପ୍ରଜାତି (genus) । ଶେଷରେ ତା'ର ସଠିକ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ଜାତି (species) ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୁଏ । ପ୍ରାୟଶଃ ତା'ର ଭୌଗୋଳିକ ରେସ୍ (race) ମଧ୍ୟ ନିରୂପିତ ହୁଏ । ପୃଥିବୀରେ ମୋଟାମୋଟି 8,650 ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଜୀବତ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏ ସମସ୍ତେ 'ପ୍ରାକୃତିକ' କ୍ରମ ଅନୁସାରେ 27 ଗୋଟି ବର୍ଗ (order) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବିବର୍ତ୍ତିତ; ଯଥା— ହଂସରାଜ (grebes) ଓ ଚୁଡ଼ାଳି ପକ୍ଷୀ (divers), ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଗ ଏବଂ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିବର୍ତ୍ତିତ; ଯଥା—ବୃକ୍ଷଶାଖାବାସୀ ପକ୍ଷୀ [ପାସାରୀ-ଫରମିସ (Passeri-formes)], ସେମାନେ ଶେଷ ବର୍ଗର । ଅବଶ୍ୟ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ପକ୍ଷୀବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କପର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ମତାନୈକ୍ୟ ରହିଛି । କେତେକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ କାକ ଏହି ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବ; ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫିନ୍ଚ୍ (Finch—କ୍ଷତ୍ର ଜଳଧୂନକାଣ୍ଡ ପକ୍ଷୀ)ମାନେ ଏହି ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ।

ଅମ୍ଭ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 1200 ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଏମାନେ 75 ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀ (family) ଓ 20ଟି ବର୍ଗ (order) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଏତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯିବା ଅବଶ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ।



ଜଳବାୟୁରେ ବିଶେଷ ବିଭିନ୍ନତା ଏହାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ । ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଦ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ଜଳବାୟୁ (moist tropical) ଓ ସୁମେରୁର ଶୀତମଣ୍ଡଳୀୟ ଶୈତ୍ୟ (cold arctic) ଦେଖାଯାଉଥିଲେବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଶୁଷ୍କ ଉଷ୍ମ ମରୁଭୂମି ଜଳବାୟୁ ଓ ପାୱର୍ତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁଶୀତୋଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ଏହା ଫଳରେ ଆମ ଦେଶରେ ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟ, ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ଜଙ୍ଗଲ, ମୁକ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର, କଞ୍ଚିତ ଅଞ୍ଚଳ, ସମୁଦ୍ର ଉପକଳ, ନଦୀଶଯ୍ୟା, ଟାଙ୍ଗରା ଭୂମି ଓ ଅଭ୍ୟୁତ ପର୍ବତମାଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଶହ ଶହ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବାସପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ (ecological habitat) ରହିଛି । ଭାରତର ପକ୍ଷୀସମାଜ ପୃଥିବୀର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଂଶିକ ସମାବେଶ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନାହିଁ । ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏଠାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା; ପୁଣି କେତେକ କେବଳ ଶୀତକାଳଟି କଟାଇବା ଲାଗି ଯାଯାବର ଭାବେ ଆସିଥାନ୍ତି । ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସ୍ଥଳୀୟ ଆମ ଏଠାରେ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ବା ମୁଖ୍ୟତଃ ନବଗୋଲ୍ଡ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆବାସୀ କେତେକ ବର୍ଗ ଓ ବର୍ଗର ପକ୍ଷୀ । ଶୀତଳ କୁମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଧାରଣବାସୀ ପେଙ୍ଗୁଇନ ପରି କେତେକ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦୃଷ୍ଟିପ୍ୟ ।

## ପକ୍ଷୀ-ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପକ୍ଷୀ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ

ଏବେ ଭାରତରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ହେଉଅଛି, ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେପରି ହେଉ ନ ଥିଲା । ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଭାରତର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱମ୍ବନ୍ଧରେ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ ଚାଲି କରୁଥିବା ବେସାମରିକ ଓ ସାମରିକ ବ୍ରିଟିଶ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଠୁସେଠୁ ପକ୍ଷୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଗୀକରଣ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଟି. ସି. ଜାରଡନ୍ (T. C. Jerdon)ଙ୍କ ଲିଖିତ ‘ଭାରତର ପକ୍ଷୀ’ (The Birds of India) ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଉକ୍ତ 1862-64 ସାଲରେ ପ୍ରକାଶନଠାରୁ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀ-ବିଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ । ଡକ୍ଟର ଜାରଡନ୍ ଥିଲେ ସାମରିକ ବିଭାଗର ଜଣେ ଡାକ୍ତର । ସେ ତାଙ୍କର ବହୁବର୍ଷ ଚାକିରିକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ନାନା ସ୍ଥାନରୁ ପକ୍ଷୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କଦ୍ୱାରା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଓ ପୂର୍ବେ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶିତ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସମ୍ମିଶ୍ରିତ କରିଥିଲେ । ଜାରଡନ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବିଖ୍ୟାତ ଓ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱମ୍ବନ୍ଧରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ହେଲେ ବ୍ରାଏନ୍ ହଜସନ୍ (Brian Hodgson) ଓ ଏଡ୍ୱାର୍ଡ ବ୍ଲାଇଥ୍ (Edward Blyth) । ହଜସନ୍ ନେପାଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଓ ବ୍ଲାଇଥ୍ କଲିକତାସ୍ଥ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଯାଦୁଘରର ରକ୍ଷକ (curator) ଥିଲେ । ଜାରଡନ୍ଙ୍କ ପୂର୍ବେ ଓ ତାଙ୍କ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପକାଳ ଆଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀ-ବିଶାରଦମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା । ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକାରୀ ଓ ଜନ୍ତୁଧରାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା; କାରଣ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସ୍ୱମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜଣାନଥିଲା ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ମାରି, ତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି, ଯାଦୁଘରରେ ବସି ତା’ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଲେଖିବାକୁ ଓ ନାମକରଣ କରିବାକୁ ଯତ୍ନ ଥିଲା ।

ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ପକ୍ଷୀ-ପକ୍ଷୀବେଷଣ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇନାହିଁ । ଭଲ ଦ୍ୱିନେନ୍ଦ୍ର ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର (ବାଇନୋକୁଲର) ଦୁର୍ଘ୍ରାପ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସରଳ ଚିତ୍ର ପୁସ୍ତକ ନ ଥିବାରୁ, ପକ୍ଷୀ ଆଖି ଆଗରେ ହାତ ପାଖରେ ନ ଥିଲେ ତାହା କି ପକ୍ଷୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ । ଅଧିକନ୍ତୁ ସେବକାଳରେ, ଯାଦୁଘରେ ଗବେଷଣାରତ ପ୍ରାଣିବିଜ୍ଞାନବିତ୍ମାନେ ପକ୍ଷୀପକ୍ଷୀବେଷଣକୁ ଆଲିଫ୍-ପରାୟଣ ଧନିଲୋକଙ୍କର ସମୟ କଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପିଲ୍‌ଫେଲ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ତା'ର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ମନେକରୁଥିଲେ । ଫଳରେ ଅନେକ କାଳ ପକ୍ଷୀଜ୍ଞ, ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବା ଓ ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହକରିବା ଭାରତର ପକ୍ଷୀବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ‘ସମ୍ମାନ’ର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଜାର୍ଜେନ୍‌ଙ୍କର ‘ଭାରତର ପକ୍ଷୀ’ (Birds of India) ବହିଫଳେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟଗଠନ ଓ ପକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସାଧାରଣ ପାଠକର କୌତୃହଳ ଚରତାର୍ଥ ପାଇଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିତ୍ରାକର୍ଷକ ବିବରଣୀ ସନ୍ନିବେଶିତ କରିଥିଲେ । ଏ ପୁସ୍ତକ ପକ୍ଷୀପ୍ରେମୀ ବା ପକ୍ଷୀ-ପକ୍ଷୀବେଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବିଳମ୍ବେ ଉତ୍ସାହଜନକ ହୋଇଉଠିଲା । ଫଳରେ ଉତ୍ସାହ ‘ଆମେଚର’ ବା ଅନୁରାଗୀ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରକୃତି-ବିଜ୍ଞାନବିତ୍ (field naturalist) ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲା ।

ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁଧ୍ୟାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଦ୍ୱାରା । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହୁମ୍ (Allan Octavian Hume) । ହୁମ୍ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ । ସେ ଭାରତର ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗରେ (ସିଭଲ୍ ସାର୍ଭିସ୍) ଚାକିରି କରୁଥିଲେ । ସେ ପକ୍ଷୀବିଜ୍ଞାନବିତ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଜଣେ ‘ଦୈତ୍ୟ’ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆଉ ଏକ କାରଣ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଟନ୍ତି । ସେ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା । ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ପକ୍ଷୀବିଜ୍ଞାନବିତ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଣୀରୂପେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରି ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଓ ପରିଚାଳନାରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ରହିଥିବା ଶିକାରୀ ପ୍ରକୃତି ବିଜ୍ଞାନବିତ୍ମାନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଚମଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ୍ଷେତ୍ର-ବିବରଣୀ (Field note) ଲେଖିରଖୁଥିଲେ । ହୁମ୍‌ଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଓ ଗତିଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଯୋଗୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା । ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀବିଜ୍ଞାନ ସଂପର୍କୀୟ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସେ “ସ୍ଟ୍ରେ ଫେଡାରସ” (Stray-

Feathers—‘ଇଡ୍ରୁଡଃ ପକ୍ଷୀ’) ନାମକ ଏକ ପକ୍ଷୀକା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ସେ ପକ୍ଷୀ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ପକ୍ଷୀ ଚମଡ଼ାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗୀକରଣ କରୁଥିଲେ ଓ ଅଜଣାଥିଲେ ନୂତନ ନାମକରଣ କରୁଥିଲେ । ଏହା ଫଳରେ ଅନେକ ଜାତିର ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ହୋଇ ପାରିଥିଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ହୁଡ୍‌ସନ୍ ପକ୍ଷୀ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଲିଖିତ ବିବରଣୀକୁ ସମ୍ପାଦନକରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପକ୍ଷୀକାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ । 1872ରୁ 1888 ସାଲ ମଧ୍ୟରେ ‘ଫ୍ଲୋ ଫେଡାରସ’ର 11ଟି ଭାଗ (volume) ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏସବୁ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନେକ ଦୂର ଆଗେଇନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛି । ଭାରତର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ଗବେଷଣାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କିରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ପକ୍ଷୀକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟକୁ ଅବିରତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ।

ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନବେଳେ ବିଲ୍‌ଡସ୍ଟିଡ ‘ଭାରତ ଅଫିସ’ (India Office) “ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତର ପ୍ରାଣିକୁଳ” (Fauna of British India) ଶୀର୍ଷକ ସିରିଜ୍‌ରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପୁସ୍ତକମାନ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ । ସେହି ସିରିଜ୍‌ରେ ଇ. ଡବଲିଉ. ଓଟସ (E. W. Oates) ଓ ଡବଲିଉ. ଟି. ବ୍ଲାନଫୋର୍ଡ (W. T. Blanford)ଙ୍କ ସଙ୍କଳିତ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକ 1889ରୁ 1898 ସାଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଆଗ୍ରହର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହେଲା । ଉଭୟ ଲେଖକ ପ୍ରକାଶ ପକ୍ଷୀତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଥିଲେ; ମାତ୍ର ଏକତୁଷ୍ଟିରୁ ବିଚାରକଲେ ସେମାନେ ‘ଆମେତର’ । କାରଣ, ଓଟସ ପି. ଡବଲିଉ. ଡି. (ପବଲିକ ଓ୍ଵାର୍କସ ଇସ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ମେଣ୍ଟ) ଅଧୀନରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିଅର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଓ ବ୍ଲାନଫୋର୍ଡ ଥିଲେ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥକାରମ୍ଭରେ ସେମାନଙ୍କ ବହିରେ ହୁଡ୍‌ସନ୍ ଓ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ଶ୍ରମ ଫଳରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂଗୃହୀତ ନୂତନ ଚିତ୍ରାଙ୍କନଗୁଡ଼ିକୁ ସନ୍ନିବେଶିତ କରିଥିଲେ । ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ପକ୍ଷୀ-ବର୍ଗୀକରଣ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସୂତ ହୋଇଥିଲା । ଅଧିକନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ସିନ୍ଧ (Sind), କାଶ୍ମୀର, ଆସାମ, ବଙ୍ଗାଳା (ଆଧୁନିକ ବଙ୍ଗାଳାଦେଶକୁ ମିଶାଇ), ବର୍ମା, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା (ସିଂହଳ) ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ସମୟକୁ ପକ୍ଷୀ-ବିଜ୍ଞାନତୁଷ୍ଟିରୁ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଅନାବିଷ୍କୃତ ଥିଲା । ବସ୍ତୁତଃ, ପକ୍ଷୀ-

ବିଜ୍ଞାନର ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ‘ଭାରତର ପକ୍ଷୀକୁଳ’ ( The Fauna ) ନାମରେ ସୁପରିଚିତ ଏହି ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ ସେତେବେଳର ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ କ୍ଷେତ୍ର-ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହର ପରିସର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । ସବୁଠାରେ ପକ୍ଷୀପ୍ରେମୀମାନେ — ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ଷେତ୍ର-ସ୍ଥାପୀ (Planters) ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ (Civil) ଓ ସାମରିକ ଅଫିସାର—ଦ୍ଵାରା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ପକ୍ଷୀ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଫଳରେ ଏହି ହଜୁଯୋଗୁ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟର ବେଶ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଗଲା । ‘କ୍ଲେ ଫେଦାରସ’ର ପ୍ରକାଶନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେତେବେଳେ ନୂଆ କରି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ‘ବମ୍ବେ ପ୍ରକୃତିବିଜ୍ଞାନ ସମିତି ପତ୍ରିକା’ ( Journal of the Bombay Natural History Society )ରେ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ସେହିନିମ୍ନରୁ ଆଜିଯାଏ ଏହି ପତ୍ରିକା ( ପତ୍ରିକାର ଏବେ 73 ଭାଗ ଚାଲିଛି ) ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖାମାନ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ପତ୍ରିକାରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛି । ଏହି ଲେଖାସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଧନ୍ଦାରେ ରହୁଥିବା ଔପକର୍ଷ୍ୟମାନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରକୃତି ବିଜ୍ଞାନବିତମାନଙ୍କଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ହୁଏ ।

ଏହିପରି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତରଣ, ଆଚରଣ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନର ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ଫଳରେ 1920 ସାଲର ଶେଷକୁ ‘ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣିକୁଳ’ ( The Fauna ) ସିରିଜ୍ରର ‘ପକ୍ଷୀ’ ( Birds ) ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଥମ ପାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶେଷଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହେଲା । ପ୍ରଥମ ପାଠ ପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ ଏହାର କଲେବର ପୂର୍ବର ଚାରିଗୁଣି ସ୍ଥାନରେ ଆଠଗୁଣି ହେଲା । ଏଗୁଡ଼ିକର ମୁଦ୍ରଣ 1921ରୁ 1930 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂସ୍କରଣର ଗ୍ରନ୍ଥକାର ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ‘ଆମେଟର’ ମାତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞ । ତାଙ୍କ ନାମ ଇ. ସି. ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ବେକାର ( E. C. Stewart Baker ) । ସେ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆସାମରେ ଚାକିରିଜୀବନ ବିତାଇଥିଲେ । ସେ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ସେଠାର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହକରି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ନାଡ଼ ରଚନା ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ଏହି

ନୂତନ ସଂସ୍କରଣରେ କେବଳ ଯେ ଭରତୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧୁନାତନ ବର୍ଗୀକରଣ, ନାମକରଣ ପ୍ରଭୃତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ବୃତ୍ତନ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପକ୍ଷୀବିଜ୍ଞାନରେ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତି ଓ ଆଧୁନିକ ଗତି ସହିତ ଝମତା ରକ୍ଷାକରି ତଥ୍ୟ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିବାରୁ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଷୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଥାର୍ଥତାରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଭରତୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ କେଉଁ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ସୀମିତ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗରୁ ଅଧିକ ଅନୁଶୀଳନ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ଛଦ୍ମଭାବେ ସୂଚିତ ହୋଇଥିଲା । ପକ୍ଷୀବିଜ୍ଞାନର ଅନୁସନ୍ଧାନମାନେ ଏହି ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବଲ କରିବା ପାଇଁ କାଳ ବିଳମ୍ବ କରିନଥିଲେ ।

‘ଭରତୀୟ ପ୍ରାଣିକୂଳ’ (The Fauna)ର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଉପ-ମହାଦେଶର ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହୋଇ ନ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ମୂଲ୍ୟବାନ ସଂଗ୍ରହ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଅଛି । ଏଥିରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା କରାହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫିନିଶ୍ ଭରତୀୟମାନେ ସେଥିରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି 1947 ଶାଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ପକ୍ଷୀବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭରତୀୟ ଅବଦାନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହୋଇଅଛି । ଉକ୍ତ କାଳମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଜଣ କର୍ମୀଙ୍କ ନାମ ସର୍ବଗ୍ରେ ଆମ ନଜରକୁ ଆସେ, ଯଥା—ହାଗ୍ ହ୍ୟୁସଲର (Hugh Whisler) ଓ କଲ୍ଡ ବ୍ଲେ ଟାଇସହାରସ୍ଟ (Claude B. Ticehurst) । ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ବେକାରଙ୍କ ପରି ହ୍ୟୁସଲର ଭରତୀୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଫିସର ଥିଲେ । ଟାଇସହାରସ୍ଟ ଥିଲେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର । ପ୍ରଥମ ମହାସମର ସମୟରେ ସେ ‘ରାଜକୀୟ ସେନାବାହିନୀ ମେଡିକାଲ ସଂସ୍ଥା’ (Royal Army Medical Corps)ରେ ଅଧିକାରୀ ପାକିସ୍ତାନ (ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନ)ର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲାବେଳେ ଭରତୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ଦୁଇ କର୍ମୀ “ଭରତୀୟ ପ୍ରାଣିକୂଳ” (The Fauna) ସିରିଜ୍ରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପୂର୍ବେ ଓ ବିଶେଷ କରି ‘ଡା’ପରେ ଭାରତର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି ।



ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଢଳ ପକ୍ଷୀ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହୋଇ ନଥିବା କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ଭିନ୍ନ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି-ଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ମାରି ତା'ର ଚମଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ବର୍ଗାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍‌ମାନଙ୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଓ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସେସବୁ ଉଧାର ସୂତରେ ମିଳିପାରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି, ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଓ ବିଜ୍ଞାନାଗାର ଛାଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରିଯିବା । ଅନ୍ୟ କଥାରେ କହିଲେ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଜୀବନ୍ତ ପକ୍ଷୀର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ତା'ର ପାରମର୍ଶିକ ଅବସ୍ଥିତି (ecology), ସ୍ୱଭାବ ଓ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା । କିପରି ଓ କେଉଁଠାରେ ପକ୍ଷୀ ବାସକରେ, ସେ କିପରି ପରିବେଶ ସହିତ ନିଜକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରୁଛି, ସେ କିପରି ପଡ଼ି ବା ପତ୍ନୀ ଲୁହକରେ, କି ପ୍ରକାର ନୀଡ଼ ରଚନାକରେ, କିପରି ଶାବକମାନଙ୍କୁ ବତ୍ତାଏ, ତା'ର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଜାତିର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ (Population dynamics)—ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷିତ ହୋଇ, ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ବନ୍ଧୁ ନାଁ ଶବ୍ଦ ତାହା ନିଶ୍ଚିତହେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆମ ଦେଶ ଏକ କୃଷିବହୁଳ, ଜନବହୁଳ ଓ ଜଙ୍ଗଲମୟ ଦେଶ । ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଖପାଗତ ଲାଗି-ରହିଥିଲାବେଳେ, ଏଭଳି ଅନୁସନ୍ଧାନ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ । ଏ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍‌ରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଶୁଷ୍କ ପକ୍ଷୀଚର୍ମରୁ ମିଳିପାରିବନାହିଁ ।

ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ-ଇତିହାସ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ତାହା ଆବିଷ୍କାର କରିବା ସମୟସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଭୃତ ଯୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ । ଭାରତରେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଜାତିର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଜୀବନ-ଇତିହାସ ଏଯାଏ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇପାରିଅଛି । ତାହା ପୁଣି ଅଗଭୀର ବା ଉପରଠାଉଥିବା ଭାବେ । ଅଧିକାଂଶ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଓ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆନୁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଓ ବିକ୍ଷିପ୍ତ । ଆମେତର ପକ୍ଷୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ-କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯାଉଥିବା ସଞ୍ଚିତ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କଲେ, ସମୟ ସମୟରେ କୌଣସି ଜାତି ପକ୍ଷୀର ଜୀବନ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ ।

ପକ୍ଷୀ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି, କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଚିହ୍ନିପାରିବାର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା । ଏତକ ଜଣେ କରି ନ ପାରିଲେ ତା' ପକ୍ଷରେ ଆଉ ଆଗେଇବା ଅସମ୍ଭବ; ଠିକ୍ ଯେପରି ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିବନ୍ତୁ ନ ହେଲେ ପଢ଼ିପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ପକ୍ଷୀ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିବନ୍ତୁ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ । ତାହା ହେଲା, ଗୋଟିଏ ବାଇନୋ-କୁଲର, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବହୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୁସ୍ତକ ।

ପକ୍ଷୀ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦୁଇ ଆଖିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦୂରଦର୍ଶନ ଯନ୍ତ୍ର (ବାଇନୋ-କୁଲର)ର ସବୁଠାରୁ ଉପଯୋଗୀ ଆକାର ହେଲା  $8 \times 30$  ବା  $7 \times 50$  । ତାହା ନେବା ଆଣିବା କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ବେଶି ବଡ଼ ବା ଭାରୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସେଥିରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକାରରେ ଦେଖିହେଉଥିବ ଓ ତାହା ନ୍ୟାୟୀ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଫୋକାସ ହୋଇପାରିବ । ଭଲ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବ । ପକ୍ଷୀ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଆକାଞ୍ଚିକ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିହ୍ନିବେ । ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଏ ବହୁଟି ତାଙ୍କୁ ସେହିଠାରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇଟି ଅତି ଦରକାରୀ ବହୁ ହେଲା, ହୁଇସଲର (Whistler) ଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ Popular Hand Book of Indian Birds (ଭରଡ଼ାୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ହେଣ୍ଡବୁକ୍) ଓ ସାଲିସ ଆଲଙ୍କ ଲିଖିତ The Book of Indian Birds (ଭରଡ଼ାୟ ପକ୍ଷୀ ପୁସ୍ତକ) । ଶେଷୋକ୍ତ ବହୁରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆକାର, ପ୍ରଧାନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ସଂଖ୍ୟକ ପୁଷ୍ପ ଲକ୍ଷଣ; ଯଥା—ଲମ୍ବା, ଚଞ୍ଚୁ, ଗୋଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁସାରେ ବିବରଣ ପଟ ବା ଗୁଚ୍ଛିତ ହୋଇଛି । ତା' ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ପକ୍ଷୀର ସର୍ବସ୍ୱୀକୃତ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଥିବ । ଫଳରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀକୁ ଚିହ୍ନିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ ।

କୌଣସି ପକ୍ଷୀକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ, ସବୁଠାରୁ ଦରକାରୀ କଥା ହେଉଛି, ନିଜେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଛ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ଜାଣିବା । ଉଦାହରଣରେ, ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରେଟ୍ କଳା ଧଳା ଚଢ଼େଇ ଦେଖିଲା । ତା' ଦେହର କେଉଁ କେଉଁ ଅଂଶ ଧଳା—ମୁଣ୍ଡ ଧଳା, ନାଁ ଲୁହ ଧଳା ନା ପେଟ ପାଖ ଧଳା—ଏହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ପକ୍ଷୀଟିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଯଥା—ଅଣ୍ଟର ଆକାର ଓ ବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଡ଼ ଓ ଲୁହର ଆକାର ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ; ଯଥା—ବୁଲ୍ଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପ୍ରୟୋଜନ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଦେଖିଲାବେଳେ, ସେ

ପୁଣି ଗଛ ପତ୍ର ଭିତରେ ଜାଗାକୁ ଜାଗା ଉଡ଼ିଲାବେଳେ କ୍ଷଣମାତ୍ର ଦର୍ଶନରେ, ଜଣେ ଯେ ପକ୍ଷୀଟିର ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ, ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଧାରଣା ମନ ଭିତରେ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ (concentrate) ହେବା ଭଲ । ଅନ୍ୟ କଥାରେ କହିଲେ, ଯଦି ଜଣେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଦେଖି ମନେରଖେ ଯେ ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବାଦାମୀ ଓ ଲାଲ, ଆଉ ତା'ର ଯାଙ୍ଗରେ ଟିକିଏ କଳା ଓ ଧୂସର, ତେବେ ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଷ୍ଟକର । ବରଂ ସେ ଯଦି ମନେରଖେ ଯେ ପକ୍ଷୀଟି ଆକାରରେ ବଣି ଚଢ଼େଇ ପରି ଓ ତା'ର ଗୋଡ଼ ଲାଲ ତେବେ ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ବରଂ ସହଜ ହୋଇପାରେ । ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନିବାର ଜଟିଳତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ କଥା ଏହି ଯେ, ଆମର ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ଯେତେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ, ତା' ଅପେକ୍ଷା ତାହା ଅନେକ କମ୍ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ । ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଭିତରେ ଦେଖିଥିବା କୌଣସି ପକ୍ଷୀର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ତା'ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ପାଶୋରିଯିବା ଯେ ସମ୍ଭବ ତା' ନୁହେଁ; ବରଂ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ । ଏଣୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ତାହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିପିରିଖିବା ଅବଶ୍ୟ କରଣୀୟ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଦୃଢ଼ତା ଉପକରଣ ନୋଟବହି ଓ ପେନ୍‌ସିଲ ମରୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଘଟନାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପକ୍ଷୀର ଗମନ-ବିରତି ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଏ, ସେ ସ୍ଥଳେ ସେ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଟିପି ରଖିବା ଦରକାର । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିଚିତ ପକ୍ଷୀର ଆକାର ଭୁଲିନାରେ ଦେଖିଥିବା ପକ୍ଷୀର ଆକାର, ସାଧାରଣ ବର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାଗ ଓ ତା'ର ଅବସ୍ଥିତି, ଅଣ୍ଟା, ଗୋଡ଼, ଡେଣା, ଲାଞ୍ଜ, ବେକ ଓ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଆଖିର ଆକାର, ଆୟତନ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଟିପିରିଖିବେ । ଜାଗା ଉପରେ ଯେତେ ମୋଟାମୋଟି ହେଉନା କାହିଁକି ପକ୍ଷୀଟିର ଏକ ସନ୍ଧିଗ୍ଧ ରୂପରେଖ ଅଙ୍କନ କରିନେଲେ ଚିହ୍ନିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ । କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ, ଯଥା—ତଳେ ଭୂମି ଉପରେ, ଗଛର ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ, ଥୁଣ୍ଡା ତାଳରେ ବା ଖୁଣ୍ଟି ଉପରେ, ବା ପାଣିରେ, ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଓ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଟିପିରିଖିବା ପ୍ରୟୋଜନ । କେତେକ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ଯଥା—ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଗତିକରିବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଠାଣିରେ ଉଡ଼ିବା, ଇତ୍ୟାଦି । ଏହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ସୁବିଧା ହୁଏ । ତେଣୁ ପକ୍ଷୀର ଏଭଳି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିପିରିଖିବେ ।

ଧ୍ବନି ବା ଗୀତ ଦ୍ବାରା ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀକୁ ଚିହ୍ନିଆଯାଇପାରେ । ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଷ୍ଟକର । ତଥାପି, ପକ୍ଷୀଟି କିପରି ଶ୍ବବ କରୁଥିଲା, ତା'ର ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା; ଯଥା—ଏକକ ସ୍ବର (single note), ଉଡ଼ିଲା ବେଳେ ସିଟି ମାରିବା ବା ଫଡ଼ଫଡ଼ ଶବ୍ଦ କରିବା, ଗାନ୍ଧୀ କରେ-ମିଟରି ଶବ୍ଦ କରିବା ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନିବାର ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇପାରେ । ତାରିଖ ଓ କେଉଁ ପରିବେଶରେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ଟିପିରିଖିବା ଅବଶ୍ୟ ସର୍ବୋପରି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ । ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଥିବା ପକ୍ଷୀ କେତେକ ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀ ହୋଇନଥିବେ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଇପାରେ । ପ୍ରଜନନ କାଳରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣ ବଦଳେ । ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ସହଜ ପକ୍ଷୀ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅନୁରୂପ ହୋଇ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ତାରିଖରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ତାହା ଟିପିରିଖିଥିଲେ ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ । ପରିବେଶର ଭଲ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିଲେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇପାରେ ।

ବହୁତେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଚିତ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେ ନୂଆ କରି ପକ୍ଷୀ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତା' ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖାରେ ପକ୍ଷୀ ଦେହର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦାଗ ଦେଖିପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଉଡ଼ୁଥିବା ଓ ଗଛପତ୍ରର ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆତ୍ମାତ୍ମ କରୁଥିବା ପକ୍ଷୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେବେଳକୁ ଏହା ଅଧିକ ସତ୍ୟ । ଏପରିକି ମୁକ୍ତ ଦିବାଲୋକରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ପକ୍ଷୀର ବର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରାନ୍ତିକର ହୋଇପାରେ । ବିଶେଷ କରି ଖାଲିଆଖିରେ କେତେକ କୋଣରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ପକ୍ଷୀର ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ନୁହେଁ ସେପରି ଦେଖାଯାଇପାରେ । ତେଣୁ ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କେବଳ ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଅନ୍ତଃ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ; ଯଥା—ଅଙ୍ଗ, ଗୋଡ଼, ଚଢ଼ା ବା ପୁଚ୍ଛ କିପରି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସମୀଚୀନ ।

ଅଳ୍ପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଅପରିଚିତ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ହେବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ଜଣକର ଚେହେରା ଓ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସେପରି ସେ କେଉଁ ପରିବାରର ଲୋକ ବୋଲି ଜାଣି ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଝଗଡ଼ା ଚେହେରା ଓ ବର୍ଣ୍ଣଗତ ଅଭ୍ୟାସଦ୍ବାରା ପକ୍ଷୀ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ତାହା ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରେ । ଉଦାହରଣରେ, ବଗବନ୍ତର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବେକ ଶଙ୍ଖି ଉଡ଼ିଲା ବେଳର ଠାଣି, ମାଛରଜାମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ, ବାଜମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ

ଓ ଅଳ୍ପ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ପକ୍ଷୀ ତାହା ସଠିକଭାବେ ଶୁଦ୍ଧ କରି ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ କେଉଁ ବର୍ଗର ପକ୍ଷୀ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କରାଯାଇପାରେ । ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ । ତାହା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଚଳନ (movement) । ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ପରେ ଏ ବିଷୟଟି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବନାହିଁ । କେତେକ ଜାତିର ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଓ ସମୟ ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଚଳନ ସମାନ ଓ ଏକା କାଟର (Pattern) । ଉଦାହରଣରେ, ସରୁଜାତି କନକ ଚଢ଼େଇ (flycatcher) ଏକାଠିରେ ଉଡ଼ିଥାନ୍ତୁମାନ ଛତ୍ର ପତଙ୍ଗଙ୍କ ପିଛା ଧରିଥାନ୍ତି । ଖୁସ୍ତାଭାବେ ଚଢ଼େଇକୁ ନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିବାଉଁଟୀରୁ କହିହେବ ଯେ ତାହା କନକ ଚଢ଼େଇ । ସେହିପରି ଟିକି ଚଢ଼େଇ (wren-warbler) ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ହଠାତ୍ ଉଠା-ପଡ଼ା ଉଡ଼ିବା ଭଙ୍ଗୀରୁ (twitching flight) ଚିହ୍ନି ହୁଏ । ପକ୍ଷୀ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ଯେଉଁମାନେ ବେଶ୍ ଆଗେଇଗଲେଣି, ସେମାନେ ଅସାଧାରଣ ବା ବୁଲ (Vagrant) ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ‘ବମ୍ବେ ପ୍ରକୃତି ବିଜ୍ଞାନ ସମିତି’ (Bombay Natural History Society) ବା କଲିକତାସ୍ଥିତ ‘ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣୀବିଜ୍ଞାନ ସର୍ବେ’ (Zoological Survey of India)ରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀ ସଂଗ୍ରହ ଦେଖିବା ଉଚିତ ।

ଆପଣ ଯଦି ଏକ ଚଢ଼େଇବସା ସନ୍ଧାନ କରିପାଇଲେ ଯେଉଁଠି ସହଜରେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ, ତେବେ ତାହା ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପକ୍ଷୀଟି ସହଜ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଚମତ୍କାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତା ସହକାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇବସାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ । ନଚେତ୍ ତା’ର ଉପସ୍ଥିତି କାଉ ଓ ଅନ୍ୟ ପରଭକ୍ଷୀମାନେ ଜାଣିନେବେ । ତା’ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟା ଓ ଶାବକମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ଧରିବାର ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମଣିଷ ପକ୍ଷୀଶାବକକୁ ହାତରେ ଧରିଲେ ଯେ ତା’ ମା’ ତାକୁ ଆହାର ଦେବନାହିଁ, ଏ ଧାରଣା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍ଷୀଶାବକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁକୁମାର । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ବା ଭୟାବୁତା କରିବା ଅନୁଚିତ । ଯେଉଁ ଅସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରବିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହାତରେ ଧରିବାକୁ ହେବ—ଯେପରିକି ଆଦାତ ପାଇଥିଲେ—ସେପରି ସ୍ଥଳେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ହାତରେ ଧରିବାକୁ ହେବ । ହାଲୁକାଭାବେ ଅଥଚ ଜବର କରି ତା’ର ଦୁଇ ଡେଶାକୁ ଗୋଟିଏ କଡ଼କୁ ରଖି ହାତପାୟାଲରେ ଶୁଦ୍ଧ

ଧରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଦ୍ଵାରା ବେକକୁ ଦୁଇ ପଟୁ ଧରିନେବେ । କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଛୁଇଁରେ ସାମାନ୍ୟ ଋଷ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଏ । କୌଣସି ପକ୍ଷୀକୁ ପକ୍ଷୀକ୍ଷା କଲବେଳେ ହାତ ପାଖକୁ ଉପରେ ତାକୁ ପଛରୁ ଧରିବା ଭଲ । କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦସ୍ତର, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପିଠି ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚଳ ରହିଥିବେ । ପକ୍ଷୀକ୍ଷା ସରିଲେ ହାତକୁ ବୁଲାଇ ଧରି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଉଡ଼ାଇଦେବାକୁ ହେବ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ନୂତନ ବା ତମକପ୍ରଦ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘକାଳଧରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଶୁଭେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ହାବଭାବ ଗୁଲିଚଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଘନିଷ୍ଠତା ଗଢ଼ିଉଠେ, ତଦ୍ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ଓ ସାରା-ଜୀବନ ଧରି ଏକ ସଉକରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଆଉ ଏ ସଉକକୁ ପ୍ରାୟ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ସଞ୍ଚୀବିତ କରି ରଖାଯାଇପାରେ ।



## ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ

ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଉଦ୍‌ବେଗଜନକ କଥା ହେଲା ଅଣ୍ଡା ଦେଇ କୁଆକୁ ବଢ଼ାଇବା ସମୟଜନକ । ଏହା ଗୁରୁତ୍ବର ଓ ବିପଦସଙ୍କୁଳ । ଯେଉଁଠି ନୀଡ଼ ରଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘାସ ପଥ ପ୍ରବାସଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହୁମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ଆହୁର ଅଧିକ ବିପଦ ଓ ଦାୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ନୀଡ଼ରଚନା କରି ବାସକୁରୁଥିବା ଏକ ପକ୍ଷୀ-ପରିବାର ଅତି ସହଜରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରେ । ସେଥିପାଇଁ ପରିବେଶରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ରୟ ସେମାନଙ୍କର ଲେଡ଼ା ହୁଏ । ନୀଡ଼କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋପନ ସ୍ଥାନ ଦରକାର । ନୀଡ଼ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଓ ତା'ପରେ ଶାବକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଖରା ପାଗ ଚାହିଁ । ଶାବକମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ସର୍ବୋପରି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବେଶି ଦିବାଲୋକ ଦରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ ବଡ଼ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଖାଦ୍ୟସଂଗ୍ରହ । ଅନ୍ୟ କେତେକ କଥାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ସେଇ ବେଳକୁ ନୀଡ଼ ରଚନା କରନ୍ତି । ଉଦାହରଣରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ବମ୍ବେ ଓ ତା'ର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନୀଡ଼ ରଚନା କରନ୍ତି । ବର୍ଷା ବତାସ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭଙ୍ଗୁର ବସାଟିମାନ ଗଢ଼ନ୍ତି, ଏହା ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ । ଝଡ଼ବର୍ଷାରେ ନୀଡ଼ ଭଙ୍ଗି ଧୋଇଯିବାର ଭୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସରବରାହ ସେତେବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ । କାରଣ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୋକ-କୋକ ସାଲୁବାଲୁ । ଅବଶ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଦେଶମାନଙ୍କରେ, ବସନ୍ତ ଓ ଶ୍ରୀଷ୍ଟକାଳରେ ଅବସ୍ଥା ସବୁଠାରୁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବାରୁ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଜନନ ଓ ନୀଡ଼ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଯେତେକ ବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦର ପୋକଜୋକ ବେଶି ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଳନ୍ତି, ସେଇ ସମୟକୁ ଚାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି ପକ୍ଷୀ ବସା ବାନ୍ଧନ୍ତି । ଏଇଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବସା କରିବା ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଭାରତମ୍ୟ ରହେ ।

ଯେଉଁ ରତ୍ନରେ ଯେଉଁ ଜାତି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମିଳେ ଓ ପାର୍ବପାର୍ବିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ସେହି ରତ୍ନରେ ସେ ଜାତି ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜନନ କରିଥାଏ । ଠିକ୍ ରତ୍ନରେ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ରିୟାସୂଚକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉଦ୍‌ବୃଦ୍ଧିରେ ଉତ୍ତରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମନେହୁଏ । ପାଗ ସୁବିଧା ନହେଲେ ଅନେକ ଜାତି ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜନନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ଜଣା ଅଛି । ଗୁଜରାଟର କଟ ଅଞ୍ଚଳରେ (Rann of Cutch) ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ରତ୍ନରେ ମରାମା (Flamingo) ମାନେ ପ୍ରଜନନ କରନ୍ତି । ଏମାନେ ପାଗ ବର୍ଷାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ଓ ଠିକ୍ ପାଗ ନ ହେଲେଯାଏ ରମଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଯେଉଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଅତିଅଧିକ ବା ଅତି କମ୍ ହୁଏ ସେ ବର୍ଷ ସେମାନେ ନାଡ଼ ରଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ପ୍ରଜନନ ରତ୍ନ ଆଖର ହେଲେ, ପକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷ-ସାଜ ଧାରଣ କରନ୍ତି । ଏ ସାଜ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର । ଏ ସମୟରେ ଗୋରୁଏ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ପର ଉଠି-ପାରେ, ଦେହରେ ଏକ ଅଧିକା ବର୍ଣ୍ଣପଟି ଦେଖାଯାଇପାରେ ବା ପର ନବରୂପ ଧାରଣ କରି ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୁଏ । ଉଦାହରଣରେ ନନ୍ଦୀ ବଗ (Cattle egret)ର ମୁଣ୍ଡ ଓ ବେକରେ କମଳା ରଙ୍ଗର ଆଭି ଦେଖାଯାଏ । ବର୍ଣ୍ଣ ସାଜକୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷୀ ସଙ୍ଗୀତମୁଖର ହୋଇଉଠନ୍ତି, ନହେଲେବେଳକୁ ଅନ୍ତତଃ ନିତିନିଆ କାକଲି ସାଜକୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ସୁର ମିଶେ । ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମୟର ଧୂନଠାରୁ ପ୍ରଜନନ କାଳର ସଙ୍ଗୀତମୁଖରତା ଭିନ୍ନ । ସବୁଦିନେ ଯେଉଁ କାକଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ତାହା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ସହଜ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଏ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରର ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଏ ତାହା ପ୍ରଜନନ ବ୍ୟାପାରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା । ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ କେତେକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗାୟକ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଣ୍ଠ-ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ତାହା ହେଲେ ଜଡ଼ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ତା'ର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କ କରିଦେବା । ଅବଶ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଅଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷୀର ସଙ୍ଗୀତ କେବଳ ମାଛ ପକ୍ଷୀକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଅଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷୀର ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରକାର ମାଛ ପକ୍ଷୀକୁ ପତି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରସ୍ତବିତ କରେ କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣାନାହିଁ; ମାତ୍ର ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରି ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷୀର ଉପସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରେ । ତାହା ଆହୁରି ଘୋଷଣା କରେ ଯେ ସେ କେବଳ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସଙ୍ଗୀନ ଆଶାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଉଠୁଛି ଓ ତା' ପାଇଲେ ନାଡ଼ ରଚନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । କୌଣସି

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସୀମିତ ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଗାୟକ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିକରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ପୋଷା ଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ବାଛିବା ପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଣ୍ଟିର ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଶିଆସିଲେ ତା' ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ତାକୁ ହଟାଇଦିଏ । ଏଥିପାଇଁ ତା'ର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା ଉଚ୍ଚସ୍ବର ସଙ୍ଗୀତ । ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ କେମିତି ହେଉ ଅଧିକା ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି । ଉଦାହରଣରେ, ଫୌଜ (Stork) ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ସ୍ବରପେଶୀ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା (ମାଣ୍ଡିବଲ) ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକପ୍ରକାର ଖଟ୍ ଖଟ୍ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି ।

ଅଧିକାଂଶ ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀ ମାଛ ପକ୍ଷୀର ଚିତ୍ର ଜୟକର ଆପଣାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେବେଳେ କୌଣସି ନାଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଣୟ ଅନୁରାଗ (courtship) ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି । ମୟୂରର ନୃତ୍ୟ ଆମର ଅତି ପରିଚିତ । ପକ୍ଷୀ ବା ମନୁଷ୍ୟ, ଯେ କେହି ଉପସ୍ଥିତ ଥାଉ ନାଁ କାହିଁକି ସେ ନିର୍ବିଶେଷରେ ତା'ର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ । ପ୍ରାୟଶଃ, କେହି ନ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନାଚେ । ମାଛ ଭଦ୍ରଭଦ୍ରକଥା ପକ୍ଷୀଟିଏ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ୁ ଉଡ଼ୁ ସହସା ତଳକୁ ଖସିଆସି ଓଲଟି ପଡ଼ି କୌତୁକ ଖେଳ ଦେଖାଏ । ଅଣ୍ଟିର ଶୁକପକ୍ଷୀ ମାଛ ଆଗରେ ହାସ୍ୟକର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ । ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆହୁଏ, ତା'ପରେ ଅନ୍ୟ ପାଦରେ ଠିଆହୁଏ । କେତେକ ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରସହକାରେ ଦେହଭଙ୍ଗୀ କରି ଓ ସରବରେ ପାଦ ପକାଇ ମାଛ ପକ୍ଷୀକୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟୁକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି । ଆଉ କେତେକ ପୁରୁଷ ପକ୍ଷୀ ଶାନ୍ତ ଓ ସତର୍କଭାବେ ପ୍ରଣୟ ନିବେଦନ କରନ୍ତି । ବାୟୁ-ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଡ଼ ରଚନା କ୍ରିୟା ଏକପ୍ରକାର ପ୍ରଣୟ ଅନୁରାଗ । ଯେଉଁ ପୁରୁଷର ମାଡ଼ ଯେଉଁ ମାଛ ବାୟୁ ଚଢ଼େଇର ମନୋହରଣକରେ, ସେ ତାକୁ ପତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରେ । ଅନେକ ପକ୍ଷୀଙ୍କଠାରେ ପୁରୁଷ ମାଛକୁ ଗୋଟିଏ ପୋକ ବା ଉପାଦେୟ ଖାଦ୍ୟ ଟୁକୁରା ଯାଚିବା ପ୍ରଣୟ ନିବେଦନର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ । ପ୍ରାୟଶଃ, ମାଛ ପକ୍ଷୀ ପୁରୁଷର ଆଗ୍ରହ ମିଳାଇବା ପୂର୍ବକା ନେଇ ତା'ଠାରୁ ରୁଚିକର ଭୋଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆଦାୟ କରେ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯୌନ-ମିଳନ । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରମଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ଅଣ୍ଟିର ବା ମାଛ ମାଡ଼ ରଚନା କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି । ଯେଉଁ ପରିବେଶ

ସହୃଦ ପକ୍ଷୀ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥ ସେଇ ପରିବେଶରେ ସେ ନାଡ଼ ରଚନା କରେ । ଏହା ସାଧାରଣ ନିୟମ । ଇଗଲ୍ ପକ୍ଷୀ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବାସକରିବାରେ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥ । ଏଣୁ ସେ ଖୋଲ-ଗିରିଚ୍ଛା ବା ପାହାଡ଼ର ପାସାଣଖଣ୍ଡ ଉପରେ ବସାକରେ । ବୃକ୍ଷବାସୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ଗଛର ପତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦ୍ୟାଳରେ ନାଡ଼ ରଚନା କରନ୍ତି । ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଭୂମି ଉପରେ କଟିନ୍ତି; ଯଥା—ଡାଉର (Partridge) ଓ ପୁଣ୍ଡୁକ ଚଢ଼େଇ (Quail), ସେମାନେ ଭୂମିରେ ଅଣ୍ଟା ଢିଅନ୍ତି । ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଜଳରେ ବାସ କରନ୍ତି; ଯଥା—କର୍ମୋରାଣ୍ଟ (Cormorant) ଓ ବଗ, ସେମାନେ ଜଳ ନିକଟରେ ବସା ବାନ୍ଧନ୍ତି । ଏହାହିଁ ସାଧାରଣ ଧାରଣା; ମାତ୍ର ତା' ଭିତରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ରହିଥାଏ । ଦୁଇଟି ବ୍ୟତିକ୍ରମର ଉଦାହରଣ ନେବା । ବାଂଶ ପାତୁଣ୍ଡ (Bee-eater) ଭୂମିବାସୀ ପକ୍ଷୀ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଟିବନ୍ଧ ବା ନଦୀ ଅତଡ଼ାରେ ଆନୁଭୂମିକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଢିଆର କରୁଥାଏ । ଅନେକ ଜାତିର ପାତୁଣ୍ଡ ଗଛରେ ନାଡ଼ ରଚନା କରନ୍ତି ।

ନାଡ଼ର ଆକାର ଓ ଗଠନରେ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । କେତେକ ଭୂମିଗୁଣ୍ଡ ପକ୍ଷୀ କେବଳ ମାଟିକୁ ଗୋଟିଏ କଡ଼କୁ ଟିକିଏ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ି ଦେଇ ସେଇ ଖାତରେ ଅଣ୍ଟା ଢିଅନ୍ତି । ଅପର ପକ୍ଷରେ ଆମର ସୁପରିଚିତ ବାୟା ଚଢ଼େଇର ବସା ନିଦା ଓ ବେଣ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ପରିଶ୍ରମ ସହକାରେ ଢିଆର ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଉନ୍ମୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ କନ୍ଧ ରହିଥାଏ । ନାଡ଼ ଦେଖିଲେ ମନେହୁଏ ସତେ ଯେପରି ଟୋକେଇ-ଗୁଣାଲିର ନିୟୁଣ କାରିଗର ହାତରେ ଗୁଣାହୋଇଛି । କେତେକ ପକ୍ଷୀ ଗଛର କୋରଡ଼ ବା ଘର କାଛ ଉପରେ ନରମ ପଦାର୍ଥ ବିଛାଇ ସେଥିରେ ଅଣ୍ଟା ଢିଅନ୍ତି, କେତେକ ମାଟିରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଢିଆର କରନ୍ତି; ପୁଣି କେତେକ ଗଛ ଡାଳରେ ଘାସରେ କପ୍ ପରି ବସା ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି । କେତେକ ଜଳଗୁଣ୍ଡ ପକ୍ଷୀ; ଯଥା—ଦଳଫିର୍ମି (Jacana), ସେମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ବସା ଭ୍ରମସାମ ପତ୍ର ଉପରେ ଢିଆର କରନ୍ତି । ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛୁ, କେତେକ ପକ୍ଷୀ ବସା ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜାତିର ଚଢ଼େଇ ଆଖପାଖରେ ଯେ ନାଡ଼ ରଚନା କରୁନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ଅପର ପକ୍ଷରେ କେତେକ ଜାତିର ପକ୍ଷୀ ବସନ୍ତ କଲ ପରି ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ନାଡ଼ ରଚନା କରନ୍ତି । ଏକତ୍ର ବେଣୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ପକ୍ଷୀ ନାଡ଼ ରଚନା କଲେ, ନିରାପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁଖ୍ୟ । ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହି ଯେ ପ୍ରାୟଶଃ ଦୁର୍ବଳ ପକ୍ଷୀ ଭୁଲନାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସବଳ ଓ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ; ଯଥା—ସାରସ (Stork) ଓ ବଗ (Hieron, egret) ମାନେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବସା ଢିଆର କରନ୍ତି । ଅପର ପକ୍ଷରେ ଷ୍ଟ୍ରୁଟ୍ ଓ ନିରାହ ଚରୁଣାଖାବାସୀ ପକ୍ଷୀ (Passerines); ଯଥା—ଦର୍ଜି ଟିକି

ଚଢ଼େଇ (Tailor bird) ଓ ଟିକି ଚଢ଼େଇ (Wren warbler) ଓ ସୁଲୁ (Robin) ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ମାତ୍ର ବାସ କରନ୍ତି ଓ ପକ୍ଷୀବିହାର ଛଡ଼ାକରି ଯୋଗୁଁ ଶହୁ ତାହା ସହଜରେ ସନ୍ଧାନ କରିପାରେନାହିଁ । ଏହାର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ, କ୍ଷୁଦ୍ରତର ପକ୍ଷୀମାନେ ଦୂର ପଥ ଉଡ଼ିଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ; ତେଣୁ ସେମାନେ ବସା କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ସହୃଦ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ କେହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ଅପର ପକ୍ଷରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ବହୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ିଯାନ୍ତି; ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ତାଙ୍କ ସହୃଦ କିଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ତମାୟୀ ଓ ଶାବକକୁ ଆହାର ଦେବାରେ ଅଣ୍ଡିର ଓ ମାଲ ପକ୍ଷୀର ଅଂଶ ପକ୍ଷୀର ଜାତି ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କାମକୁ ଉଭୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଗକରିନିଅନ୍ତି । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପକ୍ଷିଣୀ ବେଶି ଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରେ । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ । ବାଲି ଟେଣ୍ଡେଇ (Painted snipe) ଓ ଦଳଫିର୍ମି (Jacana) ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ପକ୍ଷୀ ଘରର ଅଧିକାଂଶ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରେ । ସେ ଯାହାହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷୀ-ପିତାମାତା-ମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ନିରୁପିତ ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମ କେଇଦିନ ପକ୍ଷିଶାବକ ପ୍ରତ୍ୟହ ନିଜ ଓଜନର ଦୁଇଗୁଣା ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ । ଏତେବେଳେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଗରେ ଚାଲି ପାନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । କୁଆ ଫୁଟିବାଠାରୁ ସାତ ଆଠ ଦିନ ଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟଠାରୁ ଅସ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପ-ମା' ଅବିରାମଭାବେ ଦଉଡ଼ି ଦଉଡ଼ି ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଆଣି ନିୟାନ୍ତ୍ର ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପେଟ ପୂରେନାହିଁ ।

ପକ୍ଷିଶାବକମାନେ ହଂସ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷାପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହୁଥାଏ । ଯେଉଁ ପକ୍ଷିଶାବକମାନେ ସୈ-ସା ହୋଇ ବେଶି ଅଣ୍ଡା ବଢ଼ାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ଆଗ ଆହାର ପଡ଼େ । ଏଣୁ ଯେଉଁ ଶାବକ ସବାପଛରେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଫୁଟିଥାଏ ବା ଯେ ମୂଳରୁ ଦୁର୍ଘଳ ତା' ପାଇଁ ଜୀବନ ଦୁର୍ଘଟ ହୋଇଉଠେ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଳ ଶାବକକୁ ଅନ୍ୟ ଶାବକମାନେ ମାଡ଼ି-ଚକଟି ପକାଇବା ଓ ସେ ମାଡ଼ ବାହାରକୁ ଖସିପଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହୁଥାଏ । ଏସବୁ ମାତ୍ର ଭିତର ଦୁର୍ଘଟଣା । ମାତ୍ର ବାହାରୁ ବିଲେଇ, ଏଣ୍ଡ, ଅ, ମୁଷା, ସାପ, କାଢ଼-

ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯାଇପାରନ୍ତି । ଝଡ଼ ବତାସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ରହୁଥାଏ । ପକ୍ଷୀକୁଆ ନାଡ଼ ଗୁଡ଼ି ଗୁଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ । ଏଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼ିବ, ଅନେକ ଜାତି ପକ୍ଷୀ ଅରକରୁ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ କୁଆ କାଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଓ ଅରକେ ଅନେକ ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େନାହିଁ । ସ୍ୱଭାବତଃ, ବେଶି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପକ୍ଷୀମାନେ ଅରକରେ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି; ଯଥା ପାତ୍ରହଂସ; ବା ପ୍ରଜନନ ରତ୍ନରେ ଅରକରୁ ଅଧିକ ଅର ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଶାବକ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି; ଯଥା—ଛୁନ୍ଦ୍ର ଗାୟକ ପକ୍ଷୀମାନେ । ଯଦି ଅଣ୍ଡା ବା ଶାବକଭର ନାଡ଼ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ବାପ ମା’ ଶୋକରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନାଡ଼ ରଚନା କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି । ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ମୂଳରେ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଳବତ୍ତା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଭାବେ ବାଧା-ବିଘ୍ନ ଏଡ଼ି ଡାହାଁ କରନ୍ତି ।

## ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଦେଶାନ୍ତର-ବାସ (Migration)

ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଦେଶାନ୍ତର ବାସ ପକ୍ଷୀବିଜ୍ଞାନରେ ସବୁଠାରୁ ବଳିଷ୍ଠ କୌତୁକପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆହୁରି ବିଚିତ୍ର କଥା ଏହି ଯେ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇନାହିଁ । ବର୍ଷରେ ଦୁଇଥର, ବସନ୍ତ ଓ ଶରତ୍ କାଳରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଦୀର୍ଘପଥ ଯାତ୍ରାକରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ମହାସାଗର ଓ ମହାଦେଶ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । କି ପ୍ରକାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଫଳରେ ସେମାନେ ଏହା କରନ୍ତି ? ସେମାନେ କାହିଁକି ଏପରି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ ? ସେମାନେ କିପରି ଜାଣନ୍ତି କେଉଁ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ହେବ ?—ଏସବୁ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଯାବତ୍ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବେ ମିଳି ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରସହକାରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳରେ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବ୍ରାଜୀ (migratory) ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ମୁହଁ ପିନ୍ଧାଇ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧରିବା ଫଳରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବେ ଆମର ଯେତକି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ତା'ଠାରୁ ଅତି ଅଧିକ ସତ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇଅଛି ।

ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପରିବ୍ରାଜନର ମୂଳକଥା ହେଲା, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଯିବା ଓ ଫେରିଆସିବା । ଏଭଳି ଯାତ୍ରା କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଓ ସମୟ ସମୟରେ କେଉଁ ଦୁଇ ବୁରି ଦିନ ଭିତରେ ଘଟିବ, ତାହା ଆଗରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ପରି ଜଣାଯାଇପାରେ । ପକ୍ଷୀମାନେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ବାହାର ପୁଣି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ, ପ୍ରାୟଶଃ ସେହି ଉଦ୍ୟାନ ବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ଶୀତ ନିବାସ ଉଭୟର ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ଦୁଇ ନିବାସ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ବହୁ ଶତ ମାଇଲ ହୋଇପାରେ ।

ସ୍ବତଃ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କାହିଁକି କେବଳ କେତେକ ଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଦେଶାନ୍ତର-ବାସ କରନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ସେପରି କରନ୍ତି ନାହିଁ ? ଏହାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉତ୍ତର ଏହି ଯେ କେତେକ ଜାତି ପକ୍ଷୀ ଦେଶାନ୍ତର-ବାସ ଫଳରେ ଦୀର୍ଘତର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି; ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଜାତି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ମୂଲ୍ୟହୀନ । କେତେକ ଜାତି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୀର୍ଘତର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ସାମାନ୍ୟ; କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର କେତେକ ଦେଶାନ୍ତର-ବାସ କଲବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍ବସ୍ଥାନରେ ରହନ୍ତି, ପରିବ୍ରାଜକ ନୁହେଁ ।

ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏପ୍ରକାର ପରିବ୍ରଜନର ଉଦାହରଣ ହେଲା, ଆମର ଚନ୍ଦା (Coot) ଓ ଗୁମଚ ଗୋଳା ବା ଗୁମଚ ଦାଡ଼ (Spoon bill) ପକ୍ଷୀ । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଦେଶାନ୍ତର ବାସରେ ବାହାର-ଯାଆନ୍ତି ଓ ବାକୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ରହନ୍ଥାନ୍ତି । ସେହିମାନେ ରହନ୍ଥାନ୍ତି, ପରିସ୍ରମଣରେ ନ ଯିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ହାନି ହେଉଥିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼େନାହିଁ ।

ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଶରତ୍ କାଳରେ ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମିରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ଛାନରୁ ନିମ୍ନଭୂମିକୁ ଉଡ଼ିଯାନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଏହାର ଓଲଟା ହୁଏ । ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣର ଶୈତ୍ୟକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରକୁ ଉଡ଼ିଯାନ୍ତି । ଏଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼ିବ, ଅନେକ ପକ୍ଷୀ କଠୋର ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାପାଇଁ, ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଳ୍ପ ଶୀତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରି-ସ୍ରମଣରେ ଚାଲିଯାନ୍ତି ଓ ମାତୃଭୂମିରେ ଗରମ ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲବେଳକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତି । ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରିଆସିଲବେଳକୁ ସେଠାରେ ଗଛରେ ଶୀତ ପରେ ନୂତନ ମୁକୁଳର ଉଦ୍ଗମ ହୋଇଥାଏ ଓ ଫୁଲ ଫୁଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥାଏ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ-ପରିବାରର ଭରଣପୋଷଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପୋକଜୋକ ମିଳେ । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶେଷବେଳକୁ ପକ୍ଷୀଶାବକ ବଡ଼ ହୋଇ ସ୍ୱାର୍ଥାନଭାବେ ଚଲିବୁଲି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶରତ୍ କାଳର ପ୍ରଥମ ହେମାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବେ ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପଥରେ ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି । କେତେକ ପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଚିତାନ୍ତ ଅଳ୍ପକାଳ କଟାଉଥିବା ପରି ମନେହୁଏ । ଉଦାହରଣରେ, ଡିଲେର ପକ୍ଷୀ (Rosy Pastor) ମଧ୍ୟ-ଏସିଆରେ ଛୁଆ କରେ; ମାତ୍ର ସେ ମୈ ମାସରେ ଭାରତରୁ ସ୍ୱଦେଶକୁ ବାହୁଡ଼ିଯାଏ ଓ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ବେଳକୁ ଭାରତକୁ ପୁଣି ଫେରିଆସିଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଭାରତରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସକୁ ଚାଲିଆସନ୍ତି ।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ସେଥିରୁ ମନେହୁଏ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରମଯାତ୍ର ଦେଶାନ୍ତର ଯାତାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଓ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି; ମାତ୍ର ପ୍ରହେଳିକା ଏହି ଯେ କେତେକ ପକ୍ଷୀ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ, ସମାନ ଉତ୍ତରକୁ ଓ ସମାନ ଜଳବାୟୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଉଡ଼ିଯାନ୍ତି । ପୁଣି ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ମାତ୍ର କେତେ କଲେମିଟର ପରିବ୍ରଜନରେ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବ୍ରଜନ (Local migration) ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବା ହିତକର



ତାହା ବୁଝିବା କଷ୍ଟ । ଉଦାହରଣରେ, ବମ୍ବେରେ ହଳଦି ବସନ୍ତ (Oriole), ବାଂଶ ପାତୁର (Bee-eater) ଆଦି ପକ୍ଷୀମାନେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକାଳରେ ନଗରସ୍ଥଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅଳ୍ପଦୂର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଉପତ୍ୟକା (Deccan Plateau) ବା ମଧ୍ୟ-ଭାରତକୁ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଓ ଠିକ୍ ସେପଟେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି । ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବ୍ରଜନ ବେଶ୍ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଘଟେ, ଏତିକି ଜାଣିବା ଛଡ଼ା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆନୁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସୀମିତ; କାରଣ ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ପକ୍ଷୀ ଧରି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ମୁହଁ ପିନ୍ଧାଇ ନ ଛୁଡ଼ିଛୁ ଓ ପୁଣି ଧରି ନିର୍ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନ କରିଛୁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଦେଶାନ୍ତର ଭ୍ରମଣ ବିଷୟଟିକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରେ । ଅଧିକାଂଶ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶାନ୍ତର ଭ୍ରମଣ ପ୍ରଜନନ କ୍ରିୟା ସମାପନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ସେମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସିଧାସଳଖ ଯାହା କରିଥାନ୍ତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବାଟେ ଯାଆନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଥରେ ଫେରନ୍ତି । ମାତ୍ର କେତେକ ଦୁଃସାହସିକ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦେଶାନ୍ତର ଭ୍ରମଣ କଥାଟା ଆହୁରି ଅଧିକ ଜଟିଳ । ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ଭୂମିକୁ ଯାନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଛୁଆ ଫୁଟାଇ ଶାବକ ନିଜ କଥା ନିଜେ ବୁଝିପାରବା ଭଳି ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାନ୍ତି । ମନେହୁଏ, ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯତେ ଯେପରି କୁଟି କଟାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ କଟାଇ ସେମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରି ଅଳ୍ପ କାଳ ରହନ୍ତି । ତା'ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶୀତକାଳୀନ ନିବାସକୁ ଉଡ଼ିଆସନ୍ତି । ଏଥିରୁ ଦେଖାଯିବ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପରିବ୍ରଜନ ଅତି ଜଟିଳ ଏବଂ କେତେକଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ଆନୁମାନଙ୍କର ଅବୋଧ । ଆମେ ଏତିକି ଜାଣୁ ଯେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଦେଶାନ୍ତର ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ିଯାନ୍ତି ଓ ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତି । ଏହା ନିୟମିତ ଭାବେ ସାଧିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବର୍ଷର ନିଭନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବାସ୍ତବିକ ବାସସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବା ।

ଫାର୍ସ ପଥ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଦିନଦିନ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥାନ୍ତି । ପେଟୁଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଖାନ୍ତି; ତା'ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେପରି ଅଧିକ ଚର୍ବି ସଞ୍ଚିତ ହେବ ଓ ସେମାନେ ଫାର୍ସ ପଥ ଯାତ୍ରା

ପାରିବେ । ଏପରିକି କେତେକ ପକ୍ଷୀ ପରିବ୍ରଜନରେ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିୟମିତଭାବେ ବ୍ୟାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି । ଉଦାହରଣରେ, ଏକାଠି ଦଳବାନ୍ଧବା ଓ ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଉଡ଼ିଯିବା ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ପରୀକ୍ଷଣଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଘାସ ପଥ ଯାହାରେ ବାହାରିଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଓ ଅସ୍ତର କାଳରୁ । ଏହି ଘାସ ଯାହାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର (କମ୍ପାସ୍) ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଠନ କରୁଥିବା କୋଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ପରିବ୍ରାଜା ପକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦିଗ-ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି । କ୍ରହୁଡ଼ି ଓ କୁଲ୍‌ବିଟିକା ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତା'ଫଳରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦିଗ ହରାଇ ପାରନ୍ତି; ମାତ୍ର ପୁଣି ତାହା ଛାଡ଼ିଗଲେ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗତିପଥ ସଜାଡ଼ି ନେଇପାରନ୍ତି । ଯାହାପଥରେ, ଭୂମି ଉପରେ କିଛି ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଉପେକ୍ଷା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପଥ-ପ୍ରଦର୍ଶକ ଦିନବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ରାତିରେ ତାରା । ପକ୍ଷୀମାନେ ୭୦୦ ରୁ ୧୩୦୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ୁଥିବାରୁ ଭୂମି ଉପରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିହ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉ ନ ଥିବ । ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଭୂମି ଉପରେ ଥିବା ଚିହ୍ନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯେ ଅଳ୍ପ ଏହାର ଅନେକ ବିସ୍ମୟକର ପ୍ରମାଣ ଅଛି । ଅନେକ ଜାତି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରିବ୍ରଜନ କରୁଥିବା ତରୁଣ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଅଲଗା ବାହାରିଯାନ୍ତି । ପକ୍ଷୀମାନେ କେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଦିଗନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଯାହାପଥରେ ପରିବ୍ରଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଯେ ଅକ୍ଷମ, ଏହା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି (instinct) ବୋଲି କହିଥାଉ ।

ଅଳ୍ପ କେତେକ ଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଗୋଟିକିଆ ଭାବେ ପରିବ୍ରଜନରେ ବାହାରିନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ପକ୍ଷୀ ବଡ଼ ବା ସାନ ସାନ ଦଳରେ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ କରାନ୍ତି । ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀ ଅନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନବେଳେ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶାନ୍ତର ଯାହା ସମୟରେ ରାତିରେ ଉଡ଼ନ୍ତି । ସମ୍ଭବତଃ ପରିବ୍ରାଜକମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ, ଅଧିକ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏପରି କରନ୍ତି । କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଯାହାକାଳୀନ ବେଗ ପ୍ରାୟ ଦଶ୍ୱାକ୍ଷେପ କିମ୍ବା କିଲୋମିଟର । ଗୋଟିଏ ପରିବ୍ରାଜକ ପକ୍ଷୀର ଗୋଟିଏ ଦିନର ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଠଦଶା ବୋଲି ହିସାବ କରାଯାଇଅଛି । ସେ ହିସାବରେ, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ

ଗୋଟାଏ ଦୌଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ କିଲୋମିଟର ପଥ ଉଡ଼ିଯାଏ । ବଡ଼ ପକ୍ଷୀମାନେ ଅଟଳ-  
ଭାବେ ଘଣ୍ଟାକେ ପ୍ରାୟ ୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାହା କରନ୍ତି ଓ ତା' ଫଳରେ  
ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି । ସମୁଦ୍ର ପାରହେଲୁବେଳେ  
ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସମୟ ଉଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ । ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଦଳ  
ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଏକାଠି ମିଳେ ୩୭ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ିବାର ଦେଖାଯାଇଅଛି । ଅନେକ ସମୟରେ  
ବିଶେଷ କରି, ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ୁଥିବାବେଳେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ଖରାପ ପାଗ  
ଓ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି । ଏତେବେଳେ ହତାହତ ସଂଖ୍ୟା ପଡ଼ିଯିବାର  
ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ମୋଟ ଉପରେ, ଦେଶାନ୍ତର ଯାହା ସବୁବେଳେ କ୍ଲେଶକର ଓ କଠିନ  
ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ ।

ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜାତି ପକ୍ଷୀ ପରିବ୍ରାଜନ କରନ୍ତି, ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା  
କଷ୍ଟକର । ହସାବ କରାଯାଇଛି, ଯେତେ ଜାତିର ପକ୍ଷୀ ସୁରୋପ ଓ ଏସିଆର  
ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ଜାତ ରଚନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ ୪୦ ଭାଗ  
ପରିବ୍ରାଜୀ ପକ୍ଷୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧକରୁ ଉଣା । ବ୍ରିଟେନ୍ ୭୮ ଜାତି ଗାୟକ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ  
ମଧ୍ୟରୁ ୨୨ ଜାତି ପରିବ୍ରାଜୀ ପକ୍ଷୀ । ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ୧୨୦୦ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି  
ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଜାତି ପକ୍ଷୀ ଶୀତକାଳରେ ଦୂର ଦେଶରୁ  
ଆସିଥାନ୍ତି । ଅନ୍ୟ କଥାରେ କହିଲେ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବ୍ରାଜୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା  
ଆକ୍ଟିଭ୍ ଜନକ ଭାବେ ଉତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟକ । ସୁମେରୁ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଉର୍ବେନ୍ (Arctic  
Tern) ପକ୍ଷୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୁମେରୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଡ଼ିଯାଏ ଓ ପୁଣି ଫେରି-  
ଆସେ । ଏହି ଚକ୍ରପ୍ରମଣ ଯାହାର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୩୫୦୦୦ କିଲୋମିଟର ।  
ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କେତେ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଯାହା ଅସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ ।  
ସୁରୋପରେ ଜାତ ରଚନା କରୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ଶୀତକାଳରେ ଦକ୍ଷିଣ  
ଆଫ୍ରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ିଯାନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଜାତି ସୁରୋପୀୟ ପକ୍ଷୀ ଭୂମଧ୍ୟସାଗର  
(Mediterranean Sea) ଅଞ୍ଚଳର ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ସେଠାରେ ମାତ୍ର  
ଶୀତକାଳଟି କଟାନ୍ତି ।

ଆମ ଦେଶକୁ ପରିବ୍ରାଜନରେ ଆସୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ପକ୍ଷୀ ଶୀତକାଳରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ  
ତାଙ୍କର ଅଣ-ପ୍ରଜନନ (non-breeding) କାଳଟି ଏହିଠାରେ ହିଁ କଟାନ୍ତି; ଆଉ  
କୁଆଡ଼ିକି ଉଡ଼ିଯାନ୍ତି ନାହିଁ । ପୂର୍ବ-ସୁରୋପ, ଉତ୍ତର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆ ଏପରିକି  
ହମାଲୟ ପର୍ବତମାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାତ ରଚନା କରୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ

ଜାତି ପକ୍ଷୀ ଶୀତକାଳରେ ଭରତୀୟ ଉପଦ୍ଵୀପକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଅମ ଦେଶରେ ଦେଶା-  
ଯାଉଥିବା ପରିବ୍ରାଜୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରକୁଳ ଏବଂ ନଦୀ ଓ ହ୍ରଦରେ ପଡ଼ୁଥିବା  
ପାତିହଂସ (Ducks ) ଓ ଜଳଗୁରୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁଠାରୁ ବହୁଳ ।

ଏହି ନିରାଚର ସତ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପରିବ୍ରାଜନ  
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ । କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଓ ଅଧିବାସୀଙ୍କ  
ଭିତରୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ଏ ଦେଶକୁ ଆସିଲବେଳେ ଓ ଏ ଦେଶରୁ ଫେରିଲବେଳେ  
କେଉଁ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଉଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ରହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ  
ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନରଖିବା—ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣୁନା । ପରିବ୍ରାଜୀ  
ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିବରଣୀ ସମୃଦ୍ଧ ପାଇଁ ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଏକ  
ପଇତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନୁସୂଚି ହେଉଅଛି । ତାହା ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ  
ଆଲୁମିନୟମ୍ ମୁଦ ପିନ୍ଧାଇବା । ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଜାଲରେ ଧରି, ମୁଦ ପିନ୍ଧାଇ, ନମୁର  
ଖାତାରେ ଟିପି ରଖି ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଡ଼ିଦିଆଯାଏ । ମୁଦ ସବୁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି  
ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ହୋଇଥାଏ । ମୁଦ ଉପରେ ଏକ ଡମ୍ବିକ ସଂଖ୍ୟା ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ  
ଏବଂ ମୁଦ ପିନ୍ଧାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଠିକଣା ଥାଏ । ତାହାହେଲେ ଦୈବକ୍ରମେ  
ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କେହି ସେହି ପକ୍ଷୀକୁ ଧରିଲେ ବା ପାଇଲେ, ମୁଦ-  
ପିନ୍ଧାଳକୁ ଜଣାଇ ଦେଇ ପାରିବେ । ବମ୍ବେ-ପ୍ରକୃତ-ବିଜ୍ଞାନ-ସମିତି (Bombay  
Natural History Society) ଏକ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ  
ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ପରିବ୍ରାଜୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ  
ମୁଦ ପିନ୍ଧାଇ ଛୁଡ଼ିଦିଏ । ଏହା ଫଳରେ ଗତ ଦଶବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ବହୁ ପରିମାଣରେ  
ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇପାରିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବେ ଆଦୌ ଜଣା ନ ଥିଲା । ଆମର  
କେତେକ ବଣ୍ୟ ପାତିହଂସ ୪୮୦୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରରେ ଯାଇବେଶିଆ  
ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜାତି ପକ୍ଷୀ ବହୁ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ଧର-  
ହେବା ଫଳରେ ବହୁ ଦରକାରୀ ବିବରଣୀ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇପାରିଛି । ଆଲୁମିନୟମ୍  
ମୁଦରେ ଡମ୍ବିକ ନାମ୍ବର ସାଙ୍ଗକୁ ଲେଖାଥାଏ “ବମ୍ବେ-ପ୍ରକୃତ-ବିଜ୍ଞାନ-ସମିତିକୁ ଜଣାନ୍ତୁ”  
ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ।  
ତାହାହେଲେ, କେହି କୌଣସି ମୃତପକ୍ଷୀର ଗୋଡ଼ରେ ମୁଦ ଥିଲେ କ’ଣ କରିବାକୁ  
ହେବ ଜାଣିଥିବେ । ତା’ ନହେଲେ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।  
ଅନେକ ଦେଶରୁ ମୁଦ ଲାଗିଥିବା ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟଭାରତରେ ଧରାହୁଅନ୍ତି । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୁଦ

ଭାରତୀୟ ହେଉ ଅବା ବିଦେଶୀ ହେଉ, ବମ୍ବେ ପ୍ରକୃତ ବିଜ୍ଞାନ ସମିତିଠାକୁ ପଠାଇଦେବା ଭଲ । ତା' ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ହେଲେ, ନମ୍ବରଟି ଠିକ୍‌ଭାବେ ଟିପି, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ, ତାରଣ ଓ ଅଞ୍ଚଳରେ ପକ୍ଷୀଟି ମିଳିଥିଲା, ତାହା ଜଣାଇଦେବେ । ଏ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗମୂଳକ ଉଦ୍ୟମଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭାରତରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରିବ୍ରଜନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇପାରିବ ।


## ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ

ବର୍ଗ ପୋଡ଼ିପିପିଡ଼ିଫର୍ମେସ(Order PODICIPEDIFORMES)  
—ହଂସଭାଳି (Grebe)—ସଦ୍ରପକ୍ଷୀବିଶେଷ, ପ୍ରାୟ ଲଞ୍ଜସ୍ଥାନ ଜଳପକ୍ଷୀ; ଗୋଡ଼ଶରରେ  
ଖୁବ୍ ପଛରେ ଅବସ୍ଥିତ; ପଦାଙ୍ଗୁଳ ପାଲି ପରି (Lobed) ଓ ମଧ୍ୟ-ଶିର ଦୁଇକଡ଼ରେ  
ପକ୍ଷୀ ହାଲୁକାପରି ପଦାଙ୍ଗୁଳ ଦୁଇପଟେ ଝାଲର ପରି ଚର୍ମ ରହିଥାଏ । ଏ ବର୍ଗର ପକ୍ଷୀ  
ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ପରିଚିତ ପକ୍ଷୀ ହେଲା ହଂସଭାଳି  
(Little Grebe) ବା ପାଣିହଂସ (Dabchick) । ଏହି ପକ୍ଷୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ  
ନାମ “ପୋଡ଼ିପିପିଡ଼ିଫର୍ମେସ ରୁଫିକୋଲିସ” (Podiceps ruficollis) ( ବର୍ଣ୍ଣିତ ୧ ) ।  
ହିନ୍ଦୀରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପାନ୍ତୁବି, ତୁବ୍‌ତୁବି ଓ ଲଓର୍‌କୀ ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି । ଏହା ଏକ  
ଦୃଷ୍ଟିପୁଷ୍ଟ, ଛୁଦ୍ର ଧୂସର ବା ମସିଆ—ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ସନ୍ତରଣକାଣ୍ଡ ପକ୍ଷୀ । ଏହାର  
ପେଟପାଖ ରେଣୁମୟ, ଅଳ୍ପ ଛୁଦ୍ର ଓ ଗୋଜିଆ ଏବଂ ଲଞ୍ଜ ନାହିଁ । ପ୍ରଜନନ  
କାଳରେ ଏହାର ମୁଣ୍ଡ ଓ ବେକର ପକ୍ଷ ଘନ ବାଦାମୀ ବା ରକ୍ତାଭ ପାତବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ  
କରେ ଏବଂ ଛାତ ହଳଦିଆ ମୁଖପ୍ରାନ୍ତ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ । ଏହା ପ୍ରାୟ  
ସବୁ ଗାଡ଼ିଆ, ଗାଁ ପୋଖରୀ ଓ ଯୋରରେ ଏକ ଛୁଦ୍ର ହଂସଭାଳିପରି ସନ୍ତରଣ କରୁ-  
ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ଓ ସାମାନ୍ୟ ଭୟର ସୂଚନା ପାଇଲେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡୁବି ମାରେ ।  
ସାନ ସାନ ପୋଖରୀରେ ଏମାନେ ଦୁଇ ବା ତିନୋଟି ଏକାଠି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଯାନ୍ତି;  
ମାତ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ପରୁଣ ବା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ  
ଦେଖାଯାନ୍ତି । ବୁଢ଼ାଲି ଭାବରେ ଏମାନେ ଅତି ପାରଙ୍ଗମ । ଆଖିପିଛୁଳାକେ ହଂସଭାଳି  
ଯେପରି ଭାବେ ସାମାନ୍ୟ ତରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ପାଣି ଭିତରକୁ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ତାହା  
ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ । ଦ୍ଵିଚକ୍ଷୁ ଛୁଟା ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକ (Shotgun) ଫଟାଇଲେ  
ଅନେକ ସମୟରେ ଗୁଳି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହଂସଭାଳି ପାଣି ଭିତରେ ଉଭେଇ  
ଯାଇଥାଏ । ସେମାନେ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଉଠିବାକୁ ପରୁଷ ମୁଖ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଶାନ୍ତଭାବ ହେଲେ  
ପାଣି ଉପରେ କିଛି ବାଟ ଫଡ଼ଫଡ଼ ହୋଇ ପୁଣି ପାଣି ଉପରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି । ସେ  
ଯାହାହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ଛୁଦ୍ର ହେଲେହେଁ ସେମାନେ ଶକ୍ତ ଉଡ଼ାଳି ଓ ଗୋଟିଏ  
ପୋଖରୀର ପାଣି ଶୁଖିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ

ସମୟରେ ବେଶ୍ ଧୂର ପଥ ଉଡ଼ିଯାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ସ୍ବର ଏକ କର୍କଶ ଚପା ସାଙ୍କେତିକ ହର୍ଷଧ୍ବନିପରି । ସାୟୁକାଳରେ ସେମାନେ ଯଥାସ୍ଥତି ଜଳ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଦ୍ର ଓ ଶକ୍ତ ପକ୍ଷର ମୁହଁମୁହଁ ଆନ୍ଦୋଳନଦ୍ବାରା ଫଡ଼ଫଡ଼ ଶବ୍ଦକରି ଏକ ଆରେକକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଆମୋଦ ବିହାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଜଳବାସୀ କାଟ ଓ କାଟ ଶୁଳ, ବେଙ୍ଗଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡା ଓ ଛୁଦ୍ର ଛୁଦ୍ର ମାଛ ସେମାନଙ୍କର ଆହାର । ଏସବୁକୁ ସେମାନେ ତଳୁ ବା ଭସମାନ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଅଥବା ଭୃମ୍ବମାର ବା ପାଣିତଳେ ଅନ୍ଦେସଶକର ପାଆନ୍ତି । ହଂସରାଜର ନୀତି ଖରତାପରେ ସେକି ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଳଜ ଅନାବନା ଗଛର ଡାଳରେ ଉଡ଼ିଆର ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଆଂଶିକ ବୁଡ଼ିଥିବା ଭସମାନ ଗଛ ଉପରେ ରହୁଥାଏ । ସେହିଠାରେ ସେ ଚିନୋଟିରୁ ପାଞ୍ଚୋଟି ଯାଏ ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ଧଳା; ମାତ୍ର ନୀଡ଼ର ଡାଳ ପତ୍ର ସହଜ ଲାଗି ଶୀଘ୍ର ମିଶିଆ ହୋଇଯାଏ । କାରଣ, ଗୋଲମାଲ ହେଲେ ନଭୁବା ଆହାର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଗଲବେଳେ ପ୍ରତି ଥର ହଂସରାଜ ଶ୍ଯାଗୁଡ଼ିକୁ ଖରାରେ ଦର ସେକା ଜଳଜ ଅନାବନା ଗଛ ଡାଳରେ ଡାକି ଦେଇଯାଏ । ଛୁଦ୍ର ଶାବକମାନଙ୍କର ଦେହ କୋମଳ ପକ୍ଷଦ୍ବାରା ଆବୃତ ଥାଏ ଓ ତା' ଉପରେ ଡୋର ଦାଗ ପଡ଼ିଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ଶାବକମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଚଢ଼ି ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ।

**ବର୍ଗ ପେଲିକାନ ଫରମସ (PELICANIFORMES)**—ପେଲିକାନିଡ଼ି (Pelicanidae) ଓ ଫାଲକ୍ରୋକୋରାସିଡ଼ି (Phala-crocoracidae), ଏ ଦୁଇ ପକ୍ଷୀବଂଶ ଏହି ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଦଦରାହଣ (Pelican) ଓ ପାର୍ଟିକୁଆ (Darter) ପେଲିକାନିଡ଼ି ବଂଶର ଏବଂ କର୍ମୋରାଣ୍ଟ (Cormorant) ଫାଲକ୍ରୋକୋରାସିଡ଼ି ବଂଶର ।

ଦଦରାହଣ ଦେଖିବାକୁ ଏକ ଓଜନଦାର ପକ୍ଷୀ ପରି ମନେହୁଏ । ଏହାର ଗୋଡ଼ ଗ୍ରେଟ ଓ ମଜରୁର । ପାଦର ଅଙ୍ଗୁଳି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚର୍ମ ଉତ୍ତମ ବର୍ଦ୍ଧିତ । ଚର୍ମ ବୃହତ୍ବକାୟ ଓ ଚେପଟା । ଏହା ତଳକୁ ଚର୍ମର ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ସଂପ୍ରାପ୍ତଶୀଳ ଧଳା ରହୁଥାଏ । ଏହି ଧଳାଟି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଘାଟିଲାଲ (Landing net) ପରି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଦଦରାହଣର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ମାଛ । ଚଲୁଲ କରିବାପାଇଁ ଏହି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ବୋଲି ମନେହେଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଏମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ବେଶ୍ ହାଲୁକା ଏବଂ ଏମାନେ ଭଲ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ପରି ଏବଂ



ଚିତ୍ର ନଂ 1  
 ହଂସବଳ ବା ପାଣିହଂସ  
 ( Little Grebe or Dabchick )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 31 ଦେଖ





ଚିତ୍ର ନଂ 2  
 ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ଵୀପ  
 ( Spottedbilled or Grey Pelican )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 33 ଦେଖ

ଚନ୍ଦ୍ର ନଂ 3  
ପାଣିକୁଆ  
( Darter )  
ପୃଷ୍ଠା ନଂ 34 ଦେଖ





ଚିତ୍ର ନଂ 4  
 ଛତ୍ର କର୍ମୋରାଣ୍ଟ  
 ( Little Cormorant )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 35 ରେଖା



ଚିତ୍ର ନଂ 5  
 ଗାଈଆ ବଗ  
 ( Grey Heron )  
 ଚିତ୍ର ନଂ 37 ଦେଖ





ଚିତ୍ର ନଂ 6  
ରାଣୀ ବଗ  
( Small Egret )  
ପୃଷ୍ଠା ନଂ 38 ଦେଖ

ଚିତ୍ର ନଂ 7  
ନନ୍ଦୀ ବଗ  
( Cattle Egret )  
ପୃଷ୍ଠା ନଂ 39 ଦେଖ





ଚିତ୍ର ନଂ ୮  
 ଗ୍ରେଟ କାଣ୍ଡିଆ ବନ  
 (Pond Heron or Paddy Bird)  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ ୪୦ ଦେଖ

ଚିତ୍ର ନଂ ୨  
ଚିତ୍ରିତ କୌଷ୍ଠ  
( Painted Stork )  
ପୃଷ୍ଠା ନଂ ୪୨ ଦେଖ







ଚିତ୍ର ନଂ 10  
 ଖୋଲିଆ ବା କାବୁଁସ  
 ( Openbilled Stork )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 43 ଦେଖ



ଚିତ୍ର ନଂ 11  
 ଦ୍ଵାଦଶ ଗିଳା  
 ( Adjutant Stork )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 44 ଦେଖ



ଚିତ୍ର ନଂ 12  
 କଲା ବାଜେଣି  
 ( Black Ibis )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 47 ଦେଖ

ଚିତ୍ର ନଂ 13  
ଶୁମ୍ଭର ଗାଡ଼  
( Spoonbill )  
ପୃଷ୍ଠା ନଂ 48 ଦେଖ







ଚିତ୍ର ନଂ 14  
 ଏକ  
 ( Flamingo )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 50 ଦେଖ

ଚିତ୍ର ନଂ 15  
 ଖର ଛୁଆ  
 ( Barheaded Goose )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 52 ଦେଖ





ଚିତ୍ର ନଂ 16  
 ଲଙ୍କମ ପାଉଁଶଂସ  
 ( Spotbill or Grey Duck )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 53 ଦେଖ

ଶାରଣୀ ଓ ସାରସ ପରି ଖରଚିଆ ଦିନରେ ଦଦରାହଣୀ ବେଶି ସମୟ ଉଚ୍ଚାକାଶରେ ତପ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଉଡ଼ି ଥିବାର ଓ ପକ୍ଷକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଚକ୍ରର ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଦିନ ଧରି ଦଦରାହଣୀ ଭରତରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜାତି ଦଦରାହଣୀ ସାଧାରଣତଃ ଶୀତକାଳରେ ଆମ ଦେଶକୁ ପରିବ୍ରଜନରେ ଆସନ୍ତି । ସେହି ଦଦରାହଣୀ ଏ ଦେଶରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସକରେ, ତା'ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ପେଲିକାନାସ ଫିଲିପେନ୍ସିସ' (Pelicanus Philippensis) (ବର୍ଣ୍ଣିତ ୨) । ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ 'ସ୍ପଟ୍ଟେଡ୍ ବିଲ୍ଡ' (Spotted billed) ଓ 'ଧୂସର ଦଦରାହଣୀ' (Grey Pelican) କହନ୍ତି । ହିନ୍ଦୀରେ ଦଦରାହଣୀ ହାଃପାୟିଲ୍ ଓ କୁରେର ନାମରେ ପରିଚିତ । ଏହାର ଅଣ୍ଡର ଉପର ଫାଳରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଲ-କାଲ ରଙ୍ଗର ଚକ୍କି ଥାଏ ଏବଂ ଅଣ୍ଡ ତଳର ଥଳୀ ମସିଆ ବାଲଗଣୀ ରଙ୍ଗ । ପ୍ରାୟବସ୍ୟେ ଦଦରାହଣୀର ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ ଧୂସରଥା ଧଳା; ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ବାଦାମୀଆସିଥାଏ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଏହାର ପରର ମୂଳ ଅଂଶ କଳା ଓ ଉଡ଼ିଲବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ । ଲଞ୍ଜ ଧୂସର-ବାଦାମୀ । ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣଦ୍ୱାରା ଦଦରାହଣୀକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ହେବ । ଏମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଳରେ ଜୋରମାନଙ୍କରେ ପହଁରି ପହଁରି ମାଛ ଧରିବାର, ଜଳରେ ଭସି ଭସି ବିଶ୍ରାମ ନେବାର, ବା ଜଳରେ ବସି କ୍ଷୁଧାର ଉଦ୍ରେକ ହେବାଯାଏ ତତ୍ତ୍ୱଦ୍ୱାରା ପର ସବୁର ପ୍ରସାଧନ କରିବାରେ ରତଥିବାର ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଏମାନେ ପେଟ ଓ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମାଛ ଖିଲନ୍ତି । କର୍ମୋରୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପରି ଦଦରାହଣୀମାନେ ଏକାଠି ମିଶି ମାଛ ଧରନ୍ତି; ମାତ୍ର ଦଦରାହଣୀମାନେ ଡୁବ ଦେଇ ମାଛଙ୍କୁ ଫିରୁ ଧରନ୍ତିନାହିଁ । କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀ ଅଳ୍ପ ଚୂଷ୍ମାକାରରେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଡେଣାକୁ ପ୍ରବଳଭାବେ ପାଣିରେ ପିଟି ଏକ ମାଛପଲଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଗଭୀର ଜଳକୁ ତଡ଼ି ଆଣନ୍ତି । ଏପରି ଏହି ପରିବେଷ୍ଟିତ ଅଂଶ ଭିତରକୁ ପାଟି ମେଲକରି ଦଦରାହଣୀ-ଗୁଡ଼ିକ ପହଁରି ଆସନ୍ତି ଓ ତଟରେ ଧରିଲ ପରି ମାଛଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡ ତଳର ପ୍ରସାରିତ ଥଳୀ ଭିତରୁ ଅଡେଇନିଅନ୍ତି । ଏମାନେ ଅନାୟାସରେ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି ଓ ବେକକୁ ପଛ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କାଇ ଚେପଟା ଇଂରାଜୀ ଏସ୍ (S) ଅକ୍ଷର ପରି କରି ଉଡ଼ିଯାନ୍ତି । ଦୃଢ଼ ପକ୍ଷର ସ୍ୱଦନ ଫଳରେ ଏକପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱର ମାରିବା ପରି ଶବ୍ଦ ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ଚେପଟା ନୌତଳାକାର ଦେହ ଫୁଲିଡ଼ିବା ଭେଳା କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇଥାଏ । ଦଦରାହଣୀ ଆଉ ପ୍ରଦେଶର ପୁରୀ ଗୋଦାବରୀ ଜଳରେ ମାଡ଼ ରଚନା କରେ । ଭରଣୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ଏହି କେତେକ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ବସାକରି ଅଛନ୍ତି ।



ଦିଅନ୍ତି । ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳବ୍ୟାପୀ ଉଚ୍ଚ ପତ୍ତବହୁଳ ବୃକ୍ଷ ଓ ତାଳଗଛମାନଙ୍କରେ ଏମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଳରେ ବଢ଼ି ଛୋଟ ବସା ବାନ୍ଧନ୍ତି । ଦଉଡ଼ୁଣୀର ନାଡ଼ ବଡ଼ ଓ ଅସୁଉଟା କାଠି ନିର୍ମିତ ମଞ୍ଚାପରି ଦେଖାଯାଏ । ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଲଗାଲଗୁ ହୋଇ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବସା ହୋଇଥାଏ । ଅରକେ ଗୋଟିଏ-ଦୁଇ ଦିନୋଟି ଯାଏ ଅଣ୍ଟା ଢାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଚକଟୁ ପରି ଧୋବ । ଉଷ୍ମ ପାଇ ପାଇ ହମେ ତା'ର ରଙ୍ଗ ମସିଆ-ବାଦାମୀ ହୋଇଯାଏ ।

ପାଣିକୁଆ ଓ କର୍ମୋରାଣ୍ଡ ଫାଲ୍‌କୋ କୋରାସିଡ଼ି ବଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ । ପାଣିକୁଆ (ବର୍ଣ୍ଣିତ ୩) ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ଆନହିଙ୍ଗା ରୁଫା' (Anhinga rufa) । ଏହାକୁ ଇଂରାଜରେ 'ଫଟାଲି' (Darter) ଓ ହିନ୍ଦୀରେ ବେନ୍‌ବ କହନ୍ତି । ଏହା ଏକ କଳା ଜଳପକ୍ଷୀ । ପାଣିକୁଆର ବେକ ସାପପରି ଗାଈ, ମଞ୍ଜନଳ ପରି ମମୂଷ ଓ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର । ମୁଣ୍ଡ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚଞ୍ଚୁ ରୂପ ପରି ଗୋଜିଆ । ଦେହରେ ରୂପେଲ ଧୂସର ଡୋର ଦାଗ ପଡ଼ିଥାଏ । ଲଞ୍ଜ ଲମ୍ବା, ଦୃଢ଼ ଓ ନଳାକୃତ । ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣିକୁଆକୁ ଚିହ୍ନିଆଯାଇପାରେ । ଜୋର, ଗାଁ ପୋଖରୀ, ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ଏହାକୁ ଏକାକୀ ବା ଛୁଦ୍ର ଛୁଦ୍ର ଅଂଶୁଳ ଦଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସମୟ ସମୟରେ ଜୁଆରିଆ ନଦୀ ମୁହାଣମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପାଣିକୁଆ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ସନ୍ତରଣ କଲବେଳେ ଏହାର ଦେହ ଆଂଶିକ ଓ ସମୟ ସମୟରେ ପୁରାପୁରା ଜଳରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହେ; କେବଳ ସାପ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଓ ବେକ ଉଠେଇ ବାହାରରହିଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲାଇ ଓ ଦୋହଲାଇ ସେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ । ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ମାଛ । ପାଣିକୁଆ ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷ ଗୁଡ଼ାଳି ଓ ଗୁଡ଼ାଜାହାଜ ପରି ପାଣି ତଳେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରେ । ଜେଉଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗି ଲିବେଲେ ଟେଲାଲି ଯେପରି ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତରେ ଧରି ଆଗକୁ ଓ ପଛକୁ କରେ, ପାଣିକୁଆ ସେହିପରି ମୁଣ୍ଡ ଓ ବେକ ଆଗକୁ ପଛକୁ କରି ପକ୍ଷ ଅଧା ମେଲାଇ ଡବ ମାରି ମାଛଙ୍କ ପିନ୍ଧୁ ପାଣି ତଳେ ତଳେ ଗୋଡ଼ାଏ । ବେକର ହାଡ଼ (କର୍ଣ୍ଣେରୁକା) ରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗରୁ ଉଦ୍‌ଗତ ହେବା ପରି ଚଞ୍ଚୁ ଉଡ଼ିବେଗରେ ଆଗେଇ ଆସେ ଓ ଛୁଦ୍ର ଜଳୁଆର ପରି ଚଞ୍ଚୁର ତଳ ଫାଳି (ନିମ୍ନ ମେଣ୍ଟିବ୍ଲ) ମାଛ ଦେହରେ ଗଲିଯାଏ । ପାଣିକୁଆ ସାପ ପରି ବେକକୁ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଥରେ ଜୋରରେ ଝାଡ଼ିଦେବା ଫଳରେ ମାଛ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଛୁଟିକି ପଡ଼େ । ଏଥର ସେ ଥଣ୍ଡର ଦୁଇଫାଳ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଧରିନେଇ, ମୁଣ୍ଡଆଡ଼, ଗିଳିଦିଏ । ପାଣିକୁଆର ମୁଣ୍ଡ ଓ

ତନ୍ତ୍ରୀ ଶାଣ ହେଲେହେଁ, ଏହିଠି ଭାବରେ ସେ ଆତ୍ମୀୟଜନକ ଭାବେ ବଡ଼ ଆକାରର ମାଛ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଗିଳିପକାଇଥାଏ । ପରତୁଳ ହେଲେ ସେ ଉଡ଼ିଯାଇ ଠିଆ ବାଗରେ ବସେ; ନହେଲେ ପକ୍ଷ ଓ ଲୁହ ମେଲିକରି ଶୁଖାଏ । ଆତ୍ମୀୟର କଥା, ଏହା ସାରା ଜୀବନକାଳ ଜଳରେ କଟାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପାତିହଂସ ପରି ଏହାର ପକ୍ଷ ଜଳାଭେଦ୍ୟ (ଓଡ଼ିଆରପ୍ରୁଫ୍) ନୁହେଁ । ସେଥିରେ ପାଣି ପଣିଯାଏ ଓ ପାଣିରେ ଘୋଷରା ହେବା ଫଳରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ । ସେଥିଲ୍ଲଗି ପକ୍ଷର କର୍ମକୁଶଳତା ରକ୍ଷାକରିବା ପାଇଁ ହିମାଗତ ତାକୁ ଶୁଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ । ପାଣିକୁଆର ସାଧାରଣ ଡାକ କକିଣ ଓ ଦୁଇଟି ପଦରେ ଗଠିତ ‘ଚି-ଗି, ଚି-ଗି’ । ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ କର୍ମୋରୁଷ୍ଟ-ମାନଙ୍କ ସହୃଦ ମିଶି ରହନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଉଡ଼ିବା ଓ ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସ କର୍ମୋରୁଷ୍ଟ-ମାନଙ୍କ ପରି । ସାଧାରଣତଃ ବନ୍ଧ, ସାରସ ଓ ସେହିପରି ପର୍ଯ୍ୟାୟମାନଙ୍କ ସହ ପାଣିକୁଆ ବୃକ୍ଷରେ ନାଡ଼ ରଚନା କରେ । ଜଳରେ ବା ଜଳ ନିକଟରେ ଥିବା ଗଛରେ ସେମାନେ ବସା କରନ୍ତି । ନାଡ଼ କାଠିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଓ ଅସୁରୁର । ପାଣିକୁଆ ଅନେକ ଦିନୋଟିରୁ ଚାରି ଯାଏ ଅଣ୍ଟା ଢିପ । ଅଣ୍ଟା ଅସ୍ତ୍ରଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଲମ୍ବା; ଦେଖିବାକୁ ଫିକା ସବୁଜଅସିଆ ନୀଳ । ତା’ ଉପରେ ଚକ୍ ପରି ଧଳା ପ୍ରଲେପ ଦିଆଥାଏ ।

**ସ୍ମୁଦ୍ କର୍ମୋରୁଷ୍ଟ (ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର ୪)**—ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଫାଲକ୍ରୋକୋରକ୍ସ ନାଇଗାର’ (Phalacrocorax niger) । ଇଂରାଜୀରେ ଏହା ‘ସ୍ମୁଦ୍ କର୍ମୋରାଣ୍ଟ’ (Little Cormorant) ଓ ହିନ୍ଦୀରେ ପାନ୍ କୋଓ୍ଫା ବା ଗେନହଲ ନାମରେ ପରିଚିତ । ଏହା ଡାମର କୁଆଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼ । ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଏବଂ ଝଙ୍କଝଙ୍କ କରୁଥିବା କଳା ପାତିହଂସ ପରି । କର୍ମୋରୁଷ୍ଟର ଲୁହ ଲମ୍ବା ଓ ଟାଣ ଏବଂ ଅଣ୍ଟା ଶାଣ ଓ ଚଟାଳିଆ । ତନ୍ତ୍ରୀରେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ଚିହ୍ନ ଥାଏ । ମୁଣ୍ଡର ପଛ ଅଂଶ ସାମାନ୍ୟ ଖୁଣ୍ଟିତ ।

ଏକାକୀ, ଷ୍ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟ୍ରୁ ଦଳ ବା ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ଘନ ଦଳବଦ୍ଧଭାବେ ଏମାନେ ଗାଁ ପୋଖରୀ, ଦହ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳଭଣ୍ଡାରମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଅଳ୍ପ ଲୁଗିଆ କୋର ଓ ଜୁଆରିଆ ଡାଡ଼ିମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଶିଳାଗ୍ରସ୍ଥ, ମାଛଧରା ଶୁଖି, ପାଣି ଉପରକୁ ଝଲିଉଠୁଥିବା ବୃକ୍ଷଶାଖାରେ କର୍ମୋରୁଷ୍ଟ ଡେଣା ମେଲି ଖରା ପୁହାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ମାଛ । ସେମାନେ ଘିର ପହୁରାଳି ଓ ଡବାଳି । ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ତଳେ ମାଛକୁ ଧରନ୍ତି । ଦେଖିବାବେଳେ ଦଳେ କର୍ମୋରୁଷ୍ଟ ଏକାଠି ହୋଇ ମାଛ ଶିକାର କରନ୍ତି ।

ଏତେବେଳେ ସେମାନେ ଦଳେ ମାଛକୁ ଗୋଡ଼ାଇ, ତାଙ୍କ ପିତ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଡବ ମାରି, ଉତ୍ତେଜିତ ଭାବେ ଏକ ପକ୍ଷୀ ଆରେକ ସଙ୍ଗେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଓ ଏକ ଆରେକ ଉପରେ ବେଙ୍ଗପରି କୁଦାମାରି, ମାଛକୁ କଣିକିଆ କରି ଘଉଡ଼ାଇ ଆଣନ୍ତି । କର୍ମୋରାଣ୍ଟ ମାଛକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଆଡ଼ ବାଗରେ ଧରି ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠେ ଓ ଦୂଠାରୁ ଉପରଆଡ଼କୁ ଝାଡ଼ିଦେବା ଫଳରେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡପଟିଆ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ମୁଣ୍ଡପଟିଆ ତାକୁ ଗିଲେ । ତା'ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଡୁବି ମାରେ । ଏହିପରି ଚାଲିଥାଏ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକଭାବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଇପରି ଭାବେ ଗିଲିପକାନ୍ତି । କର୍ମୋରାଣ୍ଟ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ତା' ମନ ବୋଧହେଲା ପରି ମନେହୁଏନାହିଁ ।

କ୍ଷୁଦ୍ର କର୍ମୋରାଣ୍ଟ ସହିତ ଆଉ ଦୁଇଟି କଳା କର୍ମୋରାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ 'ବଡ଼ କର୍ମୋରାଣ୍ଟ' (Large Cormorant) ଓ 'ଭାରତୀୟ ସାଗ୍' (Indian Shag) କୁହାଯାଏ । ଏମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଯଥାକ୍ରମେ 'ଫାଲକ୍ରୋକୋରାକ୍ସ କାର୍ବୋ' (Phalacrocorax carbo) ଓ 'ଫାଲକ୍ରୋକୋରାକ୍ସ ଫୁସ୍‌ସିକୋଲିସ୍' (Phalacrocorax fuscicollis) । ବଡ଼ କର୍ମୋରାଣ୍ଟ ଆକାରରେ ଗୁଡ଼ିପାଳିତ ପାଦହଂସ ପରି । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଏହାର ମସ୍ତକ ଓ ବେକ ଧସରିଆ ଧଳା ହୋଇଯାଏ । ଜାନ୍ତୁରେ ଥିବା ଅଣ୍ଟାକାର ବଡ଼ ଧଳା ଚନ୍ଦ୍ର ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ । ସାଗ୍ ମଧ୍ୟଭଳି ଆକାରର । ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଜଣେ ତାକୁ ବଡ଼ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର କର୍ମୋରାଣ୍ଟ ବୋଲି ଭ୍ରମ କରିପାରେ । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଆଖି ପଛକୁ ଗୋଲ୍ଲିଏ ଧଳାରଙ୍ଗର ପର ଉଠେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଓ ବେକରେ କେତେକ ଧଳା ଫୁଟଫୁଟିଆ ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ । ସବୁଜାତି କର୍ମୋରାଣ୍ଟ ଜଳ ଭିତରେ ବା ନିକଟରେ ଥିବା ଗଛରେ ବସି ଓ ସାରସଙ୍କ ଗହଣରେ କାଠିରେ ଅଗଣ୍ଡର ମାଡ଼ ରଚନାକରନ୍ତି । ଅରକରେ ଟରୁ ଟଟି ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । ରଙ୍ଗ ଫିକା ମାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ତା' ଉପରେ ଚକ୍ ପରି ଧଳା ରଙ୍ଗର ପ୍ରଲେପ ପଡ଼ିଥାଏ । କର୍ମୋରାଣ୍ଟର ଜାତି ଅନୁସାରେ କେବଳ ଅଣ୍ଟାର ଆକାରରେ ପ୍ରଭେଦ ଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ।

ବର୍ଗ ସକୋନିଫର୍ମେସ୍ (CICONI FORMES)—ଏହି ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଂଶର ପକ୍ଷୀ ଭାରତରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି; ଯଥା—ଆରଡେଇଡ଼ି (Ardeidae) (ବଗ), ସିକୋନିଡ଼ି (Ciconidae) (ସାରସ), ଥ୍ରେସ୍କିଓର୍ନିଥାଇଡ଼ି (Threskiornithidae) (ଧଳା ବାଜେଣି, କଳା ବାଜେଣି) ଓ ଫେନିକୋପ୍‌ସିଡ଼ି (Falconidae) (ଫାଲ୍‌କନ୍) ।

teridae) (ମର୍କ ବା Flamingo) ।

ବଗମାନେ ଲମ୍ବାଗୋଡ଼ିଆ । ଏମାନଙ୍କର ଅନୁଜଙ୍ଘ (Tibia) ଆଂଶିକଭାବେ ଅନାବୃତ; ଅର୍ଥାତ୍ ପରଦ୍ୱାରା ଢଙ୍କା ନୁହେଁ ଓ ଲମ୍ବା ପଦାଙ୍ଗ ଲି ମଧ୍ୟରେ ପାଦ-ଜାଲ ନଥାଏ । ସେମାନଙ୍କର ବେକ ଲମ୍ବା, ପାତଳ ଓ ନମନୀୟ ଏବଂ ଅଣ୍ଟା ବଛାଁ ପରି ଓ ସୁସ୍ଥାଗ୍ର । କାଣ୍ଟିଆ ବଗ (Grey heron) ବଗମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଆରଡିଆ ସାଇନର୍ଆ’ (Ardea cinerea) (ବର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ୫) । ଓଡ଼ିଶାରେ କାଣ୍ଟିଆ ବଗକୁ ସ୍ଥାନବିଶେଷରେ ମାଟିଆ ବଗ ଓ ବଡ଼ କାଙ୍କ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି । ହିନ୍ଦୀରେ ଏହା ନାରି କାବୁଡ୍ ଓ ଅଞ୍ଚଳ ନାମରେ ପରିଚିତ । ଏହା ସାରସ ପରି ଏକ ଦୀର୍ଘଦେହୀ, ଅନାବୃତ ପଦ୍ମ ଜଳାଭୂମି ପକ୍ଷୀ । ଏହାର ପିଠି ପାର୍ଶ୍ୱଶିଆ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡର ଚୂଡ଼ା ଓ ବେକ ଧଳା; ପେଟପାଖ ଧୂସରୀଆ ଧଳା । ଏହାର ବେକ ଲମ୍ବା, ଯାହା ଓ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର S (ଏସ୍) ଆକାରର । ମୁଣ୍ଡ ଅଣଓସାରିଆ; ଚଞ୍ଚୁ ମଜବୁତ, ଗୋଜିଆ ଓ ଛୁରପରି । ଏହି ପକ୍ଷୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା—ପଟ୍ଟାତ୍ କପାଳ ଅଂଶରେ ଥିବା ଦୀର୍ଘ କଳା ଚୂଳ, ଛୁତରେ କଳା ଡୋରୀଆ ଦାଗ ଥିବା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପରି ଏବଂ ବେକରେ ସାମନା ପଟେ ମଧ୍ୟ-ସ୍ଥଳରେ ଢଳକ ଖସିଯାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଟିପଟିପିକିଆ କଳାରେଖା । ମାଛ କାଣ୍ଟିଆ ବଗ ଦେଖିବାକୁ ଅଣ୍ଟିର ପରି; ମାତ୍ର ତାର ଚୂଳ ଓ ଛୁତର ପରି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସାନ । କାଣ୍ଟିଆ ବଗ ସାଧାରଣତଃ ମୁଣ୍ଡକୁ କାନ ଭିତରେ ଗୁଞ୍ଚି ଆଣି ଏ ପାଣିରେ ଏକଟିଆ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ଠିଆହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ମନେହେବ, ଯେପରିକି ନିସୋଡ଼ ନଦରେ ଶୋଇଯାଇଛି; ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ, ଅଣ୍ଟାରେ ମାରିପାରିବା ଭଳି ପାଖକୁ ମାଛ ବା ବେଙ୍ଗଟି ଏଆସୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟକରିବା ପାଇଁ ତା’ର ସଜାଗ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ନିବିଷ୍ଟ ଥାଏ । ଅନେକ୍ଷିତ ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ, କାଣ୍ଟିଆ ବଗ ତା’ର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରସାରଣଶୀଳ ବେକକୁ ଲମ୍ବାଇ ମାଛକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚଳ ରହେ । ଅନନ୍ତର ସେ ତା’ର ସରୁ ଫଳ୍ଗାବଣିଷ୍ଟ ଡରବାର ପରି ହୋଇଥିବା ଅଣ୍ଟାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବେଗରେ ମାଛ ଦେହରେ ଢଳକରେ ଅଥବା ଅଣ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ତା’କୁ ଧରିପକାଏ । ପଟାପଟ୍ ଉପର ଆଡ଼କୁ ସଂସ୍ଥାନନଦ୍ୱାରା ସେ ମାଛଟିକୁ ବାଗରେ ଧରି ମୁଣ୍ଡପଟିଆ ଗିଳିଦିଏ । ଉଡ଼ିଲା ବେଳେ କାଣ୍ଟିଆ ବଗ ପ୍ରବଳ ଅଧର ଦୃଢ଼ଭାବେ ପକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ । ଏତେବେଳେ ବେକ ଧୂସରଭାବେ ଭିତରକୁ ଗୁଞ୍ଚିଯାଏ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇ କାନ ମଧ୍ୟରେ ରହେ । ଉଡ଼ିଲା ବେଳର ଏହି ଠାଣି ବଗ (Heron) ବଗର ବିଶେଷତ୍ୱ । ଏ ସମୟରେ ଲମ୍ବା ଗୋଡ଼

ଦୁଇଟି ଲୁହ ତଳେ ଗୁଡ଼ି ହୋଇ ପଛ ଆଡ଼କୁ ବାହାର ରହିଥାଏ । ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏକପ୍ରକାର ଗନ୍ଧର, କର୍କଶ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏଡ଼ବ୍ୟାଟ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ କରିବାର ଜଣାନାହିଁ । କାଣ୍ଟିଆ ବଗ କାଠି ଓ ଦାସ ଇତ୍ୟାଦିରେ ନାଡ଼ ରଚନାକରେ । ତାହା ଏକ ସ୍ମୃତ ମଞ୍ଚାପରି ଓ ତା' ମଝି ଅଂଶ ଖାଲୁଥା । ସାଧାରଣତଃ ଜଳ ନିକଟରେ ଗଛମାନଙ୍କରେ ସେ ବସାକରେ । ପ୍ରାୟଶଃ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ବଗମାନଙ୍କର ନାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ କାଣ୍ଟିଆ ବଗର ବସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେ ଥରକେ ଦିନୋଟିରୁ ଛଅଟି ଯାଏ ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ଅଣ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପରି ସବୁଜ ।

କାଣ୍ଟିଆ ବଗ ଭୂମିରେ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଛୋଟ ଅଥଚ ଦେଖିବାକୁ ଓ ହାବଭାବରେ ଏକାପରି ଆଉ ଏକ ଜାତି ବଗ ଜଳାଭୂମିମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ‘ବାଇଗଣୀ ବଗ’ (Purple heron) ବୋଲି କହନ୍ତି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଆରଡିଆ ପାରପୁରା’ (Ardea Purpurea) । ଏହାର ପିଠିପାଖ ମାଲାର-ଧୂସର ବା ବାଇଗଣୀ-ଧୂସର ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଓ ବେକ ଲାଲ ବା ବାଦାମୀଆସିଥା । ତଳପାଖ ବାଦାମୀ ଓ କଳା ।

ଆଉ ଦିନି ଜାତି ଧଳା ବଗ ଜଳାଭୂମିରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଲେ ‘ବଡ଼ ବଗ’ (Large egret), ‘ମଝିଆ ବଗ’ (Median egret) ଓ ‘ସାନ ବଗ’ (Small egret, Little egret) । ‘ବଡ଼ ବଗ’ ଆକାର ଓ ଗଢ଼ଣରେ ‘ବାଇଗଣୀ ବଗ’ ପରି; ମାତ୍ର ବରଷା ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଓ ସାଧାରଣତଃ ଏକାକୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଇଗ୍ରେଟା ଆଲ୍‌ବା’ (Egretta alba) । ‘ମଝିଆ ବଗ’ ଅଳ୍ପ ସାନ । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଇଗ୍ରେଟା ଇଣ୍ଟରମିଡିଆ’ (Egretta intermedia) । ‘ସାନ ବଗ’ର (ବର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର-୬) ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଇଗ୍ରେଟା ଗାରଜେଟ୍ଟା’ (Egretta garzetta) । ହିନ୍ଦୀରେ ଏହାକୁ ‘କରଚିଆ ବଗ୍‌ଲ୍’ କହନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାନବିଶେଷରେ ଏହାର ଅନେକ ନାମ ଅଛି; ଯଥା—ବଗ, ଝୁଲିଆ ବଗ, ରାଣୀ ବଗ ଓ ଚୁଲିଆ ବଗ । ଏହାର ଆକାର ଗୃହପାଳିତ କୁକୁଡ଼ା ବା ନନ୍ଦୀ ବଗ (Cattle egret) (ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖନ୍ତୁ) ପରି । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ସବୁ ଜାତି ଧଳା ବଗମାନଙ୍କର ପିଠିରେ ଆଲଂକାରିକ ଫିଡା ପରି ପରି ଉଠେ । ତଳିତ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏହିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଓ ଆମେରିକାରେ ମହଲୀମାନଙ୍କର ପୋଷାକରେ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ପୋଷାକ-ନିର୍ମାତା

ମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଏପରି ପରର ଗୃହ୍ୟ ଥିଲା । ପର-ବ୍ୟବସାୟ ଏଭଳି ଲଭଜନକ ଥିଲା ଓ ସେଥିଲିଙ୍ଗି ଏତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଗ ସବୁ ମରାହେଲେ ଯେ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଗ ସବୁ ଲେପପାଇଯିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲେ । ଜାହାଜରେ ବଣ୍ୟପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପର ନେବାଆଣିବାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟ କଟକଣା, ବଗ ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ ଭାବେ କମିଯାଇଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପକ୍ଷୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଲିଙ୍ଗି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ ମହଲାମାନଙ୍କର ଫେସନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ବଗ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ; ନତେଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଅବଲୁପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ।

**ନନ୍ଦୀ ବଗ** (ବର୍ଣ୍ଣିତ ୭)—ଓଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ ଗାଈଗୁଡ଼ିବଗ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି । ହିନ୍ଦୀ ନାମ ସୁରଖିଆ ବଗଲ ଓ ଗାଈ ବଗ୍ଲ; ଇଂରାଜୀରେ ‘ଗାଈ ବଗ’ (Cattle egret) । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ବୁବୁଲକାସ ଇବିସ’ (Bubulcus ibis) । ଏହା ଗୋଟିଏ ଧଳା ବଗ ଓ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ଚୁଲିଆ ବଗ (Little egret) ପରି । ତା’ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭେଦ ବାରିହେବ । ନନ୍ଦୀ ବଗର ଥଣ୍ଡା ଅଧିକା ମଜବୁତ୍ ଏବଂ କଲା ନ ହୋଇ ହଳଦିଆ । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଏହାର ମୁଣ୍ଡ, ବେକ ଓ ପିଠିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ବା ପୀତ-ଆସିଆ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ଏହା ପର ଉପେ ଏବଂ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ ହୋଇନପାରେ । ଏହା ଚୁଲିଆ ବଗ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଳାଭୂମିବାସୀ ବଗମାନଙ୍କ ଭୁଲନାରେ ପାଣି ଉପରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଳ୍ପ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ପ୍ରାୟଶଃ ପାଣି ପାଖରେ ନ ରହି ଏମାନେ ଏକାକୀ ବା ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଚରୁଥିବା ଗାଈମାନଙ୍କ ପିଛା ଧରିବାର ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ଥଳବାସୀ କୀଟପତଙ୍ଗ । କୀଟ ଶିକାର କରିବାପାଇଁ ନନ୍ଦୀ ବଗ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଗାଈମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭିତରଦେଇ ଏପଟ ସେପଟ ଦୌଡ଼ିବାର ଦେଖାଯାଏ । କୀଟପତଙ୍ଗ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କଡ଼କୁ ପଳାଇ ଗଲବେଳେ ସେ ଲମ୍ଫିଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରେ । ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଭଲଭାବେ ଚଉକିଁ ଗ ପକ୍ଷୀବେକ୍ଷଣ କରିପାରୁବା ପାଇଁ ଖାଇର ପିଠି ଉପରେ ବସି ଯାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଘାସ ଉପରେ ଗାଈ ଗୁଲିଗଲବେଳେ ଝିଙ୍କିକା ଓ ଅନ୍ୟ ପତଙ୍ଗମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ପଳାନ୍ତି, ଆଉ ନନ୍ଦୀ ବଗ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାଏ । ସେ ତା’ର ଦୀର୍ଘ ବେକକୁ ସଂପ୍ରସାରିତ କରି ମୁନୁଆ ଥଣ୍ଡାରେ ପଳାଇଯାଉଥିବା କୀଟମାନଙ୍କୁ ଧରି ଖାଏ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଗାଈର ପିଠି, ପେଟ କାନରେ ଲାଗିଥିବା ଚକ୍ରପାୟୀ ମାଛ ଓ ଅନ୍ୟ ପରିଜାବା କୀଟମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କି ଖାଇଦିଅନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ନନ୍ଦୀ ବଗ ଗାଈ-ମଝିପରି

ପିଠି ଉପରେ ପରିତୁଳ୍ପ ସହକାରେ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲୁଥିବା କିଛି ଜାତି ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ନନ୍ଦୀ ବଗମାନେ ଆଦୃତ ଗଛରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ବାସକରନ୍ତି । ଏ ଗଛରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କାଉଁ, ଗ୍ରେଟ କାଣ୍ଟିଆ ବଗ (Pond heron) ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବାସକରିବାର ଦେଖାଯାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତଗଲେ ନନ୍ଦୀ ବଗମାନେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ବିକର୍ଣ୍ଣ ରେଖାରେ (diagonal lines) ବା ଅସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆଦୃତ ଗଛକୁ ଗୁଣ୍ଡିଆପନ ପାଇଁ ଉଡ଼ିଆସନ୍ତି । ଏତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବେକ ପଛଆଡ଼କୁ ଘୁର୍ଣ୍ଣି ରହୁଥାଏ, ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇ କାନ୍ଧ ଭିତରେ କୁଜ ପରି ରହେ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଲୁହ୍ମତଳେ ଜାକ ହୋଇ ପଛ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଥାଏ । ସେମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଗଛରେ ମାଡ଼ ରଚନା କରି ଅଣ୍ଟା ଦେଇ ଛୁଆଁ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ଗ୍ରେଟ କାଣ୍ଟିଆ ବଗମାନଙ୍କ ସହଜ ଏକାଗଛରେ ବସା କରନ୍ତି । କେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ଗଛରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ପକ୍ଷୀ; ଯଥା—ନନ୍ଦୀବଗ, ପାଣିକୁଆ, କର୍ମୋରାଣ୍ଟ ଓ ଧଳା ବଗମାନଙ୍କର ମାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ନନ୍ଦୀ ବଗର ମାଡ଼ କାଉଁ-ବସା ପରି କାଠିରେ ଅସୁରୁର ଭାବେ ଦିଆର ହୋଇଥାଏ । ଏମାନେ ଗହଳିଆ ଗଛରେ ମାଡ଼ ରଚନା କରନ୍ତି । ପାଣି ପାଖରେ ଥିବା ଗଛରେ ଯେ ବସା କରିବେ ଏପରି କିଛି କଥା ନାହିଁ । କୋଲାହଳମୟ ସହର ବା ଗାଁ ବଜାର ଭିତରେ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଏମାନେ ବସା କରିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଥରକେ ନନ୍ଦୀ ବଗ ଦିନୋଟିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଯାଏ ଅଣ୍ଟା ହିଏ । ଅଣ୍ଟାର ରଙ୍ଗ ମସିଆ—ସରକଡ଼ା-ଦୁଧରେ ମାଲରଙ୍ଗ ମିଶିଲେ ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେହିପରି ।

ବଗବନ୍ଧର ଆଉ ଏକ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ହେଲା ଗ୍ରେଟ କାଣ୍ଟିଆ ବଗ (ବର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ୮) । ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ‘ଗଡ଼ିଆ ପକ୍ଷୀ’ (Pond bird) ଓ ‘ଧାନଛେତ ପକ୍ଷୀ’ (Paddy bird) ବୋଲି କହନ୍ତି । ହିନ୍ଦୀ ନାମ “ଅରା ବଗଲ୍” । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଆରଡିଓଲା ଗ୍ରେୟୀ’ (Ardeola grayii) । ଏହା ଆକାରରେ ଦେଶୀ ଗୃହ-ପାଳିତ କୁକୁଟୀର ଆକାର ପରି । ବସିଥିଲାବେଳେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଛାସତ୍ ପୀତ ରଙ୍ଗର ଡୋରାଆ ଦାଗ ପଡ଼ୁଥିବା ମାଟିଆ ବାଦାମୀ । ଉଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ଲୁଚି ରହୁଥିବା ଚକଚକ ଧଳା ଡେଣା ଓ ଲୁହ୍ମ ପ୍ରତିଭୂତ ହୁଏ । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଏମାନଙ୍କର ପିଠିରେ ବାଦାମୀ-ଆସିଆ ଗାଡ଼ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କେଶ ପରି କୋମଳ ପରି ସବୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚାତ୍ କପାଳ ଅଂଶରେ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ସଫେଦ ବୁଡ଼ାପରି ପକ୍ଷ ଉଠେ । ଏହା ଫଳରେ ଗ୍ରେଟ କାଣ୍ଟିଆ ବଗ ମସିଆ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ପକ୍ଷୀରେ ପରିଣତ

ହୁଏ । କାଦୁଆ ଚଢ଼ିଆ, ଗୋଲିଆ ଟୁବ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବେଙ୍ଗ, କାଦୁଅ ପଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ମାଛ ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ା ବାସକରନ୍ତି, ସେଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ କାଣ୍ଟିଆ ବଗ ଏକ, ଦୁଇ ବା ତିନି ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଜନଗହଳି ସହର ଭିତରେ ରହୁଥିବା କରୁ କୁଅ ଓ ମନ୍ଦିରର ପୋଖରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପାଣିରେ ଭରିଯାଇଥିବା ଖାଲୁଆ ଜାଗାସବୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭେଜନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛୋଟ କାଣ୍ଟିଆ ବଗ ଆସି ଜୁଟନ୍ତି । ଦବିଯାଉଥିବା ପଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିବା ଖାତକଳରେ ଛୋଟ କାଣ୍ଟିଆ ବଗ କାନ୍ଦି ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ରଖି କୁଜା ହୋଇ ନିଶ୍ଚଳଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ବିପଦ ନାହିଁ ଭାବି ବେଙ୍ଗ କି ମାଛଟିଏ ତା'ର ଲମ୍ବା ପ୍ରସ୍ଥେପଶଣୀଳ ବେକ ଓ ବଛୁ । ପରି ମୁନିଆ ଥଣ୍ଡା ପାହାନ୍ତା ଭିତରକୁ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ଗାଈର ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାଏ । ସମୟେ ସମୟେ ସେ ବେକକୁ ଆଗକୁ ଲମ୍ବାଇ, ଥଣ୍ଡାକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ରଖି, ଚାରିଆଡ଼କୁ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟିଦେଇ ପାଣି ଭିତରେ ଛପି ଛପି ଗୋଟିଏ ପାଦ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଉଠାଇ ପକାଇ ପାଦେ ପାଦେ ଆଗେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯେଉଁଠି ଉତ୍ସାହିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନ ଥାଏ, ସେଠାରେ ଛୋଟ କାଣ୍ଟିଆ ବଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ ଓ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଏ । ଗାଁ ଭିତରେ ଯୋବା ଲୁଗା କାଚୁଥିଲା ବେଳେ ବା ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ କଥା ହେଉ ହେଉ ଗଲା, କଳସୀରେ ପାଣି ଭରିଲାବେଳେ ମାତ୍ର କେଇ ମିଟର ଦୂରରେ ଛୋଟ କାଣ୍ଟିଆ ବଗ ନିର୍ଭୟରେ ପାଣିକଳରେ ଠିଆହୋଇଥାଏ; ନ ହେଲେ ଆହାର ମିଶ୍ତ୍ର ଗୋଡ଼ାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଭୟର ସୂଚନା ପାଇଲେ, ସେ କର୍କଶ ସ୍ୱରରେ ରବ ଦେଇ ପକ୍ଷ ବିସ୍ତାରକରେ । ଏତେବେଳେ ହଠାତ୍ ତା'ର ବରଫ ପରି ଶୁଭ୍ର ପକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ସେ ସାଧାରଣ ବଗ ଠାଣିରେ ଉଡ଼ିଯାଏ । ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ ଛୋଟ କାଣ୍ଟିଆ ବଗ ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ଆଦରୁଥିବା ଗଛ ଉପରେ ରହି ଯାପନ ପାଇଁ ଜମାହୁଅନ୍ତି । ସେମାନେ କାଉ ପରି କାଠିରେ ନିଜ ରଚନା କରନ୍ତି । ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସହର ଓ ଗାଁ ମଝିରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପରେ ବସା ବାନ୍ଧନ୍ତି । ବସା ଯେ ଜଳ ନିକଟରେ ଥିଆଉ ହେବ, ଏପରି ନୁହେଁ । ଥିବା ସମୟରେ ଗଛରେ ସେମାନଙ୍କ କାଉ ବ୍ୟତୀତ ଧଳା ବଗ (White egret), ନିଶା ବଗ (Night heron) ଇତ୍ୟାଦି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବସା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ବର୍ଷ ପରେ



ବର୍ଷ ସେଇ ଏକାଗଛରେ ଛୋଟ କାଣ୍ଡିଆ ବଗ ନଡ଼ ରଚନା କରିଥାଏ । ଥରକେ ତିନୋଟିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ । ଡିମ୍ବର ବର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଡର ସବୁଜ-ଆସିଆ ନୀଳ ।

**କ୍ରୋସ (Storks)**—ଏହା ସିକୋନିଡ଼ି (family ciconiidae) ବଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । କ୍ରୋସ ବା ସାରସ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ବଡ଼ ବଗ (heron) ମାନଙ୍କ ପରି । ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବା, ଅନୁଜଞ୍ଝ (tibia) ଅନାବୃତ, ବେକ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ ଭାସ, ହମଣ ସରୁ ଓ ଗୋଜିଆ । ସାରସ ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ବଗ ବୋଲି ଭ୍ରମ ହେବନାହିଁ । କାରଣ, ବଗ ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ସେମାନେ ବେକକୁ ଛାଣି ଟୋଳିଆ ଇଂରାଜୀ ଏସ୍ (S) ଅକ୍ଷର ପରି କରିଥାନ୍ତି; ମାତ୍ର ସାରସ ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ବେକ ଆଗକୁ ଲମ୍ବିରହୁଥାଏ । ବଗମାନଙ୍କର ସ୍ଵର ପେଣୀ (Voice muscles) ନଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଵର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ । କେବଳ ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଡଙ୍ଗିରୁ ଏକତ୍ରକାର ଅନୁକ ଗାଁ-ଗାଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଥାଏ । ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ (ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ) ମାଛ ଅଣ୍ଟିର ଉଭୟ ଅଙ୍ଗରେ (mandibles—ନମ୍ବ ହନୁ) ଅଷ୍ଟ ବଜାଇ ଜୋର୍ରେ ଡେ ଖଡ଼ ଢେ କରିଥାନ୍ତି । ଭରତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ବଂଶର ଏକ ସାଧାରଣ ଓ ଚମତ୍କାର କ୍ରୋସ ହେଲା ଚିହିତ କ୍ରୋସ (Painted Stork) (ବର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର 9) । ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ‘ଫେଙ୍ଗହଲ’, ‘ଦୋଶ’ ଓ ‘କେଙ୍କାସ’ କହନ୍ତି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଇବିସ ଲିଉକୋସେଫାଲସ’ (Ibis leucocephalus) । ଚିହିତ କ୍ରୋସ ଶାରୁଣୀ ପରି ବଡ଼ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଓ ତଳୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରଯାଏ ଏକ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ହୁଏ । ଏହାର ପିଠି ଉପରର ଧଳା ପରିରେ ଚକଚକିଆ ସବୁଜ-କଳା ରଙ୍ଗର ପଟା ଦାଗ ଘନଭାବେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଗୁଡିର ଧଳା ପରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦାଗ ଥାଏ । ଲୁହ ପାଖର କୋମଳ ପରି (Secondaries—ଗୋଣ ପରି) ଚମକାର ଗୋଲପା-ପାତ ବର୍ଣ୍ଣର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପକ୍ଷୀର ନାମ “ଚିହିତ କ୍ରୋସ” ହୋଇଅଛି । ଏହାର ମୁଖ ପର-ଦ୍ଵାରା ଆବୃତ ନୁହେଁ ଓ ହଳାଦିଆ ମହମ ବର୍ଣ୍ଣର । ହଳାଦିଆ ଓଜନିଆ ଅଖର ଅଗଭାଗ ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼ । ଦହ ଓ ଜଳାଭୂମିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ଵୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଅନ୍ୟ କ୍ରୋସ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ (Storks) ପରି “ଚିହିତ କ୍ରୋସ” ଦିନସାରା ଜଳାଭୂମି ବା ଅଗଭାଗ ଜଳ ଭିତରେ ଆହାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବେ କୁଜା ହୋଇ ଠିଆହୋଇଥାଏ, ନଡ଼ିବା ମାଛ ଓ ବେଙ୍ଗ ଧରିବା ପାଇଁ ଧୀର୍ଘର ଭାବେ ଏ ବାଟେ ସେ ବାଟେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ । ମାଛ ଓ ବେଙ୍ଗ ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ

ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା' ସାଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ଜଳବାୟୀ ପୋକ, କଙ୍କଡ଼ା ଓ ଗେଣ୍ଡା ଆଦିର କରଥାନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟର ଜଳରେ ଆଧାର ଧରି ଖାଇବାର ଗୁଡ଼ି କୌତୁହଳ ଉଦ୍ଦୀପକ । ବେଳକୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ନୁଆଁଇ, ଅଣ୍ଟକୁ ମେଲ କରି ଏମାନେ ଧୀରେ ପାଣି ଭିତରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି । ଏତେବେଳେ ଅଣ୍ଟା ଅଂଶିକ ପାଣି ଭିତରେ ଗୁଡ଼ିରହୁଥାଏ, ନିଶ୍ଚଳ ବା ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାଏ ଓ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ପଛକୁ ହୋଇ ପାଣିକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରି ସେ ଆହାର ଜୀବକୁ ମେଲ ଅଣ୍ଟା ଆଡ଼କୁ ଦଉଡ଼ାଇଥାଏ । ଆହାର ପ୍ରାଣୀକୁ ଦଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାଦକୁ ଏପଟ ସେପଟ କଲବେଳେ, ହଠାତ୍ କରି ସେ ସେଇ ପଟର ପକ୍ଷକୁ ମେଲକରି ଦିଏ; ଫଳରେ ପାଣିରେ ତା'ର ଛୁଇ ପଡ଼େ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଆହାର ଜୀବକୁ ଅଣ୍ଟା ଆଡ଼କୁ ଦଉଡ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଜଳରେ ବା ଜଳ ନିକଟରେ ଥିବା ଗଛମାନଙ୍କରେ 'ବିହୀତ ଫ୍ରେଞ୍ଚ'ମାନେ ଦିନରେ ବସନ୍ତି ଓ ରାତି ଯାପନ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଉଡ଼ୁଲବେଳେ କିଛି ବାଟ ଦୃଢ଼ଭାବେ ପକ୍ଷ ସଂଚାଳନ କରନ୍ତି ଓ ତା'ପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପକ୍ଷ ସଂଚାଳନ ନ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନରେ ଭ୍ରମନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଫ୍ରେଞ୍ଚମାନଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ଦିନର ଉତ୍ତମ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉଚ୍ଚ ଆକାଶରେ ଚକ୍ରକର ହଥନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ନାଡ଼ କାଠିରେ ଘିଆର ହୋଇଥାଏ ଓ ଏକ ବଡ଼ ମସ୍ତା ପରି । ତା' ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଅଗଣ୍ଡର ଗାତ ଥାଏ ଓ ଗାତ ଭିତରେ ଦଳଜାତୀୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦର କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଜଳ ଭିତରେ ବା ନିକଟରେ ଗଛରେ ସେମାନେ ବସା କରନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଦଶଟିରୁ କୋଡ଼ିଏଟି ଯାଏ ପକ୍ଷୀବସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ସେଇ ଗଛରେ କର୍ମୋରୁଷ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଗ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବସା ରହୁଥାଏ । ସେମାନେ ଥରକେ ଦିନେଟିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଯାଏ ଅଣ୍ଡା ହଥନ୍ତି । ଅଣ୍ଡା ନିତ୍ରେକ ମଳିନ ଧଳା ଓ ବେଳେ-ବେଳେ ସେଥିରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତଭାବେ ଦାଗ ବା ଗାର ପଡ଼ିଥାଏ ।

ସମ୍ଭବତଃ ଆମର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଓ ସବୁଠାରୁ ବେଶି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖା-ଯାଉଥିବା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ହେଲା ଗେଣ୍ଡାଲିଆ ବା କାଆଁସ (ବର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର 10) । ଏହା ଅନ୍ୟ ଫ୍ରେଞ୍ଚମାନଙ୍କ ଭୁଲନାରେ ସ୍ଥଳ । ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ 'ମେଲଅଣ୍ଟିଆ ଫ୍ରେଞ୍ଚ' (Openbilled stork) ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ଗୁଙ୍ଗଲ ବା ଦୁଙ୍ଗଲ କହନ୍ତି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ଆନାସଟୋମାସ ଓସ୍କିଟାନସ୍' (Anastomus oscitans) । ଏହାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରଯାଏ ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ ଏକ ମିଟରରୁ କମ୍ ହେବ । ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ବା ଧୂସରଥା ଧଳା ଓ ଡେଣାରେ କଳା ରଙ୍ଗ ଥାଏ । ବେଳେବେଳେ ଦୂରରୁ

ଏହାକୁ ଧୋବକାଙ୍କ (White stork) ବୋଲି ଭ୍ରମ ହୁଏ । ଗେଣ୍ଡାଳିଆର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା, ତା'ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣ୍ଟା । ଅଣ୍ଟା ଲଲ-କଳା ବର୍ଣ୍ଣର ଓ ତା'ର ଦୁଇଫାଳ ଅଙ୍କ ବୃତ୍ତାକାର ହୋଇ ମଝିରେ ମେଲିଥାଏ । ଅଣ୍ଟାର ଲକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ ହୋଇ ନ ପାରେ । ସାଧାରଣତଃ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଯୋର ଓ ଜଳାଭୂମିମାନଙ୍କରେ ଦୁଇ, ତିନି ବା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଆଚରଣ ଫୌଞ୍ (Stork) ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରି ହେଲେହେଁ, ଏ ମାନଙ୍କର କୌତୁହଳଜନକ ଅଣ୍ଟାର ତାପୁର୍ଯ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଠିକ୍ ବୁଝାପଡ଼େନାହିଁ । ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗେଣ୍ଡା ଧରି ଖାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ତା'ର ଅଣ୍ଟା ବିଶେଷ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଲାଗି ଉପଯୋଜିତ ହୋଇଅଛି । ଇ'ଫାଳ ଅଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସମ୍ଭବତଃ ଗେଣ୍ଡାର ମୁଖ ପଟ ତାଙ୍କୁଣୀ (operculum)କୁ ଖୋଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଗେଣ୍ଡା ଖୋଲିଯା ଭିତରୁ କୋମଳ ଅଂଶତକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନଭାବେ କାଢ଼ି ସେ ଆହାର କରିଥାଏ । ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ବେଙ୍ଗ, ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀଅନ୍ତା ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଖାଏ । ଏମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଜାଡ଼ ରଚନାକରି ଛୁଆ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି । ଏମାନେ କର୍ମୋରାଣ୍ଟ (cormorant), ବଗ (heron), କଳାବାଜେଣି (Black Ibis), ଧଳା ବାଜେଣି (White Ibis) ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳାଭୂମି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଜାଡ଼ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି । ଗେଣ୍ଡାଳିଆର ବସା କାଠିଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମୋଟାମୋଟିଭାବେ ଏକ ଗୋଲକାର ମସ୍ତା ପରି । ମଝି ଅଂଶଟି ଖାଲୁଆ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେଠି ଜଳଜ ଅନାବନା ଗଛର ପତ୍ର ଓ କାଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଯୋରର ପାଣି ଭିତରେ ବା ପାଣି ନିକଟରେ, ବେଳେବେଳେ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗେଣ୍ଡାଳିଆଙ୍କର ଜାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଅରକେ ଏମାନେ ତିନୋଟିରୁ ଚାରିଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି । ଅଣ୍ଡା ମଲିନ ଧଳା; ମାତ୍ର ତା' ଉପରେ କୌଣସି ଦାଗ ପଡ଼ି ନଥାଏ ।

ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫୌଞ୍ ପକ୍ଷୀ ହେଲା ହାଡ଼ଗିଳା (Adjutant stork) (ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ 11) । ହିନ୍ଦୀରେ ଏହାକୁ ହାଡ଼ଗିଳା, ଗରୁର ଓ ଭେଙ୍କ ବୋଲି କହନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ଲେପ୍ଟପ୍ଟିଲସ୍ ଡବିୟସ୍' (Leptoptilos dubius) । ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ  $1\frac{1}{2}$  ମିଟର । ହାଡ଼ଗିଳା ଏକ ବଡ଼, ମଲିନ-କଳା, ଧୂସର ଓ ମସିଆ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣର ଫୌଞ୍ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ । ଏହାର ଅଣ୍ଟା ଦଳ ହଳଦିଆ-ଗୁଣ୍ଡା-କୋଣିଆ ଓ ଗୋଜକିଳା ଆକାର । ପ୍ରାୟ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବର ଏକ ଖର୍ଦ୍ଦ,

ଅନାବୃତ ଲେହନ ବର୍ଣ୍ଣର ଥଳୀ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଝୁଲୁଥାଏ । ହାଡ଼ଗଳାକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏହା ତା'ର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ । ଶୁଣିଆସୁଥିବା ଜଳାଭୂମିମାନଙ୍କରେ ଓ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁନସିପାଲିଟିର ମଜଲା ଖାତରେ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବା ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାଏ । ଇଂରାଜୀରେ ଏଡ୍ଜୁଟାଣ୍ଟ (Adjutant) ଅର୍ଥ ସହକାରୀ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ । ହାଡ଼ଗଳାର ଇଂରାଜୀ ନାମ ଏଡ୍ଜୁଟାଣ୍ଟ ଫୌଜ୍ ହେବାର କାରଣ ଏହି ସେ, ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମୟରେ ସେ ଦୃଢ଼ତା ସହକାରେ ମିଲିଟାରୀ କାଳଦାରେ ପାଦକୁ ଉଠକୁ ଟେକି ଓ ପକାଇ ଏପଟ ସେପଟ ଚାଲେ । ଏହାର ଝୁଲୁଥିବା ଥଳୀଟିର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ । ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ନାସିକା ଗହର ସହଜ ସଂଯୁକ୍ତ ଏକ ବାୟୁଥଳୀ । ଏହା ଗ୍ରାସନାଳୀ (gullet) ସହଜ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନଥାଏ; ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଆସି ଏଥିରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେନାହିଁ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା ହାଡ଼ଗଳା ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଏହି ଥଳୀରେ ଆସି ରହେ । ନାଡ଼ ଭୃତ୍ ଆଦି ଅସ୍ତ୍ର ଓ ଆବର୍ଜନା ସାଙ୍ଗକୁ ହାଡ଼ଗଳା ଅନେକ ସମୟରେ ଶାରୁଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ସତ୍ତା ମାଂସ ଖାଏ । ଆହୁର ମଧ୍ୟ ଏହା ମୃତ ବା ଚତ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ମାଛ, ବେଙ୍ଗ, ସରୀସୃପ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଆହାର କରେ । ବଡ଼ ବଡ଼ ଝିଞ୍ଜିକା ଓ ଅନ୍ୟ ଜୀବପତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଭୋଜ୍ୟ । ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ ହାଡ଼ଗଳା ଜୋର୍ରେ ଡେଣା ବାଡ଼େଇ ଶବ୍ଦ କରେ । ଉଡ଼ିବା ମୁହେଁ ଏହା ଜୋର୍ରେ ଡେଣା ବାଡ଼େଇ କିନ୍ତୁ ବାଟ ଦୌଡ଼ିଗଲା ପରେ ଯାଇ ଆକାଶକୁ ଉଠେ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ପରି ହାଡ଼ଗଳା ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଉଡ଼ିବାକାଳରେ ଚକକର ଦିଏ । ବିଶ୍ରାମ ନେଲାବେଳେ ହାଡ଼ଗଳା କପରି ବସିଥାଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣବିନ୍ଦ 11ରେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଦର୍ଶିତ ହୋଇଅଛି । ଏହା ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସିବା ଠାଣି । ଏତେବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗା (ଜାନୁୟରୀଠାରୁ ଗୁଲୁଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦାଂଶ)କୁ ସାମନାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ତଳେ ଥାପି ଓ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୁଇ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ନୁଆଁଇ ବସିଥାଏ । ତା'ର ଏତେବେଳର ଚେହେରା ହାସ୍ୟକର ଓ ଦୟନୀୟ ମନେହୁଏ । ହାଡ଼ଗଳାର ନାଡ଼ ପାହାଡ଼ର ସ୍ତମ୍ଭାଗ୍ର ଶିଳା ଉପରେ ବା ଜୁଜ ପାଟିଆୟୁ ବୃକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧା ଏକାଠି ନ ହୋଇ ବେଳେ ବେଳେ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ହୋଇ ବିକ୍ଷିପ୍ତଭାବେ ରହୁଥାଏ । ନାଡ଼ କାଠିରେ ଢିଆର ହୁଏ । ସେ ଢିନୋଟି ବା ଗୁଣ୍ଟି ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ଉମ୍ବ ଧଳା, ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ମସିଆ ।

ହାଡ଼ଗଳାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଅଛି, ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ 'ପ୍ରେଟିଆ ଏଡ୍ଜୁଟାଣ୍ଟ'

ବା ‘ଲେପ୍ଟପ୍ଟିଲସ୍ ଜାବାନିକସ୍’ (Lesser Adjutant) କହନ୍ତି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଲେପ୍ଟପ୍ଟିଲସ୍ ଜାବାନିକସ୍’ (Leptoptilos javanicus) । ଅସ୍ତର ସଂଖ୍ୟାରେ କେରଳ ଓ ସିଂହଳ ସମେତ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ, ପିଠି ଉପର କେକ୍‌ଶିଆ ଧାରୁପରି କଳା, ତଳପାଖ ଧଳା । ହାଡ଼ଗିଳା ପରି ଏହାର ଝୁଲୁଥିବା ଧଳା ନାହିଁ ।

ବର୍ଣ୍ଣ ଥେସ୍କିଅର୍ନିଥାଇଡ଼ (Threskiornithidae)—ଏ ବର୍ଣ୍ଣର ପକ୍ଷୀ ହେଲେ ଧଳା-ବାଜେଣି ଓ କଳା-ବାଜେଣି (Ibis) ଏବଂ ଚୁମ୍ବତ ଦାଡ଼ (Spoon-bill) ।

ଦା’ବେଣ୍ଟିଆ—ଏହାକୁ ଧଳା ବାଜେଣି ଓ ଦାଡ଼ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି । ହିନ୍ଦୀ ନାମ—ମୁଣ୍ଡା, ମୁଣ୍ଡୁ, ସଫେଦ ବାଜ । ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ଧଳା-ବାଜେଣି (White ibis) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଥେସ୍କିଅର୍ନିଥସ୍ ମେଲାନୋସେଫାଲ’ (Threskiornis melanocephala) । ଏହା ଏକ ଜଳାଭୂମି-ପକ୍ଷୀ । ବର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଓ ଆକାର ଏକ ବଡ଼ ଗୃହପାଳିତ କୁକୁଡ଼ା ପରି । ମୁଣ୍ଡ ଓ ବେକ ଅନାବୃତ ଓ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ । ଅଣ୍ଟା ଲମ୍ବା । ମଜଭୂତ, କଳା ଏବଂ ତଳ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କା । ଜନନ-ରତ୍ନରେ କାନର ଧଳାବର୍ଣ୍ଣର ପର ଶିଳଟ ପରି ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣକରେ ଓ ପକ୍ଷର ଗୌଣ ପର ମଧ୍ୟ ସେହି ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବେକମୂଳରେ ଲମ୍ବା ଆଳଙ୍କାରକ ପର ଉଠେ । ଜଳାଭୂମିରେ ଓ ଯୋର କଡ଼ରେ ଏମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ପକ୍ଷୀ ଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ଚୁମ୍ବତ ଦାଡ଼ (Spoon bill), ସାରସ୍ (Stork) ଓ ସେହିପରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତପ୍ତରତାର ସହିତ ଜଳାଭୂମିର ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଓ କଟା ହୋଇଯାଇଥିବା ଧାନଗଛର ଥୁଣ୍ଡା ମୂଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଦା’ବେଣ୍ଟିଆ ତା’ର ଚମୁଟା ପରି ଅଣ୍ଟାକୁ ଅଧା ମେଲାଇ କାଦୁଅରେ ପୁରାଇ ଖାଦ୍ୟ ଦରଶୁଥାଏ । ଅଗଭୀର ଜଳରେ ଏହିପରିଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ତା’ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବୁଡ଼ିରହିଥାଏ । ଗେଣ୍ଡା ଶାମ୍ବକାଦ ପ୍ରାଣୀ (mollusc), ଚଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ାଦି ଜୀବ (Crustaceans), କିଆ (worms), ଜାଟ ଓ ବେଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ । ବେଳେ ବେଳେ ଦା’ବେଣ୍ଟିଆ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି । ହୁରୁଡ଼ିଲେ ଓ ଘୃଷି ଶ୍ରାମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗଛ ଡାଳରେ ଯାଇ ବସନ୍ତି । ସେମାନେ ଦ୍ରୁତବେଗରେ ସିଧା ଉଡ଼ନ୍ତି । ଏତେବେଳେ ବେକ ଓ ଲମ୍ବା ଅଣ୍ଟା ଆଗକୁ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇ ରହେ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଲୁହତଳେ ପଛ ଆଡ଼କୁ ବାହାରି ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦ୍ରୁତ ଓ ‘ବିନିକ’ ପକ୍ଷ ସଂସ୍ଥାନନ କରି ତା’ପରି

ଦା'ବେଣ୍ଟିଆ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପବନରେ ଭାସି ଭାସି ଗତିକରେ; ପୁଣି ଜା'ପରେ ଦ୍ରୁତ ପକ୍ଷ ସଞ୍ଚାଳନ କରେ—ଏହିପରି ଭାବେ ଉଡ଼େ । ଚରାଭୁଇଁକୁ ଗଲବେଳେ ଓ ସେଠାରୁ ଫେରିବାବେଳେ ଏମାନେ ପାଦଦ୍ୱୟ ପରି ଇଂରାଜୀ 'ଭ' (V) ଆକାରରେ ଉଡ଼ିଯାନ୍ତି ବା ତରଙ୍ଗାୟିତ ଡାକ୍ତାଗୋନାଲ୍ ରବନ ଆକାରରେ ଉଡ଼ିଯାନ୍ତି । କୌସ୍ତ (Stork) ଓ ଗୁମଚଦାଡ଼ (Spoon bill) ପର୍ଯ୍ୟାୟାନଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ । ପ୍ରଜନନ ସମୟରେ ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ପେଟରୁ ବାହାରିଲା ସ୍ୱର ପରି ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏହା କେତେକ ପରିମାଣରେ ଘୁଞ୍ଚିବର ଶବ୍ଦ ପରି । ଏହି ଶବ୍ଦ ଜୋର ନୁହେଁ; ମାତ୍ର କମ୍ପନଶୀଳ । ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଏକାଠି ଓଠ ଚପି କଥାଭାଷା ହେଲେ ଯେପରି ଶୁଣାଯାଏ, ଦୂରରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ସେହିପରି ।

ଜଳରେ, ଜଳ ନିକଟରେ ଓ ସମୟ ସମୟରେ ଗାଁ ଉପକଣ୍ଠରେ ଗଛ ଉପରେ ଏମାନେ ନିଜ ରଚନା କରନ୍ତି । ସେହି ଗଛରେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ବେଳର ସାଥୀ; ଯଥା—ଗୁମଚଦାଡ଼, ସାରସ ଏବଂ କର୍ମୋରାଣ୍ଟ ଓ ପାଣିକୁଆମାନଙ୍କର ନିଜ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ବସା କାଠିରେ ତିଆର ହୋଇଥାଏ ଓ ସମତଳ । ସେଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ପତ୍ର ବା ଅନ୍ୟ କିଛିର ଆସ୍ତରଣ ନଥାଏ । ଦା'ବେଣ୍ଟିଆ ଥରକେ ଦୁଇରୁ ଗୁରୁଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ । ଅଣ୍ଡାର ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳାସିଆ ବା ସବୁଜ-ଆସିଆ ଧଳା । ସେଥିରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନଥାଏ ବା ହଳଦିଆ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ।

କଳା-ବାଜେଣ୍ଟି—ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଚଣାଖାଇ ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି । ହୁମା ନାମ କାଲି ବାଜା, କରୁନକୁଲ । ଇଂରାଜୀ ନାମ 'କଳା-ବାଜେଣ୍ଟି' (Black Ibis) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ପ୍ସିଉଡ଼ିବିସ ପାପିଲୋସା' (*Pseudibis papillosa*) (ବର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର 12) । ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ । ଆକାରରେ ଓ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଦା'ବେଣ୍ଟିଆ ପରି । କଳା-ବାଜେଣ୍ଟିର କାନ୍ଧ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧଳା ଚିହ୍ନ ଥାଏ ଓ ଗୋଡ଼ର ବର୍ଣ୍ଣ ଇଟା ପରି ଲାଲ୍ । ତାକୁ ଚିହ୍ନି-ପାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା, ତା'ର ମୁଣ୍ଡ କଳା ଓ ଅନାବୃତ । ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ହିକୋଣାକୃତ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଉଡ଼ ରହିଥାଏ । ଖୋଲ ସମତଳ ଭୂମିରେ ଗୁପ୍ତଭୂଇଁ ପାଖରେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ କଳା-ବାଜେଣ୍ଟି ଦେଖାଯାନ୍ତି । ପ୍ରତି ଦଳରେ ତିନି ଗୁରୁଟି କରି ପକ୍ଷୀ ଥାନ୍ତି । ବିଷିପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦଳମାନଙ୍କରେ ତିନୋଟିରୁ ଦଶଟି ଯାଏ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରନ୍ତି । ଦା'ବେଣ୍ଟିଆ ପରି କଳା-ବାଜେଣ୍ଟି ଯୋଲୁ ବା ନଦୀ କୂଳରେ ସେତେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଓ ଅନେକ ସମୟରେ ପାଣିଠାରୁ

ବେଶ୍ କିନ୍ତୁ ଦୂରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଜୀବତନ୍ତ୍ର ଓ ଶ୍ୟାମା ଝିଟିପିଟି, ଛୋଟ ଛୋଟ ସାପ ଓ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବହୁ ମିଳିଲେ ଖାଏ । ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତାମଣ୍ଡଳୀ ଥାଏ । ଚନ୍ଦ୍ରମାନେ କେବଳ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହନ୍ତି । ଉଡ଼ିଯାଇ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଛ ଉପରେ ବସନ୍ତି ଓ ରାତ୍ରିଯାମନ କରନ୍ତି । ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ଇଂରାଜୀ ‘ଭ୍’ (V) ଅକ୍ଷର ଗଠନକରି ଉଡ଼ନ୍ତି । କିଛି ବାଟ ଜୋର୍ରେ ପକ୍ଷ ସଂଚାଳନ କରି ଉଡ଼ିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅଉ ପକ୍ଷ ନ ଦେଖିଲେ ଯବନରେ ଭସନ୍ତି; ପୁଣି ଜୋର୍ରେ ପକ୍ଷ ସଂଚାଳନ କରି ଉଡ଼ିଲା ପରେ ଯବନରେ ଭସନ୍ତି—ଏହିପରି ଉଡ଼ନ୍ତି । ମୋଟାମୋଟିଭାବେ କହିବାକୁଗଲେ କଳା-ବାଜେଣି ଗୋଟିଏ ମାରବ ପକ୍ଷୀ । ବେଳେ ବେଳେ ଏହା ଜୋର୍ରେ ଦୁଇ ଡିନୋଟି ଅନୁନାସିକ (nasal) ଚରିତରଥା ଶବ୍ଦ କରେ । ଉଡ଼ୁଥିଲାବେଳେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଶବ୍ଦ ଜାତ ହୁଏ । ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଚକ୍ରା-ଚକୋଇର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛେ ବୋଲି ମନେହୁଏ । କଳା-ବାଜେଣି ପକ୍ଷୀ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସା କରି ଅଣ୍ଡା ଉଡ଼ୁରନ୍ତି ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଦୁଇ ଡିନୋଟି ଯାଏ ସେଇ କଳାବାଜେଣି ପକ୍ଷୀବସା ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । ମାଡ଼ ବଡ଼ ଓ କପ୍ ପରି ଆକାରର ହୋଇଥାଏ । ଡାଳରେ ବସା ଦିଆର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କପ୍ ପରି ଭିତରେ କୁଟା ଓ ପର ପରସ୍ତ ଥାଏ । ବଡ଼ ଗଛର ଉପରଆଡ଼କୁ ନଚେତ୍ ତାଳ ଗଛ ଉପରେ ମଡ଼ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଗଛ ସାଧାରଣତଃ ପାଣିଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥାଏ । ବେଳେ ବେଳେ କଳାବାଜେଣି ଇଗଲ ଓ ଶାରୁଣୀମାନଙ୍କର ପୁରୁଣାବସାକୁ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ । ଥରକେ ଦୁଇରୁ ଚାରିଟି ଯାଏ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ । ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଫିକା ସବୁଜ । ସେଥିରେ ଆଦୌ ଚନ୍ଦ୍ର ନଥାଏ ବା ବାଦାମୀ ବର୍ଣ୍ଣର ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତୋରଣ ଦାଗ ଥାଏ ।

**ଚନ୍ଦ୍ରବାହୁ (ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର 13)**—ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏ ପକ୍ଷୀକୁ ଚନ୍ଦ୍ରବାହୁ ଗୋଟି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି । ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ଚନ୍ଦ୍ରବାହୁ’ (spoon bill); ହିନ୍ଦୀ ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରବାର୍ତ୍ତ ବାଜା, ଡାବଲ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ପ୍ଲାଟାଲିଆ ଲିଉକୋରୋଡିଆ’ (Platalea leucorodia) । ବାଜେଣି ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଏକ ନିକଟ ଜାତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଳ୍ପ ଏକାବେଳକେ ଭନ୍ନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଚନ୍ଦ୍ରବାହୁର ଅଳ୍ପ କଳା-ହଳଦିଆ, ଓହାରିଆ ଓ ଚଟାଳିଆ ଏବଂ ଅଗ୍ରଭାଗ ପ୍ରଶସ୍ତ । ପକ୍ଷୀଟି ଗୃହପାଳିତ ପାଉଁଶିଆଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ଠିଆହେଲେ ପ୍ରାୟ 45 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚ ହୁଏ । ଏହାର ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବା, ବେକ ଲମ୍ବା ଓ ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ ବରଫ ପରି ମଫେଦ । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଏହାର

ମୁଣ୍ଡରେ ଲମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ସିତ ଫିକା ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣର ଚୁଲ ଉଠେ ଓ ବେକ ତଳର ଉପର ଅଂଶରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ପଟି ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ଏକାକୀ ଅଥବା ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ବାସକରନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଦଳରେ 10ରୁ 20ଟି ବା ଅଧିକ ପକ୍ଷୀ ଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ସାର୍ବସ୍ତ (stork) ବା ଅନ୍ୟ ଜଳାଭୂମିର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଶି ବାସକରିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଗୁମଚଦାଡ଼ ଭରତର ଏକ ବାସିନ୍ଦା ପକ୍ଷୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଋତୁରେ ଭାରତ ବାହାରୁ ଆମ ଦେଶକୁ ସେହି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଆସିବା ଫଳରେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ । ଏମାନେ ଜଳାଭୂମି, ଯୋର, ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ରତୀର କାଦୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । ଗୁମଚଦାଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଅଗଭୀର ଜଳରେ କଳାଥାଡ଼କୁ ଚରନ୍ତି । ସକାଳେ ଓ ସଞ୍ଜରେ ସେମାନେ ଆହାର ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି; ଦିନର ବାକୀ ସମୟରେ କୌଣସି ବାଲି ଚଢ଼ାରେ ବସିଥାନ୍ତି । ଚରାଭୂଇଁକୁ ଆସିଲବେଳେ ବା ଫେରିଲବେଳେ ସେମାନେ ବେଶ୍ ଉଚ୍ଚରେ ବକ୍ସି ରେଖାରେ (diagonally) ଗୋଟିକ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ବା ଇଂରାଜୀ ‘ଭ’ (V) ଆକାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବେ ଉଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି । ଏତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବେକ ଓ ଗୋଡ଼ ପ୍ରସାରିତ ରହୁଥାଏ ଓ ଡେଣା ଧୀର ଅଥଚ ଏକଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥାଏ । ବେଙ୍ଗଫୁଲ, ବେଙ୍ଗ, କମ୍ବୋକ (mollusc) ଓ ଜଳବାସୀ କୀଟ ଏମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ । ସେଥି ସହିତ କିଛି ଉର୍ଭିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆହାର କରିଥାନ୍ତି । ଯୋରମାନଙ୍କରେ କୁଳ କଡ଼କୁ ଅଗଭୀର ଜଳରେ ଗୁମଚଦାଡ଼ ପକ୍ଷୀ-ପଲ୍ଲ ଗୁଲି ଗୁଲି ବେକକୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାବେ ଏପଟ ସେପଟ ଥଣ୍ଟ ଗେଞ୍ଜି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି । ଏତେବେଳେ ଥଣ୍ଟ ଆଂଶିକ ମେଲି ଥାଏ ଓ ଥଣ୍ଟର ତଳ ଫାଳ ଦାଆପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି କାଦୁଆ ମାଟିକୁ ଚାଡ଼ିପକାଏ । ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବନ୍ଧୁ, ଆହାର ଜୀବ ଧରିବାକୁ ଅଧୀର, ପରସ୍ପର ସଂଲଗ୍ନ ଗୁମଚଦାଡ଼ ପକ୍ଷୀଦଳ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଉପରେକ୍ରମରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି ବା ପ୍ରାୟ ଦୌଡ଼ି ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି । ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ବେଶି ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ, ସେଠି କାଦୁଆକୁ ଉପର ତଳ ଖୋଳିପକାନ୍ତି । ଏହି ପକ୍ଷୀ ବେଳେବେଳେ କେବଳ ଏକପ୍ରକାର ଘୋଡ଼ ଘୋଡ଼ (grunt) ଶବ୍ଦ କରୁଥାଏ । କୌଣସି କୌଣସି ଗଛରେ କେବଳ ଗୁମଚଦାଡ଼ମାନଙ୍କର ମାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ; ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କ ମାଡ଼ ସହିତ ବଗ, ଦାଡ଼, ଚଣାଖାଇ (Ibis), କର୍ମୋଗୁଣ୍ଡ ଓ କ୍ରୌଞ୍ଚ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବସା ରହୁଥାଏ । ଯୋର ନିକଟରେ ପାଣିରେ ବା ପାଣିପାଖରେ ଥିବା ଗଛରେ, ସାଧାରଣତଃ ଗାଁ ବାହାରେ, ସେମାନଙ୍କର କାଠିରେ ଘିଆରି



ମହାଭଲ ବରୁଟ ମାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଅରକେ ସେମାନେ ଗୁରୁଟି ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । ଅଣ୍ଟା ମଳିନ ଧଳା ଏବଂ ତା' ଉପରେ ବନ୍ଧିପ୍ରଭାବେ ଘନ ଲାଲ-ବାଦାମୀ ବନ୍ଧୁ ଓ ଦାଗ ଥାଏ ।

ଭାରତରେ ଫୋଏନିକପ୍ଟେରିଡ଼ (Phoenicopteridae) ବଂଶର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତାହା ହେଲା ଏରା ପକ୍ଷୀ (Flamingo) (ବର୍ଣ୍ଣବିନ୍ଦ 14) । ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମରାଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ଫୋଏନିକପ୍ଟେରସ ରୋଜିଆସ' (Phoenicopterus roseus) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ ବୋରା ହନସ, ଗୁରୁଜ୍ ବାଗ୍‌ଗୋ । ଏହା ଗୋଟିଏ ଫିକା ଗୋଲପୀ-ଧଳା ରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀ । ଏହାର ଦେହ ଗୃହପାଳିତ ହଂସ ପରି ବଡ଼; ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବା, ଅନାବୃତ ଓ ପାଟଳ ବର୍ଣ୍ଣ: ବେକ ତରଙ୍ଗ ପରି ବଡ଼ । ଠିଆହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ହ୍ରାସ ପ୍ରାୟ ଦେଇ ମିଟର । ଏହାର ପାଟଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଘଣ୍ଟ ଅଣ୍ଟା ମଝି ଅଂଶରୁ ତଳକୁ ବାଙ୍କିଯାଇଥାଏ । ଏ ପ୍ରକାର ଅଣ୍ଟା ଏହାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ । ପାଦର ଅଙ୍ଗୁଳ ମଧ୍ୟରେ ପାଦହଂସ ପରି ଯୋଜକ କର୍ମ ରହିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଘଳ ଏରା ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ଡେଣା ଓ ଡେଣାକଡ଼ରେ ଥିବା କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ପୃଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଏ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଥରେ ଦେଖିଛୁ ସେ କେବେ ତାହା ଭୁଲି ପାରବ ନାହିଁ । ଏ ପକ୍ଷୀମାନେ ଘଳ ଘଳ ହୋଇ ଯୋର, ସମୁଦ୍ରତୀର ନିକଟରେ ଥିବା ଅଗଣ୍ଡର ହ୍ରଦ ଓ କୁଆରିଆ କାଦୁଆ ସ୍ଥାନରେ ବାସକରନ୍ତି । ଏରା ପକ୍ଷୀ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଙ୍ଗଲା ଦେଶ ଓ ସିଂହଳରେ ଉଷା ଅଧିକେ ଛାୟା ଅଧିବାସୀ; ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କର ବାସ ବନ୍ଧିପ୍ର ଓ ଏମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବ୍ରଜନ କରି ଦେଶାନ୍ତର ବାସ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି (locally migratory) । ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରୁଥୁ ଷ୍ଟ୍ରୁ ଘଳ ବା ବରୁଟ ପଲରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଲରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପକ୍ଷୀ ଥାନ୍ତି । ଅଗଣ୍ଡର ଜଳ ଭିତରକୁ ଗୁଲି ଗୁଲି ଯାଇ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣ କରନ୍ତି । ଏତେବେଳେ ବେକ ତଳକୁ ବାଙ୍କିରହିଥାଏ ଓ ମୁଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିରହେ । ତା'ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ଅଣ୍ଟା ଓଲଟିରହିବା ଫଳରେ ଉପର ଫାଳର ମଧ୍ୟରେଖାରେ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଥିବା ଚଢ଼ା ଭୂମିତଳେ ପ୍ରାୟ ଘୋଷାର ହ୍ରାସ ଏବଂ ତଳ୍ପାର ତଳର କାଦୁଆ ଆଲୋଡ଼ିତ ହୁଏ । ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଣ୍ଟା ଉପର ଫାଳ ଏକ କରଚୁଳି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଓ ସେଥିରେ ପଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ । ମାଂସଳ ଜିଭ ଡବ୍‌ବନ (plunger) ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଫଳରେ ଅଣ୍ଟାଧାରରେ ପାଣିଆ ପରି ରହିଥିବା

ଝାଲର ବା ଦଳଳ (lamella) ବାଟେ ପାଣି ବାହାରଯାଏ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ-ପଦାର୍ଥ ‘କରତଳି’ ଭିତରେ ରହୁଥାଏ । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଅନାୟାସରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ । ଗଭୀର ଜଳରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବାବେଳେ ପାଣିହୀନ ପରି ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଲମ୍ବ ପାଣି ଉପରକୁ ବାହାର ରହୁଥାଏ । କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ରାଷ୍ଟେସିଆ (Crustacea) ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ; ଯଥା—କଙ୍କଡ଼ା, ଚଙ୍ଗୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି, କୀଟର ଲାର୍ଭା ଜିଆ ଓ କୃମି, ଜଳାଭୂମି ଗର୍ଜର ମଞ୍ଜି ଓ ପଙ୍କଜରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଏହି ପକ୍ଷୀର ଆହାର । ଏହି ପକ୍ଷୀ ବେଶ୍ ଦ୍ରୁତ ପକ୍ଷ ସଂଚାଳନ କରି ଉଡ଼ନ୍ତି । ଏତେବେଳେ ହଂସମାନଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ଇଂରାଜୀ ‘ଭି’ (V) ଅକ୍ଷର ବା ଦୀର୍ଘ ତରଙ୍ଗାୟିତ ବିକର୍ଣ୍ଣ ରେଖା (wavy diagonal ribbons) ଗଠନ କରନ୍ତି । କ୍ଷୀଣ ବେଳ ଆଗକୁ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇ ରହେ ଓ ଦୀର୍ଘ ଲମ୍ବ ଗୋଡ଼ ପଛକୁ ବଢ଼ି ରହୁଥାଏ । ଏହି ମୋଟଉପରେ ଗୋଟିଏ ଅତି ମାରବ ପକ୍ଷୀ । ସେମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ହଂସ ପରି ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏହି ଶବ୍ଦ କେତେକ ପରିମାଣରେ ମଟରର ହର୍ଷ ପରି । ଦଳେ ଏହି ଖାଇଲବେଳେ ଏକପ୍ରକାର ଭଡ଼ ଭଡ଼ ଶବ୍ଦ ହୁଏ । ଭାରତରେ ଏହିମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଜନନ ସ୍ଥାନ ହେଲା କଚର ଗ୍ରେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳ (Great Rann of Kutch) । ଏଠାରେ ଅକ୍ଟୋବରଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଜଳର ଅବସ୍ଥା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ଆସି ଜମାହୁଅନ୍ତି । ଏତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷରୁ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଯାଏ ହୋଇଯାଏ । କଚର ଏହି ଏହି ପ୍ରଜନନ କ୍ଷେତ୍ର ‘ଏଲ ନଗର’ (Flamingo city) ନାମରେ ଅଟେ । ପୃଥିବୀରେ ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ‘ପକ୍ଷୀ ନଗର’ । କାଦୁଆ ମାଟିକୁ ଗୁଞ୍ଜି ତା’ ଉପରେ ଅଧା-ତରଳ ପଙ୍କ ଲେସି ଏମାନେ ଭୂମିରେ ଗଦା (ସ୍ଲୋଟ କୁଦ) ଆକାରର ବସା ତିଆରି କରନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟତାପରେ ଏହା ଶୁଖି ଟାଣ ହୋଇଯାଏ । ଭୂମିଠାରୁ ବସାର ଉଚ୍ଚତା 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯାଏ ହୋଇଥାଏ । ମାଲ ପକ୍ଷୀ ଗଦା ଉପରେ ଚଟାଳିଆ ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ବା ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ । ତା’ପରେ ସେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ବସି ଉଠୁଥାଏ । ପୁରୁଣା ବହୁମାନଙ୍କରେ ଲୋଷାଅଛି, ମାଲ ଏହି ଠିଆ ହୋଇ ଗଦା ଉପରେ ଥିବା ଅଣ୍ଡାକୁ ଉଠୁଥାଏ । ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା କାଳ୍ପନିକ ।

ବର୍ଗ ଆନସେରୀଫର୍ମିସ୍ (Anseriformes)—ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ଓ ପକ୍ଷୀମାଂସ ଖୁବ୍ ଖୁବ୍ କେତୋଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ପକ୍ଷୀ ଆନସେରୀଫର୍ମିସ୍ ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ରାଜହଂସ

(swan), ହଂସ (geese) ଓ ପାତିହଂସ (ducks) ତହିଁର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ପଣ୍ଡା ହଂସ, ଜଳଗୁଡକ (Teals) ଆଦି ପକ୍ଷୀ ସ୍ମୁଦ୍ର ପାତିହଂସ (small ducks) ମାତ୍ର; ଠିକ୍ ଯେପରି କପୋତ (doves), ସାନ ପାବ (pigeons) ଅଟନ୍ତି; କେବଳ ନାମରେ ଯାହା ଫରକ ।

ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଶୀତ ପ୍ରବଳ ହୁଏ, ସେ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ସ୍ବମେରୁ ଅଞ୍ଚଳୀୟ ସୁରୋପ ଓ ଏସିଆରୁ ଅନେକ ଶୁଭେ କେବେ କେବେ ଆମ ଦେଶକୁ ରାଜହଂସ ଉଡ଼ିଆସନ୍ତି । ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଏଠାରେ ବିଚାର କରାଯାଉ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ କେତୋଟି ଜାତିର ହଂସ (geese) ଆମ ଦେଶକୁ ଶୀତକାଳରେ ଆସନ୍ତି, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଓ ନିୟମିତ ହେଲା ଖର ହଂସ (ବର୍ଣ୍ଣଚିହ୍ନ 15) । ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ‘ଗାରମୁଣ୍ଡିଆ ହଂସ’ (Barheaded goose) କହନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଆନ୍‌ସେର ଇଣ୍ଡିକାସ’ (Anser indicus) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ ହନସ୍, ସଂସ୍କୃତ, ବରଂସ । ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ‘କାଜ’ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି । ଏହାର ଆକାର ଗୃହପାଳିତ ହଂସର ଆକାର ପରି । ବର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧୂସର, ବାଦାମୀ ଏବଂ ଧଳା । ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଧଳା ମୁଣ୍ଡ, ହଳଦିଆ ଥଣ୍ଡା ଓ ଶ୍ରୀବାର ପଛାଡ଼ ଭାଗରେ ଦୁଇଟି ଓସାରିଆ ଶଳାକା ଚିହ୍ନ । ଶେଷୋକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଏହାର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ । ନଦୀ, ଯୋର ଏବଂ କଅଁଳ ଗହମ ଓ ବୁଟ କ୍ଷେତ ନିକଟରେ ଏମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ 15ରୁ 20ଟି ଯାଏ କାଜ ଥାନ୍ତି । କଅଁଳ ଗହମ ଓ ବୁଟ ଖାଇବାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏମାନେ ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି କ୍ଷେତରେ ପଡ଼ନ୍ତି । ବାଣୁଆମାନେ ଡମାଗତ ଏମାନଙ୍କ ପିନ୍ତୁ ଧରୁଥିବାରୁ ଖର ହଂସମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଧୂଳି ବା ରାତିରେ ଚରବାକୁ ଆସନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବେଳକୁ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ କାଜ ଇଂରାଜୀ ଭି (V) ଅକ୍ଷର ପରି ବା ବିକର୍ଣ୍ଣ ରେଖାରେ ଚାଲି ଗଠନ କରି ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଗୁରୁଣ୍ଡମଣି ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜାତି ହଂସ ପରି ଏମାନେ କ୍ଷେତରେ ବୁଲି ବୁଲି ଚରନ୍ତି ବା ଅଗଭୀର ପାଣିରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଲଞ୍ଜ ପାଖ ଉପରକୁ ଟେକି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୀତଦିନିଆ ଫସଲର ସବୁଜ କାଣ୍ଡ, ଶସ୍ୟ, ଜଳଦ ଉଦ୍ଭିଦର କମ୍ପ, ଇତ୍ୟାଦି ।

ଖରହଂସ ବିଭିନ୍ନ ଭାଳରେ ସଙ୍ଗୀତମୟ ‘ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ’ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି । ଛପି ରହୁଥିବା ଶିକାରୀର ମୁଣ୍ଡ ଉପର୍ଦ୍ଧେ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଏହି ଶବ୍ଦ ତା’ ମନରେ ଝୁଣ୍ଟି

ଆଣିଦିଏ ଓ ତା'ର ସ୍ନାୟୁକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ । ଖରଦ୍ୱଂସ ସଦାସର୍ବଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚର୍କ ରହୁଥାଏ । ଏଣୁ ତାକୁ ଛକ ମାରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଟୁତା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । କୌତୁହଳଜନକ କଥା ଏହି ଯେ, ବୌଦ୍ଧଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଚିନ୍ତକ ପର ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର ବେଶ୍ କିଛି କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଶାନ୍ତ ଓ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ତମସା ଗାଈଆଳମାନଙ୍କ ଛୁଉଣି ନିକଟକୁ ନିର୍ଭୀକ୍ଷରେ ଗୁଲିଆସନ୍ତି ।

ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଖରଦ୍ୱଂସମାନଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରଜନନ ଭୂମି ହେଲା ଲଦାଖ୍ । ଉଚ୍ଚଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୁଏ କଲର ଉତ୍ତମ ବାସିତ ତୃଣମୟ ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ ଖାଲ ତାଙ୍କର ମାଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ସେହି ଛୋଟ ଗାତର ଭିତର ପାଖରେ ବହୁଳିଆ କରି କୋମଳ ପର ଓ ପକ୍ଷର ଆସ୍ତରଣ ଥାଏ । ଥରକେ ସେମାନେ ଚିନୋଟିରୁ ଚାରିଟି ଯାଏ ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । ଅଣ୍ଟା ହସ୍ତୀଦନ୍ତ ପରି ଧଳା ।

ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପରିବ୍ରାଜା ହଂସ ହେଲା କାଜ । ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଗ୍ରେଲଗ (Greylag) ଓ ହିନ୍ଦୀରେ କାଜ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ଆନସେର ଆନସେର' (Anser anser) । ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୃହପାଳିତ ହଂସମାନଙ୍କର ଏହା ପୂର୍ବଜ (ancestor) ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ । ଏହାର ଆକାର ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୃହପାଳିତ ହଂସର ବାଦାମୀ ଅବସ୍ଥା ପରି । ଏହାର ପଶ୍ଚାତ୍ତରଣ ଧୂସର ଓ ଅଳ୍ପ ମାଂସର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ପାଟଳ । ଖର ହଂସ ଯୋର ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ନଦୀ ପାଖରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । କାଜ ଠାରେ ତା'ର ବିପକ୍ଷିତ ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ନଦୀ ତୁଳନାରେ ବେଶୀ ଯୋରମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ଭରତରେ ଶୀତ ଋତୁରେ କୋଡ଼ିଏରୁ କିଛି ଅଧିକ ଜାତିର ବନ୍ୟ ପାତିହଂସ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମାନ୍ଦ ପାଞ୍ଚ ବା ଛଅ ଜାତି ପକ୍ଷୀ ଏ ଦେଶର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଓ ଭରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜନନ କରନ୍ତି । ବାଙ୍କା ସମସ୍ତେ ପରିବ୍ରାଜା ଓ ମୁଖ୍ୟତଃ ହାଇବେରିଆରୁ ଆସନ୍ତି ।

ଏ ଦେଶର ସ୍ଥାୟୀ ଅଧିବାସୀ ପାତିହଂସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଉତ୍ତମ ବିସ୍ତୃତ ପକ୍ଷୀ ହେଲା ଲୁହମ ପାତିହଂସ (ବର୍ଣ୍ଣଚିହ୍ନ 16) । ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ 'ସ୍ପଟବିଲ୍' (Spotbill) ଓ 'ଧୂସର ପାତିହଂସ' (Grey duck) କହନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ଆନାସ ପୋସିଲୋରହିନ୍ଚା' (Anas poecilorhyncha) । ଏହାର ହିନ୍ଦୀ ନାମ ଗାରମ ପାଇ ଗୁଗାଲ ଓ ଲୁହମ । ଆକାରରେ ଲୁହମ ଗୃହପାଳିତ

ପାତ୍ରହଂସ ପରି ଏବଂ ପକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣ, ଫଙ୍କା ଓ ଘନ ବାଦାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କାନ୍ତ ପରି ସଜାଇଲେ ଯେପରି ହେବ, ସେହିପରି । ଧୂରେ ଥିବା ଧଳା, କଳା ଓ ଧାତୁ ପରି ଚକ୍ଚକ୍ କରୁଥିବା ସବୁଜବର୍ଣ୍ଣ—ଏପରି ତିରଙ୍ଗ ଶଳାକା-ଚନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱାରା ଲଦିମ୍ବ ପାତ୍ରହଂସକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିହେବ । ତା' ସାଙ୍ଗକୁ ତା'ର ଗୋଡ଼ ଉଚ୍ଛ୍ୱଳ କମଳାଲେମ୍ବୁ ପରି ଲଲ ଏବଂ ଅଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଭାଗ ହଳଦିଆ ଓ ପଶ୍ଚାତ୍ଭାଗ କଳା । ଅଶ୍ୱମୂଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତକର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟି କମଳାଲେମ୍ବୁ ପରି ଲଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଥାଏ । ଲଦିମ୍ବ ପାତ୍ରହଂସ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଓ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଂଥା ପଂଥା ହୋଇ ନଳବଣଯୁକ୍ତ ଅଗଭ୍ରର ଯୋରମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି; ମାତ୍ର କୌଣସିଠାରେ ହେଲେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶୀତକାଳରେ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ପରିବ୍ରାଜା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରି ପ୍ରଚୁର ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ । ଯେଉଁ ପାତ୍ରହଂସସବୁ ଉପରେ ଉପରେ ଚରନ୍ତି, ଲଦିମ୍ବ ସେହି ଦଳୀୟ । ବେଶି ଭାଗ ଖାଦ୍ୟ ଏମାନେ ଜଳାଭୂମି ଉପରେ ବା ଧାନକ୍ଷେତରେ ଚାରିବୁଲ କରି ଅଳ୍ପ ଗେଝି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି । ଅଗଭ୍ରର ଜଳରେ ପଙ୍କରେ ଅଳ୍ପ ମାରିବା ବେଳେ ପାଣି ଉପରକୁ ପୁଛୁ ମଜାରେ ବାହାର ରହୁଥାଏ ଓ ସିଧାଭାବରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷାକରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଛୁଆଡ଼ିଲ ପରି ଦୋହଲୁଥାଏ । ଲଦିମ୍ବ ପାତ୍ରହଂସ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଭିଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ; ଯଥା—ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ, ଜଳା ବା ବିଲ ଆଦିରେ ଜାତ ହେଉଥିବା ଘାସବଢ଼ ଉଦ୍ଭିଦର ମଞ୍ଜି, ଧାନ୍ୟ ବାଜ । ତା' ସାଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ କମ୍ବୋକ (mollusc), ଜଳବାସୀ କୀଟ ଏବଂ କୃମି, ଜିଆ ଆଦି ଖାଇଥାନ୍ତି । ଲଦିମ୍ବ ଏକ ଟାଣୁଆ ଉଡ଼ାଳ । ପକ୍ଷୀ-ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ପ୍ରିୟ—ଏକରେ ଟାଣୁଆ ଉଡ଼ାଳ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଲଢ଼ିବା ସହଜ ନୁହେଁ । ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହାର ମାଂସ ସୁସ୍ୱାଦୁ । ସାଧାରଣତଃ ଲଦିମ୍ବ ପାତ୍ରହଂସ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ପକ୍ଷୀ । ଅଣ୍ଟିର ଲଦିମ୍ବ ପାତ୍ରହଂସ (drake)ର ସ୍ୱର କର୍କଶ ଓ କଷ୍ଟରେ ଖର ନିଶ୍ୱାସ ଛୁଡ଼ିବାପରି ସଁ-ସଁ ଶୁଣାଯାଏ । ମାତ୍ର ଲଦିମ୍ବ ପାତ୍ରହଂସର ସ୍ୱର ଜୋର ହଂସରବ ପରି । ହଠାତ୍ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ସେମାନେ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । ଜଳର ଅନୁକୂଳ ସୁବିଧା ଥିଲେ, ଲଦିମ୍ବ ପାତ୍ରହଂସ ଉଷା ଅଧିକ ବର୍ଷସାରା ପ୍ରଜନନ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ନାଡ଼ ପୋଷଣ ବା ଜଳାଭୂମି ନିକଟରେ ତୃଣଗୁଚ୍ଛ ଭିତରେ ଲୁଚିକାନ୍ଦିତ ରହୁଥାଏ । ନାଡ଼କୁ ଘାସ ଓ ଦଳର ଏକ ଗହ୍ୱ କୁହାଯାଇପାରେ । ବେଳେ-ବେଳେ ତା'ର ଭିତର ପାଖରେ ଡିକାମଳ ପରି ଓ ପକ୍ଷ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଅରକେ ମାଛ

ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଢ଼ିତ୍ରୀ ସାତଟିରୁ ନଅଟି ଓ ବେଳେବେଳେ ବାରଟି ଯାଏ ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ଅଣ୍ଟା ଧୂସରଥା ଛିପତ୍ ପାତାଭ ବା ସରୁଜାଆ ଧଳା । ତା' ଉପରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନ ଥାଏ ।

**ହଂସରାଜ** (ବର୍ଣ୍ଣିତ ୧୭) — ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସଲଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି । ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ଷ୍ଟୁ ପ୍ରୁପ୍ରିଆ ବାଲି ହଂସ’ (Lesser Whistling Teal) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଡେନ୍ଦ୍ରୋସିଗ୍ନା ଜାଭାନିକା’ (Dendrocygna Javanica) । ହଂସୀ ନାମ—ସିଲ୍‌ସ୍ଲା, ସିଲ୍‌କାସ୍ଲା । ଏହା ଲଘୁମ ପାଚିହଂସଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର । ବର୍ଣ୍ଣ ଉଷା ଅଧିକ ଏକାଭାବେ ବାଦାମୀ । ଆକାର ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୁଁ ହଂସରାଜକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଚିହଂସ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଭ୍ରମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଆକାଶରେ ଏମାନଙ୍କର ଗତି ରେଳଗାଡ଼ିର ଗତି ପରି ଓ ସେ ସମୟରେ ଏମାନେ ଏକପ୍ରକାର କର୍କଶ ସୁସ୍ପରି ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏ ପ୍ରକାର ଉଡ଼ିବା ଓ ଶବ୍ଦ କରିବା ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ତଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିହେବ । ହଂସରାଜ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ପ୍ରତି ଦଳରେ ୧୦ରୁ ୧୫ ଯାଏ ପକ୍ଷୀ ଥାନ୍ତି । ନଳବଣ ଥିବା ଯୋର ଓ ଭସୁଥିବା ଉଦ୍‌ଦରେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଗୁଚ୍ଛହୋଇ-ଯାଇଥାଏ, ସେପରି ସ୍ଥାନରେ ହଂସରାଜ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ଜଳମୟ ଧାନବିଲରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ଆଖପାଖରେ ଗଛ ଅଛି, ସେପରି ସ୍ଥାନକୁ ଏହା ବେଶି ପସନ୍ଦ କରେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛାନ୍ତସାରେ ବୃକ୍ଷତାଳରେ ବସିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ । ଏହି କାରଣରୁ ଇଂରାଜୀରେ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ‘ହଲ୍‌ଦିଆ-ବାଦାମୀ ବୃକ୍ଷ ପାଚିହଂସ’ (Fulvous Tree Duck) । କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଏଠୁ ସେଠିକି ସେଠୁ ଏଠିକି ବେଶ୍ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ଉଡ଼ିବା ନିସ୍ତେଜ ଓ ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ବଡ଼ ବେଶି ପକ୍ଷ ଦୋହଲନ୍ତି । ହଂସରାଜର ଉଡ଼ିବା ଦେଖିଲେ ଦଲ୍‌ସିଫି (Jacana)ର ଉଡ଼ିବା ସ୍ମରଣ ହୁଏ । ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ଏମାନେ ଅବରୂପ ଏକପ୍ରକାର କର୍କଶ ଖରନିଶ୍ୱାସୀ ସୁସ୍ପରି ମାରନ୍ତି । ତାହା ‘ସି-ସିକ୍, ସି-ସିକ୍’ ପରି ଶୁଣାଯାଏ । ଏହି ଶବ୍ଦ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବଡ଼ ଖଞ୍ଜନ (Large Pied Wagtail) ପକ୍ଷୀର ଶବ୍ଦ ପରି । ହଂସରାଜ ଭୂମି ଉପରେ ଉତ୍ତମରୂପେ ଚାଲିପାରେ ଓ ଭଲ ବୁଢ଼ାଳି । ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଗେଣ୍ଡା, କୂମି, ଜିଆ, ବେଙ୍ଗ ଓ ମାଛ । ତା’ ସାଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ଜଳଜ ଉଦ୍‌ଦର ସବୁଜ କାଣ୍ଡ ଓ ଧାନଶ୍ୟାମ ମଧ୍ୟ ଖାନ୍ତି । ହଂସରାଜ ଭୂମିରେ ଓ ବୃକ୍ଷତାଳରେ ଉତ୍ତମୃଦ ମାଡ଼ ରଚନା

କରିଥାଏ । ଭୂମି ଉପରେ ଜଳ କଡ଼କୁ କଣ୍ଟାମୟ ବୁଦାଝାଟି ଭିତରେ ପଡ଼ି, ନଳ ଓ  
 ଘାସରେ ଗହ ପରି ଏକ ମାଡ଼ ଢିଆଁର କରିଥାଏ । ଗଛ ଉପରେ ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼  
 ଦ୍ଵିଶାଖାର ମଝି ସ୍ଥାନରେ କାଠିରେ ମାଡ଼ ରଚିତ ହୁଏ । ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷର କୋରଡ଼ରେ  
 ମଧ୍ୟ ସେ ଅଣ୍ଟା ଦେଇଥାଏ । ଗଛ ସବୁ ପାଣିଠାରୁ ବେଶ୍ କିଛି ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥାଏ ।  
 ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ପୁରୁଣା ଚିଲ ଓ କାଉ ବସାରେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । ଅରକେ  
 ସାତଟିରୁ ବାରଟି ଯାଏ ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଦଶଟି ଅଣ୍ଟା ଦେଇଥାନ୍ତି । ସଦ୍ୟ  
 ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଣ୍ଟା ଦୁର୍ବ୍ୟପରି ଶୁଭ୍ର । ଉତ୍ତମ ହେଉଥିଲାବେଳେ ଅଣ୍ଟାର ବର୍ଣ୍ଣ  
 ବାଦାମୀ ହୋଇଯାଏ ।

**ବଡ଼ ହଂସରାଜ (Large Whistling Teal)**—ଅତି ଜାତିଏ ବଡ଼  
 ହଂସରାଜ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାଭାବେ ଦେଖାଯାନ୍ତି ।  
 ଏମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଡେନ୍ଡ୍ରୋସିଗ୍ନା ବାଇକଲର’ (Dendrocygna  
 bicolor) । ଏମାନେ ସାଧାରଣ ହଂସରାଜଠାରୁ ଆକାରରେ ଟିକିଏ ବଡ଼ ।  
 ହଂସରାଜର ପୁଞ୍ଜ ଅଂଶ ବାଦାମୀ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ବଡ଼ ହଂସରାଜର ପୁଞ୍ଜ ଧଳା ।

**ଅଙ୍କି (Cotton Teal)** (ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର 18) — ଆମ ଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ପାଚିହଂସ-  
 ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍କି ଷ୍ଟ୍ରୁଡ଼ମ । ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ଜଳ-  
 ଗୁଡ଼ିକ ଓ କାଜ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ନେଟ୍ଟାପାସ  
 କୋରୋମାଣ୍ଡେଲିଆନସ’ (Nettapus coromandelianus) । ହିନ୍ଦୀ  
 ନାମ—ଚିରୁଆ, ଗୁରୁଗୁରୁ ଓ ସୋନିଆ । ଏହାର ଆକାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ମାଛ କୁକୁଡ଼ା ପରି ।  
 ପକ୍ଷର ବେଶୀ ଭାଗ ଧଳା । ଅଣ୍ଟିରୁ ଅଙ୍କିର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଚିକ୍‌କଣ କଳା; ମୁଣ୍ଡ, ବେକ ଓ  
 ପେଟ ପାଖ ଧଳା । ବେକରେ ଅଣ୍ଟିପାରିଆ କଳା ରଙ୍ଗର ବଳା ପରି ଚିହ୍ନ ଥାଏ ଓ  
 ପକ୍ଷରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶଳାକା ଚିହ୍ନ ଥାଏ । ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ପକ୍ଷର ଶଳାକା ଚିହ୍ନ  
 ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ । ମାଛ ଅଙ୍କି ନିଷ୍ପ୍ରଭ ବାଦାମୀ ଓ ତା’ ବେକରେ କଳା ବଳା-ଚିହ୍ନ  
 ନଥାଏ କି ପକ୍ଷରେ ଧଳା ଶଳାକା ଚିହ୍ନ ନଥାଏ । ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ  
 ଅଣ୍ଟିରୁ ଅଙ୍କି ଦେଖିବାକୁ ମାଛ ଅଙ୍କି ପରି; କେବଳ ତତ୍ପାତ୍ର ଭିତରେ ଅଣ୍ଟିରୁ ପକ୍ଷୀର  
 ଧଳା ପକ୍ଷଶଳାକା ରହୁଥାଏ । ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ଅଧିବାସୀ ପାଚିହଂସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍କି  
 କେବଳ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରୁଡ଼ମ ତାହା ନୁହେଁ, ପାଚିହଂସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ବହୁତ  
 ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ । ଲଦିମ ପାଚିହଂସ ପ୍ରତି ଅଙ୍କି ବହୁସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।  
 ଏମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ରହନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଦଳରେ 5ରୁ 15 ଯାଏ ବା ଅଧିକ



ଅଙ୍କୁ ଥାନ୍ତି । 50 ବା ତତୋଽଧିକ ପକ୍ଷୀ ଥିବା ଅଙ୍କଦଳ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । ଗାଁ ପୋଖରୀ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଖାଲ, ବର୍ଷାକାଳର ଖାତ ଅବା ଜଳ-ପ୍ରାପ୍ତି ଧାନଭିଲ ହେଉ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆବଜ ଜଳାଶୟରେ ଏମାନେ ମିଳନ୍ତି । କେବଳ ସେଥିରେ ନଳବଣ ବା ଭସମାନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟୁଲେ ହେଲା । ଉତ୍ପାଦନର ଉତ୍ସ ନ ଥିଲେ ଏମାନେ ନିରାଶ ଓ ବିଶ୍ୱାସୀ । ଗାଁ ପୋଖରୀମାନଙ୍କରେ ଲୋକେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଘସାମଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେବେଳେ ଅଙ୍କ ମାତ୍ର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ନିର୍ଭୟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ; ନଭୁବା ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ । ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହେଲା—ନବପଲ୍ଲବ, ଶସ୍ୟ, ପୋକ, ଗେଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି । ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ଏମାନେ ବେଶ୍ ବେଗବାନ ଓ ଚଞ୍ଚଳ । ପର ଗୁଡ଼ିଲାବେଳେ ଏମାନେ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ଧରଣକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଅଙ୍କମାନେ ପାଣିରେ ଡୁବି ଦେଇ ଖସିଯାନ୍ତି । ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ଏକପ୍ରକାର କକ୍‌କକ୍ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି । ମାରିବାକୁ ଡା' ଛୁଆକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କରେ ଏ ଶବ୍ଦ, କେତେକ ପରିମାଣରେ ସେହିପରି । ଏହି ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍କମାନେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ପାଣିଭିତରେ ବା ପାଣିପାଖରେ ଥିବା ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଏମାନେ ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । ତଳୁ 2୦ରୁ 10 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ବସା ରହିଥାଏ । ଥରକେ ଛଅଟିରୁ ବାରଟିଯାଏ ହାଡ଼ାଦାନ୍ତ ପରି ଶୁଭ୍ର ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । ଅଣ୍ଟା ଉପରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନ ଥାଏ । କାହାର କାହାର ଧାରଣା ଯେ ଅଙ୍କ ପିତାମାତା ତାଙ୍କର କୋମଳ ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ଶାବକମାନଙ୍କୁ ପାଣିକୁ ବୋହୁନିଅନ୍ତି । ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ପକ୍ଷୀଶାବକ ପକ୍ଷ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ ଆପେ ଆପେ ତଳକୁ ବା ପାଣିକୁ ଉଡ଼ିଯାନ୍ତି ।

**ବର୍ଗ ଫେଲକନିଫର୍ମିସ (Falconiformis)**—ଏହି ବର୍ଗଭିତ୍ତିକ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ (birds of prey) ବୋଲିଯାଏ । କାରଣ ଏକ୍ସିପିଟ୍ରିଡ଼ି (Accipitridae) ଓ ଫେଲକନିଡ଼ି (Falconidae) ବର୍ଗ ଦୁଇଟି ଏହି ବର୍ଗର । ବାଜ (Hawks) (1), ଭଗଲ (Eagle), ଶାରୁଣା (Vultures) ଓ ବହୁର (Osprey) ଏକ୍ସିପିଟ୍ରିଡ଼ି ବର୍ଗ ଏବଂ ଫେଲ (Falcons) (1) ଫେଲକନିଡ଼ି ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଏ ଦୁଇ ବର୍ଗର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଫରକ ନାହିଁ ।

(1) ଇଂରାଜୀରେ ହକ୍ (hawk) ଓ ଫେଲକନ୍ (falcon) ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀକୁ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷୀକୁ ବାଜ ବୋଲିଯାଏ ।

—ଅନୁବାଦକ

ଉଭୟ ବର୍ଗର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା, ମାଂସକୁ ଚରିପକାଇବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଛୋଟ, ମଜବୁତ୍ ଓ ବଡ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଡ଼ ନଖଥାଏ । ଏକସିପିଟିଡ଼ି ବଂଶଭୁକ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ଓସାରିଆ ଓ ଗୋଲକାର; ମାତ୍ର ଫେଲ୍‌କନିଡ଼ିବଂଶର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ଅଣଓସାରିଆ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମାକୃତି; ଦେହ ଅଧିକ କଣ୍ଡାକାର (spindle-shaped), ଏବଂ ଶିକାରର ପଶ୍ଚାତ୍ତ୍ୟାବନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବେଗ ନମିତ୍ତ ପ୍ରବାହ-ରୋଧୀ (streamlined) । ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ; ଯଥା—ଚିଲ (Kite) ଓ ଶାର୍‌ଗୁଣ୍ଡା (Vulture) ଆବର୍ଜନା, ପରୁ ମାଂସ ଓ ମଡ଼ା ଖାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ; ଯଥା—ବାଜ (Shikra) ଓ ଶୈନ (Sparrow-hawk) ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଶିକାର କରନ୍ତି । ଏମାନେ ଗୁମ୍ଫରେ ଥାଇ ହଠାତ୍ ଆସି ଝାମ୍ପି ମାରନ୍ତି ଓ ବେଳେବେଳେ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଛିପ୍ରବେଗରେ ଗୋଡ଼ାଇଲପରେ ଝାମ୍ପି ମାରନ୍ତି । ଅପର ପକ୍ଷରେ ବାଜ (Falcons) ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକାସ୍ତ୍ର ପକ୍ଷୀ । ସେମାନେ ଛିପ୍ରବେଗରେ ଶିକାର ପକ୍ଷୀର ପିଛା ଧରନ୍ତି ଓ ବହୁତବେଗରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାରୁ ଝାମ୍ପି ମାରନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପେ ବାଜପକ୍ଷୀ (Hawks) ଗୁମ୍ଫରେ ରହି ଶିକାର କରୁଥିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସକରେ ଏବଂ ଶୈନ (Falcons) ଖୋଲ ଜାଗାରେ ରହେ ।

ଶିକାର ପକ୍ଷୀ ଓ ଭୂମିବାସୀ ଶିକାର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ମାରପକାନ୍ତି ବୋଲି ଅନ୍ୟାୟରେ ବାଜ (Hawk), ଇଗଲ୍ (Eagle) ଓ ଶୈନ (Falcon)ମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରାଯାଏ । ସରକାରୀ ଶିକାର ପ୍ରାଣିତାଲିକାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ‘ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରାଣୀ’ (vermin) ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ଓ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଇନଗତ ଆଶ୍ରୟ (legal protection) ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଦ୍ୟଗ୍ରହଣ ଶକ୍ତିକୁ ଉତ୍ତମରୂପେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୂଷା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରୁଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଶିକାସ୍ତ୍ର ପକ୍ଷୀ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଏଣୁ ଶିକାସ୍ତ୍ର ପକ୍ଷୀ ଆମର ଯେତେକ କ୍ଷତି କରନ୍ତି, ତା’ ଅପେକ୍ଷା ବେଶି ଉପକାରୀ ଏବଂ ସେମାନେ ବୈଧାନିକ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରାହକ ପାଇଁ ହୁକ୍‌ଦାର ।

ମାଟିଆ ଚିଲ (Pariah kite) ଓ ବ୍ରାହ୍ମିନି ଚିଲ (Brahminy kite) (ବର୍ତ୍ତମାନ 19 ଓ 20)—ଏମାନେ ଆମର ଦୁଇଟି ପରିଚିତ ‘ବାଜ’ (hawk) ପକ୍ଷୀ । ଏମାନେ ମନୁଷ୍ୟ-ବସତି ନିକଟରେ ବାସକରନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମନୁଷ୍ୟ-

ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି ଅପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ମାଟିଆ ଚିଲ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ । ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ବାଦାମୀ । ଏହାର ଲୁହ ଘିଂଘାଳିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପରିଚିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନିହୁଏ । ଉଡ଼ୁଥିଲାବେଳେ ଏହି ଘିଂଘାଳିଆ ଲୁହ ସହଜରେ ବାରିହୋଇଯାଏ । କଂସେଇଖାନା, ମାଛ ଓ ମାଂସ ବଜାର, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମଇଲାଖାତ ଏବଂ ପୋତାଶ୍ରୟ ଓ ବନ୍ଦରମାନଙ୍କରେ ମାଟିଆ ଚିଲ ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଟଙ୍କୁରୁଏ ପାଇଁ ଟାକିରହୁଥାନ୍ତି । ମାଟିଆ ଚିଲ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ଵାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବେଗରେ ଝାମ୍ପ ମାରି ସହରର ଜନାଙ୍କୁ ବଜାର ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଲ୍ଲ ମୁଷାଟିଏ ବା ଉଚ୍ଛ୍ଠିଷ୍ଟ ମାଂସ ଟଙ୍କୁରୁଏ ଉଠାଇ ନେଇ ଘୂରି ବାଙ୍କି ଚାଲୁଥିବା ଲୋକବାସୀ, ଗାଡ଼ି ମୋଟର କଟାଇ ଉପରେ ଚାଲୁଥିବା ଟେଲିଗ୍ରାଫ୍ ତାରରେ ନ ବାଜି ବାହାରିଯାଏ, ତାହା ବ୍ୟୋମଜାନଗୁଣନ-ବିଦ୍ୟାକୁ ବି ହାର ମନାଇଦେବ । ଏମାନେ ଛୁଆଁ କରୁଥିଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦେବା ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ନେଇ ପଳାନ୍ତି । ସେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନକାରୀମାନେ ମାଟିଆ ଚିଲଙ୍କ ଉତ୍ସାହରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି । ଏହାର କର୍କଶ ସଙ୍ଗୀତମୟ ସୁସ୍ଵର ଇଓଁ-ଉଇର-ଉଇର-ଉଇର-ଉଇର-ଉଇର ଶବ୍ଦ ସହଜ ଅଧିକାଂଶ ସହରବାସୀ ପରିଚିତ ।

ଶଙ୍ଖ ଚିଲ (Brahminy Kite)—ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ହାଲିଆସ୍ତର ଇଣ୍ଡସ’ (Haliastur indus); ହିନ୍ଦୀ—ବ୍ରାହ୍ମନ ଚିଲ, ଯୋବିୟା ଚିଲ ଓ ଖେମକରନ । ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଆକାରରେ ମାଟିଆ ଚିଲ ପରି; ମାତ୍ର ତା’ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ସୁନ୍ଦର । ଏହାର ପିଠିପାଖ ମଳିନ ଲାଲ ଓ ମୁଣ୍ଡରୁ ଛୁଇଦେଇ ପେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧଳା । ଅପ୍ରାପ୍ତ-ବୟସ୍କ ଶଙ୍ଖ ଚିଲର ବର୍ଣ୍ଣ ଚକୋଲେଟ୍ ପରି ବାଦାମୀ ଏବଂ ମାଟିଆ ଚିଲ ଓ ଛୁଆଁ ଗୋଠ କୁକୁଡ଼ା (Scavenger vulture) ପରି ଦେଖାଯାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଲୁହ ଦେଖି ଅପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଶଙ୍ଖ ଚିଲକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ହେବ । କାରଣ ଏହାର ଲୁହ ଘିଂଘାଳିଆ ବା କଳାକାର ନ ହୋଇ ଗୋଲକାର । ଶଙ୍ଖ ଚିଲ ନଦୀ ଓ ପୋଖର ନିକଟରେ ବାସକରେ । ଏହା ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଏକ ଅତି ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ମାଛ ଧରାଳି ଗା ଓ ବନ୍ଦରମାନଙ୍କରେ ବେଶି ଦେଖାଯାନ୍ତି । ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାଋତୁରେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ରୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳପ୍ଳାବିତ ହୋଇଉଠେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ମାଡ଼ିଯାନ୍ତି ଓ ଧାନବିଲ ଗୁରୁପାଖରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଏହାର ଖାଦ୍ୟ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥିବା ନିହତ ପ୍ରାଣୀର ଅବ୍ୟବହାରିୟ ଅଙ୍ଗ ଟଙ୍କୁରୁଏ ଏବଂ

କାନ୍ତବ ଆବର୍ଜନା । ଶଙ୍ଖ ଚିଲ ଅନେକ - ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟବସତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି-  
ମାଟିଆ ଚିଲ ଓ କାଉଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ; ମାତ୍ର ଭୂମି ପରିବର୍ତ୍ତେ  
ଜଳ ଉପରୁ ଝାମ୍ପିମାରି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଭଲପାଏ । ଏଣୁ ବନ୍ଦର ଓ ମାଛମରୁ  
ପୋତାଶୁୟୁ ଅଞ୍ଚଳ ତା' ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସ୍ଥାନ । ଗ୍ରୀଷ୍ମାଞ୍ଚଳରେ ଶଙ୍ଖ ଚିଲର  
ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ—ଏଣୁଅ, ମାଛ, ବେଙ୍ଗ, ଭୂମିବାସୀ କଙ୍କଡ଼ା, ସାନ ସାନ ସାପ ଓ  
କୀଟପତଙ୍ଗ । ମାଟିଆ ଚିଲ ପରି ଶଙ୍ଖ ଚିଲର ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ିଯୋକ ଏକ ପ୍ରିୟଖାଦ୍ୟ । ବର୍ଷା  
ପରେ ଉଚ୍ଚ ଫୁଙ୍କାରୁ ବାହାରୁଥିଲାବେଳେ ଶଙ୍ଖଚିଲ ତାଙ୍କ ପିଚ୍ଛ ଆଗରୁ-ଜାଗୁରୁରୁବେ  
ଉଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଧରି ଖାଏ । ଏହା ଏକପ୍ରକାର ସିଂ-ସିଂଲିଆ କର୍କଶ ଶବ୍ଦ କରେ, ସତେ  
ଯେପରି ଚିଲ ତଣ୍ଡିରେ ଘା' ହୋଇଛି । ଉଭୟ ମାଟିଆ ଚିଲ ଓ ଶଙ୍ଖ ଚିଲ ଗଛରେ  
କାଠିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଞ୍ଚା ପରି ନୀଡ଼ ରଚନା କରନ୍ତି । ସେମାନେ ପାଣି ପାଖରେ ଥିବା  
ଗଛରେ ବସାକରିବାକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ମନେକରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟାର ବର୍ଣ୍ଣ  
ଧୂସରଥା ଧଳା ବା ପାଟଳବର୍ଣ୍ଣମିଶ୍ରା ଧଳା । ତା' ଉପରେ ଲାଲ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର  
ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଛୁଟା ଦାଗ ଥାଏ ।

**ବାଜ (Shikra) (ବର୍ଣ୍ଣପିଟ 21)**—ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ଏକ୍ସିପିଟାର ବଡ଼ଥାସ'  
(*Accipiter badius*) । ବାଜ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାଜ (hawk); ଆକାର  
ପାର୍ବ ପରି । ବର୍ଣ୍ଣ ଉପର ପାଖ ପାଉଁଶିଆ ନୀଳ ଧୂସର; ତଳ ପାଖ ଧଳା, ସେଥିରେ  
ଆଡ଼ିବାଗରେ ମଳିନ ବାଦାମୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଥାଏ; ଲୁହରେ ଓସାରିଆ କଳାପଟି ଚନ୍ଦ୍ର  
ପଡ଼ିଥାଏ । ମାଛ ବାଜର ଉପର ପାଖ ଅଣ୍ଟିର ଚୂଳନାରେ ଅଧିକ ବାଦାମୀ ।  
ଆକାରରେ ମାଛ ଅଣ୍ଟିରଠାରୁ ବେଶ୍ ବଡ଼ ହୁଏ । ଅପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ବାଜପକ୍ଷୀର ଉପର  
ପାଖ ଲାଲ ବାଦାମୀଆସିଆ ଓ ତଳ ପାଖରେ ଆଡ଼ିବାଗରେ ନ ହୋଇ ଲମ୍ବାଗ୍ରବରେ  
ଡୋରିଆ ବାଦାମୀ ଦାଗ ପଡ଼ିଥାଏ । ବାଜ ପକ୍ଷୀ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ  
ଗ୍ରାମ ଓ ଚାଷଭୂମି ନିକଟସ୍ଥ ନିକୃଷ୍ଟମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବଡ଼  
ବଡ଼ ଝିଙ୍କିକା, ଏଣୁଅ, ବେଙ୍ଗ, ମୂଷା ଓ ସେହିପରି ପ୍ରାଣୀ । ଏମାନଙ୍କର ଶିକାର ଶବ୍ଦ  
ହେଲା, ଖାଦ୍ୟ-ପ୍ରାଣୀକୁ ଅତକ୍ରିତରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା । ପକ୍ଷଭରା ଗଛତାଳୁରେ ବାଜ  
ଆସ୍ତଗୋପନ କରି ଏକଲକ୍ଷରେ ବସିଥାଏ । ଖାଦ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କରିବା  
ପୂର୍ବରୁ ବାଜ ଆସି ଅକସ୍ମାତ୍ ଝାମ୍ପିମାରେ ଓ ତା'ର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟରେ ଧରି ଉଡ଼ିଯାଏ ।  
ତା'ପରେ ତାକୁ ଛୁଣ୍ଟାଇ ବିଦାରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଖାଏ । ବାଜ ସାନ ସାନ ପକ୍ଷୀ;  
ଯଥା—ସାତଭୟା (Babblers), ଗୁଣ୍ଡରି (Bush guail) ଏବଂ କପୋତ

(dove) ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିପକାଏ । ନିଶିଦ୍ୱରେ ତା'ର ଲୁକ୍କାୟିତ ସ୍ଥାନରୁ ହଠାତ୍ ଜର୍ବବେଗରେ ତଳକୁ ଖସି ଆସି ବାଜ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିପ୍ରଗନ୍ତରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଗୋଡ଼ାଇ ଯାଇ ଧରି ଚାଲିଯାଏ । ଗୃହପାଳିତ କୁକୁଡ଼ା ତଥା ମାନଙ୍କର ବାଜ ଧରି ନିଶ୍ଚିତ ଦୟା । ବିଶେଷକରି ଛୁଆ କରିଥିଲାବେଳେ ବାଜ ଉପାତକର କୁକୁଡ଼ା-ପୋଷକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ହଇରାଣ କରନ୍ତି । ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍କଶ ଡାକ ଅବିକଳ କଜଳପାତି (Black drongo)ର ଡାକ ପରି, ମାତ୍ର ଅଧିକ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରର । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ବାଜପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ବେଶି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ । ସେତେବେଳେ ଏକ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଆକାଶରେ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ଦେଖାନ୍ତି ଓ ମୁହଁମୁଁହ ଟାଣି 'ଟି-ଟୁକ୍' ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି । ପସରା ଗଛର ଉପର ଅଂଶରେ ବାଜ କାଉପରି କାଠିରେ ମାଡ଼ ରଚନାକରେ । ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମନିକଟସ୍ଥ କୁଞ୍ଚର ଗଛରେ ଏହି ମାଡ଼ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ । ଅରକେ ଦିନୋଟିରୁ ଚାରିଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ । ଅଣ୍ଡାର ବର୍ଣ୍ଣ ଫିକା ମାଲାସିଆ-ଧଳା । ବେଳେବେଳେ ତା' ଉପରେ ଧୂସରବର୍ଣ୍ଣର ଫିକା ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଛଟା ଥାଏ ।

ଆମଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଶାଗୁଣା ହେଲା ରାବଣ ଚଢ଼େଇ (ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର 22) । ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଡୋଡ଼, ଗିଧ, ରାବଣ, ଶାଗୁଣା ଓ ଗିରିଧ କହୁଥାନ୍ତି । ଇଂରାଜି ନାମ 'ଧଳାପିଠିଆ ଶାଗୁଣା' (White backed vulture) ଓ 'ବଙ୍ଗଦେଶୀ ଶାଗୁଣା' (Bengal vulture) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ଜିପ୍ସ ବେଙ୍ଗାଲେନ୍ସିସ' (Gyps bengabnsis) । ହିନ୍ଦି ନାମ ଗିଧ । ଏହା ଗୋଟିଏ ଓଜନଦାର, ମସିଆ କଳା-ବାଦାମୀ, କଦାକାର ପକ୍ଷୀ । ଏହାର ମୁଣ୍ଡ ଓ ବେକରେ ପର ନ ଥାଏ । ବିଶ୍ରାମ କରିଥିବା ସମୟରେ ଓ ଆକାଶରେ ଘୁରୁଫେର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପିଠିର ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ତଳ୍ପାଶୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ହେବ । ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ଚଢ଼େଇକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ । କାରଣ ସେତେବେଳେ ଏକ ଓହାରିଆ ଧଳା ପଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷତଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ପକ୍ଷରେ କଳା ଦେହର ଦୁଇପାଖରେ ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଧଳା ପଟି ଦେଖାଯାଏ । ଅଗ୍ରାଗ୍ରବନ୍ଧୁ ରାବଣ ବାଦାମୀ ବର୍ଣ୍ଣର ଓ ତା' ପକ୍ଷରେ ଏହି ଧଳା ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଏଣୁ ଏତେବେଳେ ଏହାକୁ ଫାର୍ସ ଚଞ୍ଚୁ ଶାଗୁଣା (Longbilled vulture) ବୋଲି ଭ୍ରମଜାତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ଏହି ଶାଗୁଣାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ, 'ଜିପ୍ସ ଇଣ୍ଡିକାସ' (Gyps indicas) । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କଥା ଏହି

ଯେ ରାବଣ ଓ ଦାସ ଚଞ୍ଚୁ ଶାଗୁଣାଦୁଇଟିଯାକ ପକ୍ଷୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା (ସିଂହଳ)ରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି ଭରତୀୟ ଉପଦ୍ଵୀପର ସଂସ୍କୃତ ରାବଣ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଫେରାକି, ସନ୍ତସନ୍ତା ଚିର ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲଞ୍ଚଳରେ ରାବଣ ବାସକରେ ନାହିଁ । ଉନ୍ମୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବସ୍ଥାର କରି, ପକ୍ଷ ସଞ୍ଚାଳନ ନ କରି, ଉଚ୍ଚ ଆକାଶରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ରାବଣ ପକ୍ଷୀ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ ଓ ତଳେ କେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ତାହା ନିରେଖୁ ଥାଏ । ମଇଳା ସଫାକାରୀ ଭାବେ ଶାଗୁଣାମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବେଶି ହିତକାରୀ । ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଖର । ପ୍ରାଣଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ଓ ଆଦୌ ନାହିଁ । ଆକାଶ ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ, ନିହାତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୃତପଶୁ ଗୁରୁପାଖେ ଶାଗୁଣା ଯେପରି ଭାବେ ଆସି ବେଢ଼ିଯାନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ । ପୁଣି ସେମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଓ ନିଖୁଣଭାବେ ଗୋଟାଏ ବଳଦ ବା ସେହପରି ବଡ଼ ପଶୁର ଶବ ଖାଇ ଶେଷ କରି ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ଆଦୂର ବିସ୍ମୟର କଥା । ଶବ ଗୁରୁପାଖରେ ଶାଗୁଣା ବେଢ଼ି ଅବିରାମ ଭାବରେ ଏକ ଆରେକକୁ ଧକ୍କା ମାରୁଥିବେ, ପରସ୍ପର ସହୃଦ ଶ୍ରାବଣ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବେ, ଏକ ଆରେକକୁ ସୁବଧା ଜାଗାରୁ ହଟାଇବାକୁ ଦାସ ଆତ୍ମିନାଦ ଓ ସୀତକାର କରୁଥିବେ ବା ଦୁଇଟି ଶାଗୁଣା ଦୁଇପଟେ ପକ୍ଷ ବିସ୍ତାର କରି ହାସ୍ୟକାର ଭାବେ ଲୁହ ଦେଇ ପୁଲାଇ ମାଂସକୁ ଦୁଇପଟୁ ଭଡ଼ାଥିବେ—ମନେହୁଏ ଶବର ଅନେଷ୍ଟିକିୟା ସେମାନେ ଏଇପରି ବାଉଁଶ ଭାବେ କରନ୍ତି । ରାବଣ ପକ୍ଷୀ ଗା ନିକଟରେ ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛରେ ମଞ୍ଚା ପରି ନାଡ଼ ରଚନା କରେ । ତାହା ପସିଥିବା ଡାଳ ଓ କାଠିରେ ଢିଆର ହୋଇଥାଏ । ସେ ଥରକେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଟାଦିଏ । ଅଣ୍ଟାର ବର୍ଣ୍ଣ ଧଳା, ବେଳେ ବେଳେ ଲଲବାଦାମୀ ଛଟା ଓ ଦାଗ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଭରତୀୟ ଉପଦ୍ଵୀପର ଅଧେଷାକୃତ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସାନ ଶାଗୁଣା ଦେଖାଯାଏ । ତାକୁ ଗୋଠ କୁକୁଡ଼ା (ବର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର-23) କହନ୍ତି । ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ଧଳା ଶାଗୁଣା’ (White vulture), ‘ମଇଳା ସଫାକାରୀ ଶାଗୁଣା’ (Scavenger vulture) । ଏହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଂରାଜୀ ନାମ ଅଛି । ତା’ ହେଉଛି ‘ଫାରାଓଙ୍କ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ’ (Pharaoh’s chicken) । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ନିଓଫ୍ରନ୍ ପାରକ୍‌ନପଟେରସ୍’ (Neophron percnopterus) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ ‘ସଫେଦ୍ ଗିଧ୍’, ‘ଗୋବର ଗିଧ୍’ । ଏହା ଗୋଟିଏ ଚିଲ ପରି ପକ୍ଷୀ । ବର୍ଣ୍ଣ ମସିଆ ଧଳା, ପକ୍ଷ ପିଚ୍ଛ କଳା, ମସ୍ତକ ଓ ଅଣ୍ଟା ହଳଦିଆ, ପର ଦ୍ଵାରା

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ । ଅପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଗୋଠ କୁକୁଡ଼ାର ବର୍ଣ୍ଣ ବାଦାମୀ । ଏମାନଙ୍କୁ ଚଳଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ କରି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ । ଚଳଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଦି'ଫାଲିଆ, ହେଠକୁଡ଼ାର ଲକ୍ଷ ଖଳାବଳି । ସହର, ଗାଁ ବା ଯାଯାବର ଲେକଙ୍କ ବସନ୍ତ ନିକଟରେ ଖୋଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରୁଥିବା ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ବା ତିନି ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ସେମାନେ ସାବଲ୍ଲଳ ଛନ୍ଦରେ ଉଚ୍ଚ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଚୁଲୁଥାନ୍ତି ଓ ପୁଣି ତଳ ଆଡ଼କୁ ଓହ୍ଲାଇ କେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ତା'ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥାନ୍ତି । ତଳେ ଖାଦ୍ୟ ଅନେକ୍ଷଣରେ ଯେ ହାସ୍ୟକର ଭାବେ ପାଦକୁ ଉଠାଇ ଉଠାଇ ପକାଇ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ମରାଳ ଗତିରେ ଚାଲେ । ଗୋଠ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଦରକାରୀ ମଇଳା ସଫାକାରୀ ପକ୍ଷୀ । ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭାବରୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଟା ଧରି, ସେମାନଙ୍କର ବାସ ଘରର ଅଦୂରରେ ବୁଢ଼ା ଆଡ଼ିଆଳରେ ବସି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମାପନ କରନ୍ତି । ଗୋଠ କୁକୁଡ଼ା ସେପରି ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରାମ ସାମନାକୁ ସଫା ରଖି ମୂଲ୍ୟବାନ ସେବା କରେ । କାରଣ କଟା ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣୀର ଫୋପଡ଼ା ହେବା ଅଂଶ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆବର୍ଜନା ସାଫାକୁ ମନୁଷ୍ୟର ମଳ ତା'ର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଖାଦ୍ୟ । ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ନିକଟରେ ଥରୁକାଳୀ କୁଣ୍ଡମଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଡ଼ାଏ ପୌରାଣିକ ଅମର ପକ୍ଷୀ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ (ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକେ ସେମାନେ ବାରାଣାସୀରୁ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି) ଫୁଲକମାନଙ୍କଠାରୁ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ସେହି ମନ୍ଦିର ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଅଛି । ସେଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ଏଇ ଗୋଠ କୁକୁଡ଼ା । ଏମାନଙ୍କର ନଡ଼ି ମଇଳା କାଠିରେ ଟିଆର ହୋଇଥାଏ । ଭିତର ପାଖରେ ଛୁଣ୍ଟା କନା, ସୁନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀର ଚମଡ଼ା ଟୁକୁରା କେଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବର୍ଜନା ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଭଙ୍ଗା କୋଠା ଘରେ ଉପର ଅଂଶେ ଆକାଶ ଜାଗା ବା ପାହାଡ଼ର ଶିଳାସ୍ତମ୍ଭ ପରି ତାଲୁ ଅଂଶରେ ନଡ଼ି ରଚିତ ହୋଇଥାଏ । ବେଳେବେଳେ ଗଛର ଦୁଇ ଶାଖା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଠ କୁକୁଡ଼ାର ବସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେ ଥରକେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ । ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର । ବର୍ଣ୍ଣ ଧଳାରୁ ଫିକା, ଇଟା ପରି ଲାଲ୍ ଓ ସେଥିରେ ଲାଲ୍‌ବାଦାମୀ ବା କଳା ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଥାଏ ।


ସାହେନ ପକ୍ଷୀକୁ ବାଜ (hawk) ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହେନ (ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର 24) ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ । ଏହାର ଇଂରାଜୀ ନାମ 'ସାହେନ ବାଜ' (Shaheen



falcon) । ହୁମ୍‌ ନାମ ‘ସାହାନ’ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଫେଲିକୋ ପେରେଗ୍ରିନ୍-ନେଟର’ (Falco peregrinator) । ଏହା ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ନିଦା, ଓଡ଼ିଆ କାନ୍ଧୁକ୍ର ଡାମର କାଉ ଆକାରର ପକ୍ଷୀ । ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ସାହାନର ଉପର ପାଖ ଶିଳଟପର କଳା, ମୁଣ୍ଡ କଳା, ଗାଲ ଅଂଶରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ରେଖା ଚିହ୍ନ ଥାଏ ଏବଂ ଡେଇଁ ତଳ ପାଖ ଲେହୁତ ଶ୍ଵେତରୁ ମସିଆ ଲାଲ । କେତେକ ସାହାନଙ୍କର ଉଦର ତଳ-ଭାଗରୁ ଶେଷଯାଏ କଳା ରେଖା ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ । ମାଛ ଅଣ୍ଟିର ଦେଖିବାକୁ ଏକାପରି; ମାଛ ମାଛ ଅଣ୍ଟିରୁ ବଡ଼ ହୁଏ । ଉଚ୍ଚ ଟାଣ ଓ ବନ୍ଧୁର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାହାନ ଗୋଟିକିଆ ବା ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥାନରୁ ଶିକାର ପ୍ରାଣୀର ସନ୍ଧାନ ନେବା ଓ ତା’ ପିତ୍ତ ଧରିବା ସାହାନ ବାଜ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ହୁଏ । ଶୀତଦିନେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଗୋଟିଏ ଜାତି ବାଜି ଆସେ । ତାକୁ ‘ପେରେଗ୍ରିନ୍ ବାଜ’ (Peregrine Falcon) ବା ‘ଭାଇରା’ କହନ୍ତି । ସାହାନ ଭାଇରା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଜନିତ । ସାହାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାରା, ଶୁଆ ଓ ସେହିପରି ଆକାରର ପକ୍ଷୀକୁ ଶିକାର କରେ । ସାହାନ ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଉଡ଼ିପାରେ । ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ତା’ର ସୁସ୍ଥାଗ୍ର ପକ୍ଷ ସଞ୍ଚାଳନ କରି କିଛିଦୂର ଉଡ଼ିଯାଇ ଆଉ ପକ୍ଷ ସଞ୍ଚାଳନ ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେ ବେଗରେ ସଞ୍ଚରଣ (glide) କରେ । ସେ ତା’ର ଶିକାର ପକ୍ଷୀକୁ ମଧ୍ୟାକାଶରେ ମାରେ ଓ ଆବାରେ ଧରି ଏକ ଆଦୃତ ଗିରିଚୂଡ଼ାକୁ ନେଇଯାଏ । ସେଠାରେ ପର ଉଡ଼ାର ଅଙ୍ଗପ୍ରାୟ ଭାଗି ଖାଏ । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ସାହାନ ଯୋଡ଼ି ମାଡ଼ ଥିବା ଗିରିଚୂଡ଼ା ଗୁରୁପଟେ ଆକାଶରେ ଏକ ଅପର ପିତ୍ତ ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ତଳୁ ଉପରୁ, ଉପରୁ ତଳକୁ ଝପଟି ଯାଉଥିବା ଓ ଫାଶ ପରେ ଫାଶ ଆକ୍ରମଣର ଦୃଶ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ଦେଖିବାର କଥା । ସେମାନେ ଅଗମ୍ୟ ବନ୍ଧୁର ପବନ ଉପରେ ମାଡ଼ ରଚନା କରନ୍ତି । ଥରକେ ଦିନୋଟିରୁ ଗୁରୁଟି ଅଣ୍ଟା ହୁଅନ୍ତି । ଅଣ୍ଟାର ବର୍ଣ୍ଣ ମଳିନ ଇଟାପରି ଲାଲ । ତା’ ଉପରେ ଲାଲବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଛଟା ଓ ଚିହ୍ନ ଥାଏ । ସେମାନେ ସେଇ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ମାଡ଼ ରଚନା କରନ୍ତି । ଉପଦ୍ରବ ନ ଥିଲେ ପାରମ୍ପରିକ ଶାଢ଼ୀରେ ସେଇ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମାଡ଼ ରଚନା ଚାଲିଥାଏ ।

ଉରୁମ୍‌ (ବର୍ଣ୍ଣବିଧି 25)—ଏହା ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଶ୍ଵେନ (falcon) । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ‘ବାଜ’ କହୁଥାନ୍ତି । ଇଂରାଜୀରେ ‘ଲୁଲ ମୁଣ୍ଡ ମେରିଲିନ’ (Red headed Merlin) ନାମରେ ପରିଚିତ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଫେଲିକୋ ଚିକ୍‌କ୍‌ସ୍‌’ (Falco chicquera) । ହୁମ୍‌ ‘ଉରୁମ୍‌’ । ଏହା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାଗ୍ର

ଚିତ୍ର ନଂ 17  
ହଂସଭାଲି  
( Lesser Whistling Teal )  
ପୃଷ୍ଠା ନଂ 55 ଦେଖ






ଚିତ୍ର ନଂ 18  
 ଅଙ୍କ  
 ( Cotton Teal )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 56 ଦେଖ

ଚିତ୍ର ନଂ 19  
ମାଟିଆ ଚିଲ  
( Pariah Kite )  
ପୃଷ୍ଠା ନଂ 58 ଦେଖ








ଚିତ୍ର ନଂ ୨୦

ଶଙ୍ଖଚିଲ୍

( Brahminy Kite )

ପୃଷ୍ଠା ନଂ ୫୨ ଦେଖ



ଚିତ୍ର ନଂ 21  
 ବାଳ  
 (Shikra)  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 60 ଦେଖ



ଚିତ୍ର ନଂ 22  
 ରାବଣ ଲଢ଼ାଇ ବା ଶାଗୁଣା  
 ( Whitebacked or Pongul Vulture )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 61, ଦେଶ






ଚିତ୍ର ନଂ 23  
 ଗୋଠ କୁକୁଡ଼ା ବା ଧଳା ସାମୁଗ୍ରା  
 (White or Scavenger Vulture)  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ. 62 ଦେଖ




ଚିତ୍ର ନଂ 24

ଶାହୀନ  
( Shaheen Falcon )  
ପୃଷ୍ଠା ନଂ 63-ଦେଖ



25  
 ବୁଲ୍‌ବୁଲ୍  
 (Redheaded Merlin)  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 64 ଦେଖ





ଚିତ୍ର ନଂ 26  
 କଳା ପିଞ୍ଜର  
 ( Black Partridge )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 66

ଚିତ୍ର ନଂ 27  
ଗ୍ରେ ପାର୍ଟ୍ରିଜ୍  
( Grey Partridge )  
ପୃଷ୍ଠା ନଂ 67 ଘେଷ





ଚିତ୍ର ନଂ 28  
 ବଳକ-କଳା ପୁଣିକି  
 ( Blackbreasted or Rain Quail )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 68 ଦେଖ



ଚଢ଼ ନଂ 29  
ଗୁଣ୍ଡୁଚି  
( Jungle Bush Quail )  
ପୃଷ୍ଠା ନଂ 70 ଦେଖ







ଚିତ୍ର ନଂ 30  
 ଗାଈ କୁକୁଡ଼ା  
 ( Grey Junglefowl )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 71 ଦେଖ



ଚିତ୍ର ନଂ 31  
 ମୟୂର  
 (Common Peafowl)  
 ପ୍ରାୟ ନଂ 72 ଦେଖ



ଚନ୍ଦ୍ର ନଂ 32  
 ସାରସ ପକ୍ଷୀ  
 (Saras Crane)  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 74 ଦେଖ

ପକ୍ଷୀ (bird) (con) । ଦେହ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ, ସବୁଜ, ହଳଦିଆ, ଲାଲ, ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଡ଼ ବାଗରେ ପଟା ପରି କଳା ରଙ୍ଗର ଥାଏ । ମୁଣ୍ଡ ଓ ବେକର ପଛ ବା ଉପର ଅଂଶ ବାଦାମୀ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ । ଲମ୍ବରେ ତଳକୁ 'ନିଶ' ପରି ଗୋଟିଏକର ବାଦାମୀ ରେଖା ପଡ଼ିଥାଏ । ଏ ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷଣଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମତର୍କ ଚିହ୍ନି ହେବ । ତା' ସାଙ୍ଗକୁ ଉଡ଼ୁଥିଲାବେଳେ ଲୁହ ପ୍ରାୟରେ ଅଣଓସାରିଆ ଧଳା ପଟିଚିହ୍ନ ଓ ଲୁହର ଉପର ପାଖରେ ଓସାରିଆ କଳା ପଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଉତ୍ତମତର୍କ ବୋଲି ବୁଝା ଯାଇପାରେ । ସାଧାରଣତଃ ଗୁଣ୍ଡ ଜମି ନିକଟରେ ମୋଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ଚୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଆ ବା ସେମ୍ବର ଉକ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥାନ୍ତି ବା ବୁଢ଼ା ଉପର ଉଚ୍ଚତାରେ ଶିପ୍ରବେଗରେ ଶିକାରୀ ଅନୁପ୍ରସାରେ ଉଡ଼ୁଥାନ୍ତି । ଶୁଦ୍ର ଶୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀ, ମୁଣ୍ଡ, ଏଣୁ ଅ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋକ ଏମାନଙ୍କର ଆହାର । ଗୋଧୁଳି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାଦୁଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ଦିନବେଳର ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେବେ କେବେ ଉତ୍ତମତର୍କ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବଶ୍ୟ ସିପ୍ର ଗଡ଼ରେ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରି ଧରିନେଇଯାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ଅଣ୍ଟା ଓ ମାଈ ପକ୍ଷୀ ଉଭୟ ମିଶି ଶିକାର କରନ୍ତି । ଜଣେ ଶିକାରକୁ ତଡ଼ି ଘଡ଼ିତାଇ ଆଣେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୋଡ଼ାଇ ମାରେ । ତା' ପରେ ଉଭୟ ମିଶି ତା'କୁ ଖାଆନ୍ତି । ମାଈ ଅଣ୍ଟାଘାଟରୁ ବଡ଼ ହୁଏ । ସମୟ ସମୟରେ ଲୋକେ ମାଈ ଉତ୍ତମତର୍କକୁ ପୋଷ ମନାଇ ଶିକା ଦେଇ ଭରଦ୍ୱାଜ (roller), ଶାର୍ପ୍ ଶା (hoopoe), ବଣି (myna) ଓ ଚିତ୍ତର (partridge) ଆଦି ପକ୍ଷୀ ଧରନ୍ତି । ଶିକାର ପିଣ୍ଡ ଧରିଥିଲାବେଳେ ଏହାର ଉଡ଼ା ଶିପ୍ର ଓ ଶର ପରି । ଏତେବେଳେ ସେ ଶ୍ୟେନ (sparrow hawk) ପରି ଦ୍ରୁତ ଓ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପକ୍ଷ ସଞ୍ଚାଳନ କରଥାଏ । ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଉକ, କଳିଙ୍ଗ ଚିକ୍କାର ଧ୍ବନି କରେ । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଏହି ଶୁଦ୍ର ଶ୍ୟେନ (falcon)ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାମ୍ଭିକ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦାମ୍ ହୋଇଉଠନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନାଡ଼ ଥିବା ଗଛର ପାଖ ମାଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଯଥା—କାଉ ଓ ଚିଲଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଘଡ଼ିତାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଖୋଲ ଜମିରେ ଥିବା ଗଛରେ କାଠିରେ ମଞ୍ଚାପରି ନାଡ଼ ରଚନା କରନ୍ତି । 'ରକେ ଚାକାଟିରୁ ଗୁରୁଟି ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । ବର୍ଣ୍ଣ ଫକା ଲାଲଆସିଆ ଧଳା । ତା' ଉପରେ ଘନଭାବେ ଲାଲବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଛଟା ପଡ଼ିଥାଏ ।

ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଫରମିସ (Galliformes)—ଆମ ଦେଶରେ ଏହି ପକ୍ଷୀବର୍ଗର

ବଣ ହେଲେ ଫାଳିଆନିଡ଼ି (Phasianidae) ଓ ଅଧିକାଂଶ ପକ୍ଷୀ (Game birds) ଫାଳିଆନିଡ଼ି ବଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ । ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲେ, ଫେଲୋ ମୁର୍ଗି (Pheasant), ବଣକୁକୁଡ଼ା (Jungle fowl), ଚିତ୍ତର (Partridge) ଓ ପୁଣ୍ଡୁକ (quail) ଚଢ଼େଇ । ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୁଜୁରାଟୀ । ଏମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ନିଆ ଓ ମଧ୍ୟ ଆକାର । ଧନ ମଣ୍ଡଳାକାର । ପାଦ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆକାରର । ଅନେକ ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀର ଗୋଡ଼ରେ ପଦକ୍ଷେପ (spur) ଥାଏ । ପାଦର ନଖ ମଜଭୁତ ଓ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଲାଞ୍ଜ ସରଳ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଆମ୍ବୁଡ଼ିବା ଉପଯୋଗୀ ।

କଳା ଚିତ୍ତର (ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର 26)—ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘କଳା ଚିତ୍ତର’ (Black Partridge) । ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ କଳା ଚିତ୍ତର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହାଯାନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଫ୍ରାଙ୍କୋଲିନସ ଫ୍ରାଙ୍କୋଲିନସ’ (Francolinus francolinus); ହିନ୍ଦୀ ନାମ—କାଲ ଚିତ୍ତର । କଳା ଚିତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ସାଧାରଣଚିତ୍ତର (Grey Partridge) ଅଧିକ ପରିଚିତ । ଉଭୟ ଚିତ୍ତର ଆକାରରେ ପ୍ରାୟ ଏକାପରି । କଳା ଚିତ୍ତର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ, ଥୁଣ୍ଡା ଲଞ୍ଜିଆ ଶିକାର ପକ୍ଷୀ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ଚିତ୍ରପଣ୍ଡ କଳା ଓ ତା’ ଉପରେ ଧଳା ଓ ହଳଦିଆ ବାଦାମୀ ବର୍ଣ୍ଣର ଚିତ୍ତ ପଡ଼ିଥାଏ । ଅଣ୍ଟିର କଳା ଚିତ୍ତରକୁ ତା’ର ଗଣ୍ଡଦେଶରେ ଥିବା ଉଜ୍ଜୁଳ ଧଳାଚିତ୍ତ ଓ ଗଳା ଗୁରୁପଟେ ଥିବା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ପଟିଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ପକ୍ଷୀ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଫିକା, ପିଠି ପାଖରେ କଳା ଓ ଧଳାବର୍ଣ୍ଣର ଛୁଟା ଓ ଦାଗ ଚିତ୍ତ ଥାଏ ଏବଂ ବେକର ଉପର ପାଖରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଚିତ୍ତ ଥାଏ । ଏହି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ତର ପକ୍ଷୀ ଏକାକୀ ବା ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଉଡ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଓ ଆସାମର ଉତ୍ତମରୂପେ ଜଳ ପାଉଥିବା ବୁଦା ଝାଟି ଓ ଝାଟି ଜାଗାୟ ଜଙ୍ଗଲ, ଉଚ୍ଚ ଘାସ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ନଦୀପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଆଖିକ୍ଷେତ୍ର, ଜହ୍ନା ଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଗୁଁ ବଗିଚା ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାସସ୍ଥାନ । ଭୋର ଓ ସଞ୍ଜ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଏମାନେ ଶଯ୍ୟା ଟୁଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶନ୍ତି । ଏ ସମୟରେ କ୍ଷେତ୍ରର ସୀମାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଶଯ୍ୟା ଟୁଙ୍ଗି ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ କା’ ଆମ (moorhen) ପରି ଥୁଣ୍ଡା ଲଞ୍ଜକୁ ଉପରେ ଡେଇଁ କର ଉଠାଇ ରଖିଥାନ୍ତି । ଏହି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ସାଧାରଣତଃ ସାଧାରଣ ଚିତ୍ତର (Grey Partridge) ମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । କଳା ଚିତ୍ତର ଖୁବ୍



ଦେଖିବାରେ ଦୌଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ ଯିବାକୁ ତେଣୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର ଗୋଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ଭରକରେ । ଅବଶ୍ୟ ଅକସ୍ମାତ୍ ହାକୁଡ଼ିଗଲେ ବା ଟିକାର ଘଡ଼ଡ଼େଇବାବାଲାଙ୍କ (Beaters) ଠାରୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଉଡ଼ିଯାନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଅରକେ କେତେ ଶହ ମିଟର ମାତ୍ର ଉଡ଼ନ୍ତି । ଏହି ଉଡ଼ା ସବଳ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପକ୍ଷ ଦ୍ରୁତ ଘୃଷ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ । ଅରକେ ପ୍ରାୟ ତିନିମିନିଟରୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହେଉ ଶସ୍ୟ, ଘାସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛର ବାଳ, କଅଁଳ ଅଙ୍କୁର, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳପତ୍ର । ଅଣ୍ଟିର କଳା ଚିତ୍ତିରର ସ୍ତନ ଏକପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ସୁମୁର, ଧାତବ ଧୂନ । ଏହା ‘ଚିକ୍-ଚିକ୍-ଚିକ୍-କେରେକେକ୍’ ପରି ଶୁଣାଯାଏ । ଏହି ସ୍ତର ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା କର୍କଶ ଓ ସ୍ପର୍ଶାତ୍ମକ ଧୂନର ଏକ ଅଭିନବ ମିଶ୍ରଣ । ଶୁଣିବା ଲୋକର ମନର ଅବସ୍ଥା ଓ ଭାବନା ଅନୁସାରେ ଏହି ସ୍ତର ‘ଶୁବାନ-ତେସ-କ୍ବୁବାତ୍’, ‘ଲ୍‌ସନ-ପିଆଜ-ଅଦ୍ରକ’ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଶୁଣାଯାଇପାରେ । କଳା ଚିତ୍ତିର ଝାଉଁଳା ଗାୟ ବା ଘାସକ୍ଷମିରେ, ଘାସକୁଦା ମୂଳରେ ଏକ ଅଗଭୀର ନଡ଼ ରଚନା କରିଥାଏ । ଏହା ଘାସରେ ଘିଆରି ହୋଇଥାଏ । ସେଥିରେ ଅରକେ ଛଅଟିରୁ ଆଠଟି ଯାଏ ଅଣ୍ଟାଦିଏ । ଅଣ୍ଟାର ବର୍ଣ୍ଣ ଫିକା ସବୁଜ-ବାଦାମୀରୁ ପ୍ରାୟ ଘନବାଦାମୀ ହୋଇଥାଏ ।

ତତ୍ତ୍ୱର (ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର 27)—ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ଗ୍ରେ ପାର୍ଟ୍ରିଡ୍’ (Grey Partridge) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ—‘ଫ୍ରାଙ୍କୋଲିନାସ ପଣ୍ଡିଚେରିଆନସ’ (Francolinus Pondicerianus) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ—ଡ଼ିରି, ସଫେଦ ଡ଼ିରି । ଏହାର ଆକାର ଅଧା ବଡ଼ିଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ କୁକୁଡ଼ାର ଆକାର ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ । କଳାଚିତ୍ତିର ପରି ଏହା ସ୍ଥୂଳ ଓ ଅଳ୍ପ ଲୁହା । ଏହାର ମୋଟାମୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଧୂସର-ବାଦାମୀ; ଆଉ ତା’ ଉପରେ କଳା-ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର କୃମି ପରି ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ । ଲୁହ କଞ୍ଚିତ ବାଦାମୀ । ବେକ ବାଦାମୀଅସ୍ଥିଆ ଓ ବେକରେ ଏକ ଭଗ୍ନ କଳା ବୃତ୍ତାକାର ଚିହ୍ନ ଥାଏ । ଅଣ୍ଟିର ମାଈଠାରୁ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଏବଂ ତା’ ପାଦରେ ପଦକଣ୍ଠ ଥାଏ । ଡ଼ିରି ଶୁଖି ଖୋଲି ଘାସ ଓ କଣ୍ଟାର ବୁଦ୍‌ବୁଦ୍‌କିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସକରେ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଗାଁ ଓ ଗୁପ୍ତଜମି ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ପକ୍ଷୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁସବୁ ଧର୍ମାସନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ତାହାରେ ଡ଼ିରିର ସୁମଧୁର ଧାତବ ଧୂନ ଗୋଟିଏ । ପ୍ରଜନନ କାଳ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୁରୁ-ଛଅଟି କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ସିଧାସଳରେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭୂମି ଓ ଗୋବର ଖେଳାଇ ଖାଦ୍ୟ

ସଂଗ୍ରହ କରୁଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଫଳ, ଭଜିତ ଜାତୀୟ କୋଳି ଓ କାଟ । ଉଇ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁର ମଳରେ ହେଉଥିବା ମଗ୍ଗଟ (maggot) ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟଖାଦ୍ୟ । ଭୟର ସୂଚନା ପାଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଦ୍ରୁତବେଗରେ ଏ ବୁଦ୍ଧାକୁ ସେ ବୁଦ୍ଧାକୁ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ଓ ଗ୍ରୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି କରି ବୁଦ୍ଧା ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି । ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଉଡ଼ିବାକୁ ବିଫଳ । ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସ୍ଥଳରେ ଦ୍ରୁତବେଗରେ ପକ୍ଷ ଦୃର୍ଘନକର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଇତସ୍ତତଃ ଶହେ ମିଟର ବା ଅଧିକ ଦୂର ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ି ଦେଇ ପୁଣି ଭୂମିରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦୌଡ଼ନ୍ତି । ସେମାନେ ରାତିରେ କଣ୍ଟାଳିଆ ଗଛଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି । ଅଣ୍ଟିର ଚିତ୍ତିରର ଡାକ ଏକପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ‘କାତତର, କାତବର’ ଇତ୍ୟାଦି ବା ‘ପାତଲ-ପାତଲ’ । ଏହା ଦ୍ରୁତ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ୱରଗ୍ରାମ ଜମଣ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ । ପିଲୁଦିନୁ ପାଲିଲେ ଚିତ୍ତିର ଭଲ ପୋଷ ମାନେ । କୁକୁର ପରି ମାଲିକ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଏ ଏବଂ ଡାକ ଶୁଣିଲେ ଦୂରରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚେ । ଗଞ୍ଜାପରି ଅଣ୍ଟିର ଚିତ୍ତିରକୁ ଲଢ଼େଇରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର ବେଶି । ଆମ ଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗମାନଙ୍କର ଖୁସିବାସିଆ ଓ ଛୁଟି ଦିନରେ ଅଣ୍ଟିର ଚିତ୍ତିର ଲଢ଼େଇ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆମୋଦ । କେଉଁ ଅଣ୍ଟିର ଜିତବ, ସେ ନେଇ ବାଜି ମରାମରିରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ହାରଜିତ ହୁଏ । ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟିର ଚିତ୍ତିର ବେଶି ଚିତ୍ତିରକୁ ହରାଇ ଚାହିଁ ଅନ୍ ହୁଏ, ତା’ର ଦାମ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ । ପଡ଼ିତ ବା ଦାସ ଜମିରେ କଣ୍ଟାବୁଦାମୂଳେ ଭୂମିକୁ ଆସି ଟିକିଏ ଖାଲୁଆକରି ଚିତ୍ତିର ତା’ ଉପରେ ଦାସ ଆଣି ଜମାଏ । ତାହା ତା’ର ନଡ଼ । ସେଥିରେ ଗୁରୁ ଆଠଟି ଯାଏ ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ଅଣ୍ଟାର ବର୍ଣ୍ଣ ବାଦାମୀ ହୁଏ । ସେଥିରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନ ଥାଏ ।

**ଚନକ-ଚନା ପୁଣ୍ଡୁକ** (ବର୍ଣ୍ଣିତ 28)—ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘କଲାବ୍ରୁଡିଆ ପୁଣ୍ଡୁକ’ (Black breasted quail), ‘ବର୍ଷା ପୁଣ୍ଡୁକ’ (Rain quail) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘କୋଟୁରନିକ୍ସ କରୋମଣ୍ଡେଲିକା’ (Coturnix coromandelica) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ—ଚନକ-ଚନା ବାଟେର । ଏହାର ଆକାର ସାଧାରଣ ଚିତ୍ତିରର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଓ ଏହା ଅବକଳ ସାନ ଗୁଞ୍ଜର ଏକ ଚିତ୍ତିର । ଏହାର ଉପର ପାଖର ବର୍ଣ୍ଣ ପୀତାଭ ବାଦାମୀ ଆଉ ତା’ ଉପରେ ଫିକା ଗାର ଗାର ଓ ଅନୁସୂମିତଭାବେ ‘କଲା’ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ । ଅଣ୍ଟିର ଗୁଡ଼ି ଅଂଶର ଉପର ଆଡ଼ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଉଦ୍‌ଭାଗର ମଧ୍ୟଭାଗ କଲା । ମାଈ ପକ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ି କଲା ନୁହେଁ ଏବଂ ବେକରେ କଲା-ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣର



ଚିହ୍ନ ନଥାଏ ।

**ଘାଗୁସ ପୁଣ୍ଡୁକ**—ଏହାର ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ସାଧାରଣ ପୁଣ୍ଡୁକ ଚଢ଼େଇ’ (Common quail) ଓ ‘ଧୂସର ପୁଣ୍ଡୁକ’ (Grey quail) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ— ‘କୋଟୁରନିକ୍ସ କୋଟୁରନିକ୍ସ’ (Coturnix coturnix) । ଏହି ପୁଣ୍ଡୁକ ଚଢ଼େଇ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୀତ ଋତୁରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସନ୍ତି । ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀର ଢେଙ୍କିରେ ଜାହାଜ ଲଙ୍ଗର ପରି ଏକ କଳାଚିହ୍ନ ଥାଏ ଯାହା ଛୁଇଁ ଓ ପେଟରେ କୌଣସି କଳାଚିହ୍ନ ନଥାଏ । ମାଛ ପକ୍ଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ପରିମାଣରେ ଚନକ୍-ଚନା ପୁଣ୍ଡୁକ ପରି; ମାତ୍ର ବଡ଼ । ହାତ ପାଖରେ ମାଛ ପକ୍ଷୀକୁ ତା’ର ମୁଖ୍ୟ ବା ପ୍ରଧାନ-ପରର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ଛଷଡ଼ ହଳଦିଆ ଓ ବାଦାମୀ ପଟାଚିହ୍ନଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହେବ । ଚନକ୍-ଚନା ପୁଣ୍ଡୁକ ଓ ଘାଗୁସ ପୁଣ୍ଡୁକ ଉଭୟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏକାପରି । ପୁଣ୍ଡୁକମାନେ ଭୂମିବାସୀ ପକ୍ଷୀ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେମାନେ ଘାସ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଆଡ଼ିଆଳରେ ରହନ୍ତି । ସେମାନେ ଭଲ ଦୌଡ଼ିପାରନ୍ତି ଓ ନିହାତି ଦରକାର ନ ହେଲେ ଉଡ଼ିବାକୁ ବିଚାରୁ । ସହସା ଉଡ଼େଇତ ହେଲେ ସେମାନେ ଏକପ୍ରକାର ପକ୍ଷ ଘୂର୍ଣ୍ଣନଦ୍ୱାରା ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତି ଓ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ିଯାନ୍ତି । ଉଡ଼ିଗଲାବେଳେ ପକ୍ଷଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସାଙ୍ଗକୁ ଏକପ୍ରକାର ମୃଦୁ ଚୁପ୍‌ଚୁପ୍ ଶବ୍ଦ ଜାତ ହୋଇଥାଏ । ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଉପରେ ଉଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ । ଘାସ ବା ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଗଛର ଠିକ୍ ଉପରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ତଳକୁ ଖସି ଲୁଚିଯାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଉଡ଼ିଯିବା (flight) ଶିଘ୍ର ଓ ସିଧା । ପକ୍ଷର ଦ୍ରୁତ ସ୍ଥଳରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଶସ୍ୟ, ଘାସ ଓ ଅଗଛର ବାଜ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ । ତା’ ସାଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ଉଇଁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋମଳ କୀଟ ଖାନ୍ତି । ଚନକ୍-ଚନା ପୁଣ୍ଡୁକର ସ୍ୱର ଏକପ୍ରକାର ସ୍ୱରଲୟଯୁକ୍ତ ଦୁଇତାନବିଶିଷ୍ଟ ସୁସ୍ୱର, ଶୁଣିବାକୁ ଏକପ୍ରକାର ‘ଡୁଇର୍-ଡୁଇର୍...ଡୁଇର୍-ଡୁଇର୍’ ଶବ୍ଦ ପରି । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଏହା ଅବିରାମ ଭାବେ, ବିଶେଷ କରି ସକାଳେ ଓ ସଞ୍ଜରେ ଏବଂ ମେଘାବୃତ୍ତ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ସାବଧାନ ଏବଂ ରାତିରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ । ଏହି ସ୍ୱର ଘାଗୁସ ପୁଣ୍ଡୁକର ସ୍ୱରଠାରୁ ଏକାବେଳକେ ଉନ୍ନତ । ଘାଗୁସ ପୁଣ୍ଡୁକର ଶବ୍ଦ ଏକପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚ ସୁସ୍ୱର ଓ ତା’ପରେ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ତାନ ଥାଏ । ଏହି ସ୍ୱର ଅନେକଟା ‘ଏଲିକୁଇଡ୍ ଓହ୍-ମି-ଲେସ୍’ ପରି । ଉଭୟ ଚନକ୍-ଚନା ପୁଣ୍ଡୁକ ଓ ଘାଗୁସ ପୁଣ୍ଡୁକର ମାଡ଼ ଏକାପରି । ଭୂମି ଉପରେ ଖାଲି କର ସେଥିରେ ଘାସ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ମାଡ଼

ଘାସ ଓ କ୍ଷେତ ଭିତରେ ଉତ୍ତମରୂପେ ଲୁଚିରହୁଥାଏ । ଥରକେ ଛ'ଟିରୁ ଆଠଟି ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । ଅଣ୍ଟାର ବର୍ଣ୍ଣ ଫିକା-ହଳଦିଆ-ବାଦାମୀ ଏବଂ ତା' ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଓ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବାଦାମୀ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ।

**ଗୁଣ୍ଡୁର** (ବର୍ଣ୍ଣିତ 29)—ଇଂରାଜୀରେ 'ଜଙ୍ଗଲ ଝାଟି ପୁଣ୍ଡୁକ' (Jungle Bush Quail) କହନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ପୁଣ୍ଡୁକ ଚଢ଼େଇ ଓ ଗିନି କୁକୁଡ଼ା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥାନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ପାରଡ଼ିକୁଲ୍ ଆସିଆଟିକା' (*Perdicula asiatica*) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ ଲେଓଂ । ଏହା ଆକାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣରେ ପୁଣ୍ଡୁକ ପରି । ଅଣ୍ଟାର ଗୁଣ୍ଡୁର ଉପର ପାଖର ବର୍ଣ୍ଣ ଘନ ହଳଦିଆ-ବାଦାମୀ, ତା' ଉପରେ କଳା ଓ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ । ତଳପାଖର ବର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଓ ସେଥିରେ ଲଗାଲଗି ହୋଇ କଳାଗାର ଥାଏ । ମାଈ ଚଢ଼େଇର ତଳପାଖ ଫିକା ହଳଦିଆ-ବାଦାମୀ । ଅଣ୍ଟାର ମାଈ ଉଭୟ ପକ୍ଷୀଠାରେ ଛତା ପାତାଳ-ବାଦାମୀ-ବର୍ଣ୍ଣର ଏକ ପୁଷ୍ପ ରେଖା ମୁଣ୍ଡରେ ଭ୍ରୂ ଉପରୁ ବେକର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ବିସ୍ତୃତ । ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଉଭୟର ଗଳାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବାଦାମୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଛୁପିରହୁ ରହୁଥାଏ । ଆଉ ଜାତିଏ ପୁଣ୍ଡୁକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ 'ପଥୁରୀ ଝାଟି ପୁଣ୍ଡୁକ' (Rock Bush Quail) କୁହାଯାଏ । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ପାରଡ଼ିକୁଲ୍ ଆରଗୁଣ୍ଡା' (*Perdicula argocondah*) । ପଥୁରୀ ଝାଟି ପୁଣ୍ଡୁକ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ଗୁଣ୍ଡୁର ପରି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ପୁଣ୍ଡୁକ ଚଢ଼େଇ ବାସକରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପାଖାପାଖି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଅଣ୍ଟାର ପଥୁରୀ ଝାଟି ପୁଣ୍ଡୁକର ଗଳାରେ ଥିବା ଚିହ୍ନ ବାଦାମୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଫିକା ଇଟାପରି ଲାଲ ଏବଂ ମାଈର ଗଳାରେ ଆଦୌ ଚିହ୍ନ ନ ଥାଏ । ଗୁଣ୍ଡୁର ଚଢ଼େଇ ପ୍ରାୟ ଖୋଲା ପର୍ଣ୍ଣ-ମୋଚୀ (deciduous) ଅରଣ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଖି ଘାସ ଓ ଚୁଡ଼ୁଡ଼ିକିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ରାତିରେ ପାଞ୍ଚଟିରୁ କୋଡ଼ିଏଟି ଯାଏ ପକ୍ଷୀ ଏକାଠି ବାସକରନ୍ତି । ଦିନବେଳେ ହୁରୁଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଗୁଡାମୁଲେ ବା ଅଳ୍ପ ଗହଳ ଘାସତଳେ ଏକାଠି ଆସିଯି ନଥାନ୍ତି । ଏତେବେଳେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ରହେ । ହଠାତ୍ ସେମାନେ ବାହାରିପଡ଼ି ବିଚଳିତ-ଭାବେ ପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣନକରି ଚଉଁର୍ଦିଗରେ ଖେଳାଇ ହୋଇ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଉଡ଼ିଯାଇ ପୁଣି ଲୁଚିଯାନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ମନେହୁଏ ହଠାତ୍ ଯେପରି ଗୁଣ୍ଡୁର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର 'ବିସ୍ଫୋରଣ' ଘଟିଲା ଓ ସେମାନେ ଛୁନୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପରି ଯେପରିଭାବେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଯଲେଇଯାନ୍ତି, ମନେହେବ ଏଇ ପାଦତଳେ ଚାପା ପଡ଼ିଗଲେ ପରା । ପରେ ପରେ ଶୁଦୁ

ସ୍ୱପ୍ନର ଧ୍ବନି ‘ହୁଇ-ହୁଇ-ହୁଇ...’ ଡାକିଦେଇ ସେମାନେ ପୁଣି ଏକାଠି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି । ପାଣି ଥିବା ଖାତକୁ ଗୁଣ୍ଡୁରି ପକ୍ଷୀମାନେ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ପିଇବାପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଦିନପରେ ଦିନ ତାଙ୍କର ସେଇ ଏକ ଛୋଟିଆ ଗୁମ୍ଫାରେ ସେମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଶସ୍ୟବାଜି, ଘାସ ଓ ଅଗଛ ମଞ୍ଜି, ଅଙ୍କୁର, ଉଇଁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବପତଙ୍ଗ । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀମାନେ ଜଳହସ୍ତିୟ ହୁଅନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଦୃଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନକରି ଏକପ୍ରକାର ବରକ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି । ଗୁଣ୍ଡୁରି ବୁଦ୍ଧିବୃଦ୍ଧିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ତୃଷ୍ଣୁଛ ମୂଲ ରାମ୍ପୁଡ଼ି ଘାଟିଦେଇ ମାଡ଼ ରଚନାକରେ । ଅରକେ ଗୁରୁ ଆଠଟିଯାଏ ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ଅଣ୍ଟାର ବର୍ଣ୍ଣ ଲହୁଣୀ ପରି ଧଳା; ତା’ ଉପରେ କୋଣସି ପ୍ରକାର ଚନ୍ଦ୍ର ନ ଥାଏ । ଗୁଣ୍ଡୁରିର ଅଣ୍ଟା ଚନକ-ଚନା ପୁଣ୍ଡୁର ଅଣ୍ଟାଠାରୁ ଏକାବେଳେ ଭିନ୍ନ ।

ଜଙ୍ଗଲ କୁକୁଡ଼ା (ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର 30)—ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ଧୂସର ବଣ କୁକୁଡ଼ା’ (Grey Jungle fowl) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଗ୍ୟାଲସ ସୋନେରାଟି’ (Gallus sonneratti) । ହନୀ—ଜଙ୍ଗଲ ମୁରଗୀ । ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଙ୍ଗଲ କୁକୁଡ଼ା ଓ ଝାଉଁଳକୁକୁଡ଼ା (Red jungle fowl) ଉଭୟକୁ ବଣକୁକୁଡ଼ା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଅଣ୍ଟିର ଓ ମାଈ ଜଙ୍ଗଲ କୁକୁଡ଼ା ଯଥାକ୍ରମେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଞ୍ଜା ଓ କୁକୁଟୀ ଆକାରର ହୋଇଥାନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାର ମୋଟାମୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଦାଗଦାଗିଆ ଧୂସର । ଲୁହ ଦାଆ ପରି ଓ ଧାତୁ ପରି କଳାରଙ୍ଗର । କୁକୁଟୀର ଉପର ପାଖ ବାଦାମୀ; ତଳପାଖର ବେଣୀ ଭାଗ ଧଳା ଓ ତା’ ଉପରେ କାଢ଼ ପରି କଳା ରଙ୍ଗର ଚନ୍ଦ୍ର ଥାଏ । ଜଙ୍ଗଲ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟି-ଗୋଟିକିଆ, ଦୁଇଟି କରି ବା ଛତ୍ର ଛତ୍ର ଦଳରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ବଞ୍ଚିଲେ ପାବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ବାଉଁଶ ଝାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ନାଗପୁର କଣ୍ଟା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ; ଜଙ୍ଗଲର ଯେଉଁଠି ବହୁଦିନତଳେ ଗଛ କଟା ହୋଇ ସଫା କରାଯାଇଥିଲା, ସେଠି ଅନାବନା ଗଛ ଉଠି ଯାଇଛି, ସେପରି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବୃକ୍ଷବାଟିକା(plantation)ରେ ଏମାନେ ରହନ୍ତି । ଜଙ୍ଗଲ କୁକୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ସୀମାବଦ୍ଧ । ବାଉଁଶ ବା କରୁ (Karvi) ବୃଦ୍ଧାରେ ଫୁଲ ଧରିଥିବା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜଙ୍ଗଲ କୁକୁଡ଼ା ଆସି ଜମା ହୁଅନ୍ତି । ଜଙ୍ଗଲ କୁକୁଡ଼ା ଓ ଝାଉଁଳକୁକୁଡ଼ା... ଉଭୟ ହରୁଡ଼ା ଓ ଝାଉଁ ପକ୍ଷୀ । ସକାଳେ ଓ ଉପରବେଳା ଭୂମି ଉତ୍ତରାଇ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ

ଆସନ୍ତି; ମାତ୍ର ଖୋଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗହଳିଆ ଗାଈଠାରୁ ବେଶି ଦୂରକୁ ଯା'ନ୍ତି ନାହିଁ । ଶୁଣିବ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇଲମାଣେ ବେଳକୁ ଲମ୍ବା କରି ଓ ଲଞ୍ଜକୁ ନୁଆଁଇ ବୁଦା ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଯାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଶସ୍ୟ, ଅଙ୍କୁର, ନାଗଫଳ ଫଳ ଓ କୋଳି (*Zizyphus*) । ପବନରେ ଖସିପଡ଼ିଥିବା ଫଳ; ଯଥା ବରଫଳ ଓ ସେ ଜାତୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛର ଫଳ (*Ficus spp*) ଜଙ୍ଗଲ କୁକୁଡ଼ାର ପ୍ରିୟ ଆହାର । ସେମାନେ ପୋକଜୋକ ଓ ପୋକମାନଙ୍କର ଲୁଚି ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଅଣ୍ଟିର ଜଙ୍ଗଲ କୁକୁଡ଼ାର ରାବ 'କୁକ୍-କୟା କୟା-କୁକ୍' । ଏହି ଡାକ 'କ୍ୟାଉକୁନ୍-କ୍ୟାଉକୁନ୍'ରେ ଶେଷ ହୁଏ । ଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓ ମୁହୂର୍ତ୍ତବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବାରୁ କେବଳ ଅଳ୍ପ ଦୂରଯାଏ ଶୁଣାଯାଏ । ଅଣ୍ଟିର ମୂର ଗାଁ ଗଦାଉପରେ, ଶୋଇଯାଇଥିବା ଗଛର ଗଣ୍ଡି ଉପରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁସ୍ଥ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସ୍ଥାନରେ ବସି ପକ୍ଷକୁ କଡ଼-ପଟିଆ ଉଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ଫଡ଼ଫଡ଼ କରି ତା'ପରେ ତା'ର ଡାକ ଦେଇଥାଏ । ତା' ଗୁରୁପାଖରେ ଶୁଣିପାରିବା ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଅଣ୍ଟିର ଏହି ଡାକର ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି ।

ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଟିର ଜଙ୍ଗଲ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ ମାଈ ସହୃଦ କିମ୍ବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଈ କୁକୁଡ଼ା ସହୃଦ ବାସକରେ, ତାହା ଠିକ୍ ଭାବେ ଜଣା ନାହିଁ । ଘନ ବୁଦାଭିତରେ ମାଟିକୁ ଉତ୍ତାରି ଛୋଟ ଗାତଭିତରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଦେଇ ନିଜ ରଚିତ ହୁଏ । ତା' ଭିତରେ ମାଈ କୁକୁଡ଼ା ଅରକେ ଗୁରୁଟିରୁ ସାତଟି ଯାଏ ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ଅଣ୍ଟାର ବର୍ଣ୍ଣ ଫିକାରୁ ଘନ-ବାଦାମୀ । ଅଣ୍ଟା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୁକୁଡ଼ାର ଅଣ୍ଟା ପରି ।

**ଝାଉଳକୁକୁଡ଼ା**—ଝାଉଳ ନାମ 'ଲଲ ବଣ ମୁରଗୀ' (*Red Jungle Fowl*) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ଗ୍ୟାଲସ ଗ୍ୟାଲସ' (*Gallus gallus*) । ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗୁହ-ପାଳିତ କୁକୁଡ଼ା ଆମର ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦମ ବଂଶଧର ହେଲା ଝାଉଳକୁକୁଡ଼ା । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ହିମାଳୟର ତରାଇ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ପାଦଦେଶରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଯାଏ ଏହି ବସ୍ତୁତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଶାଳବଣ (*Shorea robusta*) ଅଛି, ସେଠି ଝାଉଳକୁକୁଡ଼ା ରହନ୍ତି । ଏ ଜାତୀୟ କୁକୁଡ଼ା ଓ ଗଞ୍ଜା ଗୁହପାଳିତ ବାଣ୍ଟମ କସମ (*Bantam breed*) ଗଞ୍ଜା ଓ ମାଈ ପରି । ଝାଉଳକୁକୁଡ଼ା ଗଞ୍ଜାର ଡାକ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟମ କସମ ଗଞ୍ଜାର ଡାକ ପରି ।

**ମୟୂର (ବର୍ଣ୍ଣବିନ୍ଦ 31)**—ଭରତୀୟ ଉପଦ୍ଵୀପରୁ ଫେଜାଣ୍ଟ ମୁରଗୀ ବଂଶ

(Pheasant family) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେତେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ପରିଚିତ ଓ ଦର୍ଶନୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଲା ମୟୂର । ଏହାର ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ସାଧାରଣ ମୟୂର’ (Common Peafowl) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ପାଭୋ କ୍ରିଷ୍ଟାଟସ୍’ (Pavo Cristatus) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ ମୋର, ମୟୂର । ଏହା ଅଳ୍ପକାଳ ପୂର୍ବେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀରୂପେ ‘ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ’ ହୋଇଅଛି ।

ମୟୂର ଆମର ଏତେ ପରିଚିତ ଯେ ତା’ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବା ଅନାବଶ୍ୟକ । ମୟୂର ପରି ମୟୂରୀର ଚନ୍ଦ୍ରକା ନ ଥାଏ । ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଭ୍ରମ ଧାରଣା ଏହି ଯେ ଜାଳଜମିକିଆ ଚନ୍ଦ୍ରକା ବା ‘ଆଖି’ ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀର ଲୁହରେ ଥାଏ । ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଚନ୍ଦ୍ରକା ଥିବା ପରି ତା’ର ଲୁହ ନୁହେଁ । ସ୍ୱେଚ୍ଛୁଡ଼ିକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଓ ଲୁହ ଉପର ପାଖକୁ ଡାକି ଥିବା ପକ୍ଷ ମାତ୍ର । ମୟୂର ପରି ମୟୂରୀର ମୁଣ୍ଡରେ ଚୂଳ ଥାଏ; ମାତ୍ର ମୟୂରର ଚୂଳ ପରି ତାହା ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନୁହେଁ । ମୟୂରୀର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣିଗୁଣିକିଆ ବାଦାମୀ ଓ ବେକର ତଳପାଖର କିଛି ଅଂଶ ଧାତବ ସବୁଜ । ମୟୂରମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ପ୍ରତି ଦଳରେ ମାଈ ଅଣ୍ଟିର ଉଭୟ ପକ୍ଷୀ ଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପର୍ଣ୍ଣ-ମୋଚୀ (deciduous) ସମତଳ ଭୂମି ଓ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରନ୍ତି । କେତେକ ରୂରୁରେ ମାଈ ଓ ଅଣ୍ଟିର ଅଲଗା ଅଲଗା ବାସ କରିପାରନ୍ତି । ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୟୂରମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଖୋଲ ପଡ଼ିଆ ବା କ୍ଷେତକୁ ଚରିବାକୁ ବାହାରି-ଥାନ୍ତି । ଗୁଜରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ମୟୂର ମାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏଣୁ ସେଠାରେ ମୟୂର ଅର୍ଦ୍ଧ-ଗୃହପାଳିତ ପକ୍ଷୀରୂପେ ବାସ କରନ୍ତି କହିଲେ ଭୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ମୟୂରମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧାରଣା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବା ସାଧାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଭକ୍ଷକ ଶସ୍ତ୍ର ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୟୂର କେତେ ସତର୍କ ଓ ଚତୁର । ଏମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଅତ୍ୟୁତଭାବେ ପ୍ରଖର । ଏଣୁ ମୟୂରକୁ ଅତିକିରଣରେ ଧରିବା ଅସମ୍ଭବ କହିଲେ ଚଳେ । ସାମାନ୍ୟ ଭୟର ସୂଚନା ପାଇଲ୍‌ମାତ୍ରେ ସେ ଗଛତଳକୁ ଖସିଗୁଲିଯାଏ । ହଠାତ୍ ହାବୁଡ଼ିଗଲେ ବା ଲୁକ୍କାୟିତ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିବୁ ତଡ଼ି-ଆଣିଲେ, ସେମାନେ ସଖଇରେ ଓ ଶ୍ରମ ସହକାରେ ପକ୍ଷ ପିଟି ଅନେକ ସମୟରେ ରକେଟ୍ ପରି ସିଧା ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଯାନ୍ତି । ‘ଲୁହ’ ପ୍ରତିରୋଧକର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଥରେ ପକ୍ଷ ମେଲାଇ ଉଡ଼ିଲେ ବେଗ୍ ବେଗରେ ଗତି କରିପାରନ୍ତି । ଉଚ୍ଚ

ବୃକ୍ଷତାଳରେ ସେମାନେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରନ୍ତି । ପ୍ରଭାତରେ ଅଣ୍ଟିରା ମୟୂରର ଅସ୍ତ୍ରୀକର ଉକ୍ତ ‘ମେ-ଅ’ ଚିତ୍କାରରେ ଜଙ୍ଗଲଜଳ ପ୍ରତିଧ୍ବନିତ ହୋଇଉଠେ । ତା’ର ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ସାଙ୍ଗକୁ ଏହି ସାଉଁସ୍ ତାଙ୍କ ସତେ ଯେପରି ବିପକ୍ଷିତ ଚରମ-ସୀମା (antichlimax) । ଶଯ୍ୟା, କନ୍ଦ ଓ ଅଙ୍କୁର ମୟୂରମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଆହାର । ଅବଶ୍ୟ ଏହା ସବୁକୁ ଓ ମିଳିଲେ ଧୌକଜୋକ, ଏଣୁ ଅ, ସାନ ସାନ ସାପ ଆଦି ଖାଏ । ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମବାସୀମାନେ ମୟୂରକୁ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ; ସେଠାରେ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ କ୍ଷେତବାଡ଼ିରେ ନିର୍ଭୟରେ ପଶି ଅନେକ ସମୟରେ ନୂଆ ଲଗାଏଇଥିବା ଚିନାବାଦାମ ଓ ତାଲି ଜାତୀୟ ଶଯ୍ୟାକୁ ଖାଇ ବେଶ୍ କଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି କରନ୍ତି । ଭୂମିକୁ ଉଡ଼ିରାଇ ଅଳ୍ପ ଖାଲ କରି ମୟୂର କୁଟି ପଥ ପକାଇ ମାଡ଼ ରଚନାକରେ । ମାଡ଼ ଘନ ଲତାଗୁଳ୍ମ ଭିତରେ ଉତ୍ତମରୂପେ ଲୁଚିକାନ୍ତି ରହିଥାଏ । ଅବଶେ ମୟୂର ଚିନୋଟିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଯାଏ ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ଅଣ୍ଟାର ବର୍ଣ୍ଣ ଫିକା ହଳଦିଆରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ତିଆରି କଫିର ରଙ୍ଗ ପରି ହୋଇଥାଏ ।

ବର୍ଗ ଗ୍ରୁଇଫର୍ମିସ (Gruiformes)—ଏହି ପକ୍ଷୀବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ବିହଙ୍ଗ-ବିଶ ଶ୍ଵରଣୀୟ ଉପଦ୍ଵୀପରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୁଇଡ଼ି (ସାରସ ପକ୍ଷୀ) (Gruidae-cranes), ରାଲିଡ଼ି (ଡାହୁକ, କା’ମ ଆଦି) (Rallidae-Rails) ଏବଂ ଓଟିଡିଡ଼ି (ଡୁକୁନା ପକ୍ଷୀ) (Otididae-Bustards) ପ୍ରଭୃତି ବର୍ଗର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ।

ସାରସ ପକ୍ଷୀ (ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର 32)—ସାରସ (crane) ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ, ଯଥା ସାରସ (Saras crane), କମ୍ମନ୍ (common crane) ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟରେ ସାରସ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ । ଏହାର ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ସାରସ’ (Saras crane), ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଗ୍ରାସ ଏଣ୍ଟିଗନ’ (Grus antigone) । ହିନ୍ଦୀ—ସାରସ । ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାନ-ବିଶେଷରେ ଏହାକୁ ବଡ଼ ବଗ ଓ ଚେରଳ ମଧ୍ୟ କହୁଥାନ୍ତି । ଏହା ଧୂସରବର୍ଣ୍ଣର ଏକ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ । ଆକାର ଶାଗୁଣାର ଆକାର ପରି ଓ ଉଚ୍ଚତାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଉଚ୍ଚତା ହେବ । ଏମାନେ କ୍ଷେତ ଜମି ଓ ଜଳାଭୂମିରେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାନ୍ତି । କୁଆ କରିଥିବା ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କ ସହଜ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ କୁଆ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି । ସାରସ ପକ୍ଷୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ କେବେ କେବେ ଏମାନେ ଦଳ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଓ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସାରସ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି । ସାରା ଜୀବନକାଳ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର କେବଳ

ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରଜନନ ହୁଏ । ଅଣ୍ଡା ଶୁଣ୍ଠି-ମାଛ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁରକ୍ତ ଲୋକ-ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ ପୌରୁଣିକ କଥାରୂପେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ସାରସ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ପବନ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ । ଗ୍ରୀଷ୍ମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ; ଫଳରେ ଏମାନେ ସର୍ବତ୍ର ପୋଷ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷୀ ପରି ବିଚରଣ କରନ୍ତି । ଅପର ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ସାରସମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଦୁ ମାଂସ ପାଇଁ ଲୋକେ ଅତି ଆଗ୍ରହରେ ଶିକାର କରନ୍ତି । ଏହି ଅନ୍ୟ ଜାତି ସାରସମାନେ ଶିକାର ହେଉଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଓ ସଜାଗ । ସାରସ ପକ୍ଷୀ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ିବାପାଇଁ ତଳୁ ଉଠିବା ଚୁକ୍ତିରେ ଶ୍ରମ ସହକାରେ ଉଠେ; ମାତ୍ର ଥରେ ଉଠି ଆକାଶରେ ପକ୍ଷ ବିସ୍ତାର କଲେ ପରେ ଏହା ସବେଗରେ ଓ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଉଡ଼େ । ଧୀର ଅଥଚ ଛନ୍ଦୋମୟ ଭାବେ ବିରାଟ ପକ୍ଷ ସଞ୍ଚାଳନ ଫଳରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ସାରସ ପକ୍ଷୀର ବେକ ସମ୍ମୁଖକୁ ଓ ଗୋଡ଼ ପଛକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଭୂମି ଉପରେ ଥିଲାବେଳେ ଓ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଗତିକଲାବେଳେ ସେମାନେ ଏକପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚ, ପ୍ରତିଧ୍ବନିନଶୀଳ, ସୁତରାବ୍ୟାସୀ ଭୂସ୍ୱର ପରି ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାରସଯୋଡ଼ି ଦର୍ଶନୀୟ; ମାତ୍ର ହାସ୍ୟକର ନାଚ-କୁଦରେ ମତ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ମଥା ନତକରି ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିବାଦନ କରିବା, ପକ୍ଷ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ନାଚକୁଦ କରିବା ଭର୍ତ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଶଯ୍ୟା, କନ୍ଦ, ଅଳ୍ପର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପୋକଜୋକ, କମ୍ପୋଜ (mollusc), ବେଙ୍ଗ, ସରୀସୃପ ଓ ବେଳେବେଳେ ମାଛ ସେମାନଙ୍କର ଆହାର ହୋଇଥାଏ । କ୍ଷେତରେ ଅବାଧରେ ପଶିପାରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି କରନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ନୂଆ ଲଗାଯାଇଥିବା ଚିନାବାଦାମ ଓ ତାଲି ଜାମ୍ବୀୟ ଶଯ୍ୟା ଖାଇପକାନ୍ତି । ଜଳପ୍ଲାବିତ ଧାନକ୍ଷେତ ମଝିରେ ବା ଯାସପୁର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧ ବା ଜଳାଭୂମି ମଝିରେ ଥିବା ଟାପୁରେ ସାରସ ପକ୍ଷୀ ମାତ୍ର ରଚନାକରେ । ଶର, ନଳ ଓ କୁଟାରେ ପକ୍ଷୀବିଧା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବେଶ୍ ବଡ଼ । ଅରବିକ ସାରସ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ । ବର୍ଣ୍ଣ ଫିକା ସବୁଜିଆ ଧଳା ବା ଫିକା-ପାଟଳ ଧୂଳା । ବେଳେବେଳେ ତା' ଉପରେ ବାଦାମୀ ବା ବାଇଗଣି ରଙ୍ଗର ଛଟା ବା ଚିହ୍ନ ଥାଏ ।

ଆଉ ଦୁଇ ଜାତି ସାରସ ପକ୍ଷୀ ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ଶୀତଋତୁରେ ଭାରତୀୟ ଉପମହା-ଦେଶକୁ ଆସନ୍ତି ! ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାନ ସାରସଟି ହେଉଛି କେରକେସ । ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ‘ଡେମୋଇସିଲ୍’ (Demosille), ହିନ୍ଦୀରେ କରକସ ଓ କୁଞ୍ଜି କହନ୍ତି ।



ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଆନ୍ଥ୍ରୋଇଡେସ୍ ଭିରଗୋ’, (Anthrooides virgo) । ଏହାର ମସ୍ତକ ପରଦ୍ୱାରା ଆବୃତ । କାନ କଡ଼ରେ ଧଳା ଚକଚକ କରୁଥିବା ପକ୍ଷ-ଗୁଚ୍ଛ ରହୁଥାଏ । ବେକ ଓ ଗୁଡ଼ କଳା । ଅନ୍ୟ ଜାତି ସାରସ ପକ୍ଷୀଟି ହେଲେ କୁଲଙ୍ଗ । ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ‘ସାଧାରଣ ସାରସ’ (Common crane) ଓ ହିନ୍ଦୀରେ ‘କୁଲଙ୍ଗ’ ବୋଲି କହନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଗ୍ରାସ ଗ୍ରାସ’ (Grus grus) । ଏହାର ମସ୍ତକରେ ପର ନଥାଏ ଓ କଳା । ବେକର ପଛ ପାଖରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରକାଶକ ଏକ ଲଲ ଚନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଡାହୁକ (Rails) (ବଂଶ ରାଲ୍‌ଲିଡ଼)—(Family Rallidae) ମାନଙ୍କର ଆକାର ସ୍ତ୍ରୀରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର । ଏମାନେ ଜଳାଭୂମିରେ ଲୁଚିଛପି ବିଚରଣ କରନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ଲୁହ ଥୁଣ୍ଡା, ପକ୍ଷ ମଣ୍ଡଳାକାର, ଗୋଡ଼ ଓ ପାଦାଙ୍ଗୁଳ ଲମ୍ବା ଓ ପରସ୍ତନ । ଆମର ପରିଚିତ ଡାହୁକ (ବର୍ଣ୍ଣିତ 33)ର ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ଧଳାଗୁଡ଼ିଆ ଜଳମୂର୍ଗୀ’ (White-breasted waterhen) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ “ଆମାଉରନିସ୍ ଫୋହେନିକଉରସ୍” (Amauornis Phoenicurus) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ—ଜଳ ମୂର୍ଦ୍ଧି, ଡାହୁକ । ଏହା ଜଳାଭୂମିର ଏକ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ । ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ଶିଳଟ ରଙ୍ଗ ପରି ଧୂସର, ଲୁହ ଥୁଣ୍ଡା ଓ ଗୋଡ଼ ପରସ୍ତନ । ଆକାର ପ୍ରାୟ ଡିଝିର (Grey Partridge) ପରି । ଡାହୁକର ମୁହଁ ଓ ଗୁଡ଼ ଧଳା ଏବଂ ତାହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ । ଲୁହ ଉପରଆଡ଼କୁ ଡେଇଁ ଉପେ ଠିଆହୁଏ । ଲୁହ ତଳର ବର୍ଣ୍ଣ କଳଙ୍କ ଧରିଥିବା ପରି ଲାଲ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ । ଡାହୁକ ଜଳ ସମୀପାରୁ ଅଛନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଏକାକୀ ବା ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଏମାନେ ଜଳାଭୂମି ଓ ଗାଁ ପୋଖରୀ କଡ଼ରେ ଥିବା ନଳବଣ ଓ ବୁଦା ଭିତରେ ବା ନିକଟରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକାଳରେ ସେତେବେଳେ ଖାତ ସବୁ ଜଳରେ ଭରିଉଠେ ଓ ବର୍ଷାଜଳରେ ଚାରିଆଡ଼ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଡାହୁକ ବିଚରଣ ପାଇଁ ଭୂମି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଆସନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗୁଡ଼ାକଡ଼ ବୁଦାଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକଡ଼ର ହଡ଼ରେ ଥିବା ଘାସ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । ଡାହୁକ ସତର୍କତାରେ ଚାହିଦା ମାରୁଥିବା ସମୟରେ ବା ବୁଦା ଗୁଲୁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପନରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ, ତା’ର ଥୁଣ୍ଡା ଓ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଠିଆହୁଏ ବା ଲୁହ ମୁହଁମୁହଁ ଉପର ତଳ ହୋଇ ଧକେଇ-ଚକେଇ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ତା’ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୁହତଳେ ରହିଥିବା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଲାଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଶିଉଠେ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଲଜକୁଳା ପକ୍ଷୀ । ତା’ ଉପରେ କେହି ନଜର ରଖୁ ଏକଥା

ସେ କେଟକିଲେ ସହପାରେ ନାହିଁ । ସାମାନ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ମାତ୍ରେ ସେ ପଳାଇ ଲୁଚିଯାଏ; ମାତ୍ର ଯେଉଁ ତା' ଉପରେ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ହୁଏନାହିଁ, ସେଠାରେ ସେ ବଗିଚା ଓ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାନରେ ଆନନ୍ଦରେ ଓ ସୁସ୍ଥରେ ବୁଲୁଥାଏ । କାଟପତଙ୍ଗ, କମ୍ବୋଜ (mollusc), ଜିଆ, ମଞ୍ଜି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍‌ଭିଦ ପଦାର୍ଥ ଡାହୁକର ଆହାର । ବର୍ଷା ଋତୁ ଉନ୍ନତ ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଏହା ନୀରବ । ବର୍ଷା ଋତୁ ଏହାର ପ୍ରଜନନ ସମୟ । ସେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡର ଡାହୁକ ବଡ଼ ରାବ କରିଥାଏ ଓ କଲହପ୍ରିୟ ହୋଇଉଠନ୍ତି । ଏହା ପକ୍ଷ ଥିବା ବୁଝା ଗଛ ଉପରକୁ ଉଠି ତା' ଉପରେ କଡ଼ରେ ବା ମଝିରେ ବସି ଜୋରରେ ଆସଙ୍ଗ-ଲପସ୍ତ ଡାକ ଡାକିଥାଏ । ଏହି ଡାକ ପ୍ରାମାଣ୍ୟର ସାଧାରଣ ଡାକପରି ନୁହେଁ । ଏହି ଶବ୍ଦ କର୍କଶ, ଗାଢ଼ ପରି ହୁଙ୍ଗାର, କାକ ପରି ରାବ ଓ ହାସ୍ୟସୂଚକ ଶବ୍ଦଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏହା ଏକପ୍ରକାର ଧାତବ ଶବ୍ଦ; ଯଥା—ଡର—ଡାକ୍—ଡାକ୍; ଡର—ଡାକ୍—ଡାକ୍, ଇତ୍ୟାଦି । ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ମନେହୁଏ ଯେପରିକି ଗୋଟିଏ ଭଲ ବେଦନାରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି । ଏପରି ରାବ ପରେ ଅଣ୍ଡର ଡାହୁକ ଏକଭାବରେ କୁକ୍—କୁକ୍—କୁକ୍ ଶବ୍ଦ କରି ଲାଗିଥାଏ । ଏହି ଶବ୍ଦ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଛୋଟ ସିନ୍ଦୂରମୁଣ୍ଡ ପକ୍ଷୀ (Coppersmith barbet)ର ଶବ୍ଦ ଭଳି; ମାତ୍ର ତା' ଅପେକ୍ଷା ସୁରରେ ଉଚ୍ଚତର ଓ ଲମ୍ବରେ ଦୃଢ଼ତର । ଦୂରରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଅଟାକଲର ତୈଳଗୁଳିତ ଇଞ୍ଜିନ୍‌ର 'ପୁକିଙ୍ଗ' (Pookin) ଶବ୍ଦ ବୋଲି ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଭ୍ରମ ହୁଏ । ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଗାଁଗଣ୍ଡାରେ ସର୍ବତ୍ର ଆଧୁନିକତାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଅଟାକଲ । ଅଣ୍ଡର ଡାହୁକ ଏକାଦିକ୍ରମେ ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ବା ଅଧିକ ସମୟ ଡାକିଲେ ପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଘନ ସାରା ଡାକ ଦେଉଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ଆକାଶ ମେଘୁଆ ଥିଲେ, ସାରା ଘନ ତା'ର ଡାକ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ । ସାରା ରାତି ମଧ୍ୟ ଡାହୁକ ସେହିପରି ଡାକ ଦିଏ । ଭୂମି ଉପରେ ଗଛଲତା ତଳେ ଡାହୁକ ନୀଡ଼ ରଚନାକରେ । ଷ୍ଟୁଡ଼ ଶାଖା ପଛର ଓ ଲତାପତ୍ରରେ ଏହା ଚିଆର ହୋଇଥାଏ । ନୀଡ଼ର ଆକାର କପ୍ ପରି; ମାତ୍ର ଅଗଭୀର । ଜଳ ନିକଟରେ ଘନ ବୁଢ଼ାରେ ନିମ୍ନରୁ ଏକ ବା ଦୁଇ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ମଧ୍ୟ ଡାହୁକ ନୀଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ । ଅରକେ ଛ'ରୁ ସାତଟି ଯାଏ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ । ଅଣ୍ଡାର ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଧ-ସର ପରି ହଳଦିଆ ବା ପାଟଳିଆ ଧଳା । ତା' ଉପରେ ଲଲ ବାଦାମୀ ଛଟା ବା ଚିହ୍ନ ଥାଏ ।

ଡାହୁକ (Rail) ବର୍ଗର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱାମୀ ମାତ୍ର କେତେକ ପରିମାଣରେ ପରିପାକ୍ଷୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଲା କା'ଆମ (ବର୍ଣ୍ଣଚିହ୍ନ 34) । ଏହାର ଇଂରାଜୀ ନାମ 'ବାଇଗଣା

କା'ମ (Purple Moorhen); ଝିଙ୍କାନକ ନାମ 'ପୋରଫାଲରିଡ଼' (Porphyrion porphyrio); ହୁଆ ନାମ—କାଲମ୍, ଖାଲମ୍, କାଲମ୍ । ଓଡ଼ିଆରେ କା'ଆମକୁ କାନ ଓ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାନ୍ତି । ଏହାର ଆକାର ଗ୍ରାମ୍ୟ କୁକୁଟୀ ଆକାର ହେବ । ବର୍ଣ୍ଣ ବାଇଗଣୀ ନଳା ପାଦ ଓ ଅଙ୍ଗୁଳି ଲମ୍ବା, ଅନାବୃତ୍ତ ଓ ଲଳ । ମସ୍ତକର ଭାଗ (Frontal shield-ଭଲ୍‌ସ୍‌ଟି ଡାଲକ) ପରସ୍ପର ଓ ଲଳ । ଛୁଦ୍ର ଓଜନିଆ ଲଳ ଥଣ୍ଡା ଧଳା ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଏହି ଲଳ ଭଲ୍‌ସ୍‌ଟି ଡାଲକ ଗଠନ କରିଥାଏ । କା'ଆମର ଲୁହ ଥଣ୍ଡା ଓ ଲୁହ ତଳଭାଗ ଧଳା । ପ୍ରତି ପଦ୍ମେପରେ ଲୁହ ଉପରକୁ ତଳକୁ ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଧଳାବର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ । କା'ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଲଳ ଭଲ୍‌ସ୍‌ଟି ଓ ଲୁହ ତଳର ଧଳାବର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷ ସଙ୍କେତ । ଜଳାଭୂମିର ନଳବଣରେ କା'ଆମମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ବିଶିଷ୍ଟ ଭାବେ ଶର ଭିତରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଛୁପି ଛୁପି ରୁଲୁଥାନ୍ତି । ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଟଳମଟଳ ହୋଇ ଚାଲିଲେ ଯେପରି ଦେଖାଯାଏ କା'ଆମମାନେ ନଳ ଉପର ଦେଇ ଉଠିବା ଓ ଖସିଲାବେଳେ ସେହିପରି ଦେଖାଯାଏ । ସେମାନେ ଭସମାନ ଶର ଓ ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ଟହଲ ମାରିଲାବେଳେ ଡାହାଣମାନଙ୍କ ପରି ଥଣ୍ଡା ଲୁହ ଉପର ତଳ ଉଠେ ପଡ଼େ । ଭୟର ସୂଚନା ମିଳିଲେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଯାଇ ଲୁଚିଯାନ୍ତି । ସେମାନେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ପରାଞ୍ଚ ମୁଖ ଓ ନିହାତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଉଡ଼ିଥାନ୍ତି । ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ମନେହୁଏ ସତେ ଯେପରି କଷ୍ଟରେ ଉଡ଼ିଛନ୍ତି । ଉଡ଼ିତୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିହେଳ ଜଣାପଡ଼େ । ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ଘାସ ଲମ୍ବା ପାଦ ଦୁଇଟି ପଛ ଆଡ଼କୁ ଝୁଲି ରହୁଥାଏ; ମାତ୍ର ଥରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭକଲେ ସେମାନେ ବେଶ୍ ଦ୍ରୁତବେଗରେ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି । ଧାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଙ୍କୁର କା'ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଧାନକ୍ଷେତର ଛିଡ଼ି କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଯେତେ ଧାନ ଖାନ୍ତି, ତା' ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଧାନଗଛକୁ ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ପାଦରେ ଦଳି ନଷ୍ଟ କରିପକାଇଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ପୋକଜୋକ ଓ କମ୍ବୋଜ (mollusc—ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା, ଆଦି) ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଶରବଣ ଭିତରୁ ଦିନସାରା ବିଶେଷକରି ମେଘୁଆ ପାଗରେ ସେମାନଙ୍କର ନାନା ପ୍ରକାର କକଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଅଣ୍ଟିରୁ କା'ଆମମାନେ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ଅଣ୍ଟିରୁ କା'ଆମ କେତେକ ଅଭିସାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ । ତାହା ହେଲେ ଥଣ୍ଡାରେ ଦଳ ଧରି ଆହ୍ଲାଦକର ଶବ୍ଦ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାଆଡ଼କୁ ମୁହଁକରି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଆଇବା ଓ

ଉପାଦାନ । ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପକ୍ଷୀମାନେ କା'ଆମକୁ ଏକ 'ଶିକାର ପକ୍ଷୀ' (game bird) ବୋଲି କହିବାର ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟାଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଏହାର ମାଂସକୁ ଖୁବ୍ ଭଲପାନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ଦାଉଯୋଗୁଁ କା'ଆମ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପାସିତ ହୁଅନ୍ତି । ପାଣି ଉପରେ ଭସୁଥିବା ଶରବଣ ଭିତରେ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରକୁ ମଣିଷାପରି ଯୋଷି ଲା' ଉପରେ ଶର ବା ଧାନପତ୍ର ଗୁଚ୍ଛ ପକାଇ କା' ଆମ ମାଡ଼ ରଚନାକରେ । ମାଡ଼ ଖେଳ ବଡ଼ । ଥରକେ ସେଥିରେ ଚିନୋଟିରୁ ସାତଟି ଯାଏ ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ଅଣ୍ଟାର ବର୍ଣ୍ଣ ହଳଦିଆରୁ ଲାଲ୍‌ଆସିଆ ହଳଦିଆ । ତା' ଉପରେ ଲିଳିବାଦାମୀ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ଛଟା ଦାଗ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଆମର ହୁକୁନା ଜାତୀୟ (Bustards) ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ (ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଣ୍ଣ—Family Otididae) ହୁକୁନା (ବର୍ଣ୍ଣର 35) ବୋଧହୁଏ ସବୁଠାରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହାର ଇଂରାଜୀ ନାମ 'ବୃହତ୍ ଭରଣୀୟ ହୁକୁନା ପକ୍ଷୀ' (Great Indian Bustard) ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'କୋରିଓଟିସ ନାଇଗ୍ରିସେପ୍ସ' (Choriotis nigriceps) । ହୁନା ନାମ—ବୁଦ୍ଧଦାର, ହୁକୁନା । ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭୂମିବାସୀ ପକ୍ଷୀ, ଆକାର ପ୍ରାୟ ଶାଗୁଣାର ଆକାର ହେବ । ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତଳୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରଯାଏ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ ପ୍ରାୟ ଏକ ମିଟର । ଏମାନେ ଓଜନରେ ପକ୍ଷର କଲେ ଯାଏ ହୁଅନ୍ତି । ହୁକୁନାକୁ ଦେଖିଲେ ମନେହୁଏ ସତେ ଯେପରି ଏହା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଓଟ୍ଟରୀ (Ostrich) । ଏହାର ଗୋଡ଼ ମଜଭୂତ ଓ ପରସ୍ପର ଏବଂ ଦେହ ଗୋଡ଼ ସହୃଦ ସମକୋଣ ଗଠନକରି ଭୂମି ସହୃଦ ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ । ଏହି ଲକ୍ଷଣମାନ ହୁକୁନା ପକ୍ଷୀର ବିଶେଷତ୍ୱ । ପିଠିର ପରର ବର୍ଣ୍ଣ ଘନ ଫିକା ପୀତାଭ; ସେଥିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୃମିପରି କଳାଗାର ପଡ଼ିଥାଏ । ଦେହର ତଳପାଖ ଧଳା । ଛୁଇଁବ ତଳ ଅଂଶରେ ଗଳାହାର ପରି କଳା ବର୍ଣ୍ଣର ଏକ ଓସାରୀଆ ଡୋରା ପଡ଼ିଥାଏ । ଧଳା ବେକ, ମୁଣ୍ଡର କଳା ଚୁଡ଼ା ଓ ଓସାରୀଆ ପକ୍ଷର ଅଗ୍ରାଂଶ ହିକଟରେ ଥିବା ଧଳା ଚନ୍ଦ୍ର, ଯାହା ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ—ଏହକୁ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହୁକୁନା ପକ୍ଷୀକୁ ଆହୁରି ସୁବିଧାରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ । ମାତ୍ର ହୁକୁନା ଅଣ୍ଡିରଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ । ହୁକୁନା ପକ୍ଷୀ ବିକ୍ଷିପ୍ତଭାବେ ଗୋଟି-ଗୋଟିକିଆ ହୋଇ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ବେଳେ ବେଳେ ଦୁଇ ଚିନୋଟି ପକ୍ଷୀ ଏକସାଙ୍ଗରେ ମାତ୍ର ବିକ୍ଷିପ୍ତଭାବେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଅଗତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନଭାବେ 25-30ଟି ଯାଏ ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯିବାର ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି । ଖୋଲା ଅର୍ଦ୍ଧ-ମରୁଭୂମି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ

ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିଆ ଗୋଟି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଗାଈମି ଥିବା ଖୋଲିରେ  
 ଭୃଣଭୂମି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାସସ୍ଥଳୀ । ହୁକୁନା ଗୋଟିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦଗ୍ରାସ ଓ ସନ୍ତୋଷ  
 ପକ୍ଷୀ । ଏଣୁ ଫଳଫଳିତ ବନା ଏହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରୟାସ କରୁଛି । ଅନ୍ଧକାର  
 ବୋଲି ମନେ ହେଉ ନଥିବା ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସି ବା ଓଟି ଉପରେ ବା ଓଟି  
 ପଛରେ ଯାଇ ହୁକୁନା ପକ୍ଷୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିହୋଇପାରେ । ଦୁଇ ଗ୍ୟର କଥା ଏହି  
 ଯେ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ନିର୍ବୋଧ-ବନ୍ଧୁ ଲୋକ ଶିକାରୀମାନଙ୍କର ଜିପ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ସନ୍ଦେହ  
 କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଫଳରେ ହୁକୁନା ପକ୍ଷୀ ମାରବା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଲେ  
 ମଧ୍ୟ, ଗତ କେଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହିପରି ଭାବେ ଚୋର ଶିକାରୀମାନଙ୍କର ଦାଉରେ  
 ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ପ୍ରାୟ ଲେପ ହେବାକୁ ବସିଛି । ଓଜନଦାର ଜନସବୁ ଉଠାଇଦାରେ  
 ଯେପରି ଶ୍ରମ ହୁଏ, ହୁକୁନା ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଥମେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଉଠିଲେବେଳେ ସେହିପରି ଜଣା  
 ପଡ଼େ । ମାତ୍ର ଥରେ ଆକାଶକୁ ଉଠି ଉଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ଦୃଢ଼ଭାବେ ସ୍ଥିର  
 ଓ ଛନ୍ଦମୟ ଗତିରେ ପକ୍ଷ ଦୋହଲାଇ ଥରକେ ବହୁ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଉଡ଼ିଯାଏ ।  
 ଅବଶ୍ୟ କେବେହେଲେ ସେ ବହୁତ ଭିତରେ ଉଡ଼େ ନାହିଁ । ସାନ ବଡ଼ ଶିଶୁକା,  
 କୋଟଲି (beetle), ଶସ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟର କୋମଳ ଅଙ୍ଗୁର ଏମାନଙ୍କର  
 ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ । ଏଣୁ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେପ, କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ସାପ ଏବଂ ତେନ୍ତୁଳିଆ ଶୁଣ୍ଠି  
 ଆଦି ପ୍ରାଣୀ (Centipedes) ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ଯାଏ । ଭୟଶୂନ୍ୟ ହେଲେ  
 ହୁକୁନା ଏକପ୍ରକାର 'ହୁକ୍' ଶବ୍ଦ କରେ । ଅଣ୍ଟିର ହୁକୁନା ବହୁପ୍ରକାର । ଏକପ୍ରକାର  
 ଅନୁଜ ବଳାପୟନ ପରି ଶବ୍ଦ କରି ସେ ଭାର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସଗର୍ବରେ ପଦ-  
 ଚରଣା କରି ନିଜକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଅଣ୍ଟିର  
 ଟାଙ୍କି ବା ପେରୁ ପକ୍ଷୀ (Turkey)ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରି । ମାତ୍ର ହୁକୁନା ଥରକେ ଗୋଟିଏ  
 କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଢ଼ାମୂଳ ଆମ୍ବୁଡ଼ି ସେହି  
 ଖାତରେ ହୁକୁନା ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ଅଣ୍ଟାର ବର୍ଣ୍ଣ ମସିଆ ଫିକା ବାଦାମୀ ବା ଅଳ୍ପ ସବୁଜ-  
 ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର । ତା' ଉପରେ ହାଲୁକା ଭାବେ ଘନ ବାଦାମୀ ବର୍ଣ୍ଣର ଚନ୍ଦ୍ର ଥାଏ ।

ବର୍ଗ କାରାଡ୍ରି ଫରମିସ୍ (Charadri formes)—ଏହା ଗୋଟିଏ  
 ଗୁଡ଼ି ପକ୍ଷୀବର୍ଗ । ଏଥିରେ ତେରଟି ଭିନ୍ନବିଧ ଜଳଗୁରା ବା ଜଳତଟବାସୀ  
 ପକ୍ଷୀବିଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଭରଣସ୍ଥ ଉପତୀପରେ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆବାସୀ (resident)  
 ବା ପ୍ରବାସୀ ଭାବେ ଉତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଏହି ପକ୍ଷୀବିଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ  
 ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଜାକାନିଡ଼ି (Jacanidae) । ଦଲଟ୍ରମି (Jacana or Lilytrot-

ଚିତ୍ର ନଂ 33

ଡାହୁକ

( Whitebreasted Waterhen )

ପୁଷ୍ପା ନଂ 76 ଦେଖ







ଚିତ୍ର ନଂ 34  
 ବା'ଆମ  
 ( Purple Moorhen )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 77 ଦେଖ




ଚିତ୍ର ନଂ 35  
କୁଡୁଳା  
( Great Indian Bustard)  
ପୃଷ୍ଠା ନଂ 79 ଦେଖ






ଚିତ୍ର ନଂ 36  
 କାଳି ଶିଳ୍ପ  
 ( Bronzewinged Jacana )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 81 ଦେଖ

ଚିତ୍ର ନଂ 37  
ଟେଣ୍ଡୋଇ  
( Redwattled Lapwasing )  
ପୃଷ୍ଠା ନଂ 82 ଦେଖ







ଚନ୍ଦ୍ର ନଂ 38  
 ଭୂ' ଚଢ଼େଇ  
 ( Common Sandpiper )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 84 ଦେଖ


କ୍ର. ନଂ 39

କିରୀଟ

( Little Ringed Plover )

ପୃଷ୍ଠା ନଂ 85 ଦେଖ





ଚିତ୍ର ନଂ 40


ଗମା ଚଢ଼େଇ

( Stone Curlew or Goggle-Eyed Plover )

ପୃଷ୍ଠା ନଂ 86 ଦେଖ



ଚିତ୍ର ନଂ 41  
ମାଛଖିଆ  
( Brownheaded Gull )  
ପୃଷ୍ଠା ନଂ 88 ଦେଖ






ଚିତ୍ର ନଂ 42  
 ଲୁଇ ବୁଲୁନି  
 ( Indian Whiskered Tern )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 90 ଦେଖ

ଚିତ୍ର ନଂ 43  
 ସାଧୁ ଚିତ୍ରିତ  
 ( Common Sandgrouse )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 92 ଦେଖ






ଚିତ୍ର ନଂ 44  
 ହରିଡ଼ ଚଢ଼େଇ  
 ( Common Green Pigeon)  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 93 ଦେଖ



ଚିତ୍ର ନଂ 45  
ପାବନ  
( Blue Rock Pigeon )  
ପୃଷ୍ଠା ନଂ 94 ଦେଖ





ଚେ ନଂ 46  
 କପୋତ ( Spotted Dove )  
 ଲଲ କପୋତ ( Red Turtle Dove )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 95 ଦେଖ





ଚିତ୍ର ନଂ 47  
 କେଳି  
 (Rose-ringed Parakeet)  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 97 ଡେଇଁ



ଚିତ୍ର ନଂ 48  
କୋଇଲି  
( Koel )  
ପୃଷ୍ଠା ନଂ 98 ଦେଖ

fers), ଏହି ବନ୍ଧର । ଦୁଇ ଜାତି ଦଳଫିଙ୍ଗି ଦେଖାଯାନ୍ତି । ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା କାଳି ବେଙ୍ଗଲେଇ (ବର୍ଣ୍ଣବିଧି 36) । ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାନବିଶେଷରେ ଏହାକୁ ପାଣି ଡାହୁକି ବୁଲି ଦଳଫିଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ କହୁଥାନ୍ତି । ଇଂରାଜୀ ନାମର ଆକ୍ଷରକ ଅର୍ଥ 'ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପକ୍ଷ ଦଳଫିଙ୍ଗି' (Bronzewinged Jacana) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ମେଟୋପୋଡ଼ିଆସ ଇଣ୍ଡିକାସ' (Metopodius indicus) । ଏହା ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବାଗୋଡ଼ିଆ ଜଳାଭୂମି ପକ୍ଷୀ । ଆକାଶରେ ଚିତ୍ତର (Grey partirdge) ଚଢ଼େଇ ପରି ହେବ । ସାଧାରଣ ଆକୃତି କା'ଆମ (moor hen) ପରି । ଏହାର ମୁଣ୍ଡ, ବେକ ଓ ଗ୍ରୀବ ଚକଚକ କଲା; ପିଠି ଓ ପକ୍ଷ ଧାତବ ସବୁଜଆସିଆ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଲୁହ ଲଲ-ବାଦାମୀ । ଆଖିର ପଛ ଆଡ଼, ବେକର ପଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶ୍ୱେତାଶିଆ ଧଳା ଗାର ବସ୍ତୁତ ଓ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ । କାଳି ଝାଲେଇ ପକ୍ଷୀ ଆଖିକ ଭାବେ ଆଡ଼ିଆଲରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପଛର ଏହି ଗାରଯୋଗୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ହୋଇଯାଏ । ଅଗ୍ରାସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଦଳଫିଙ୍ଗି ସାଧାରଣତଃ ଧଳାସିଆ, ଲଲ ଆସିଆ ବା ବାଦାମୀ । ସବୁପ୍ରକାର ଦଳଫିଙ୍ଗିମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ପାଦାଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିଆଣୀର ପାଦପରି ଅତ୍ୟଧିକ ଲମ୍ବା । ଏହା ଫଳରେ ଦଳରେ ଆକୃତି ପୋଷଣ ଓ ଦହରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଭାବେ ଜୀବନ ବିତାଇବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଅଛି । ଜଳବାସୀ କୀଟ ଓ କମ୍ବୋଜ (mollusc), ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦର ମଞ୍ଜି ଓ ମୂଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ପଦାର୍ଥ ଏମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ । ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଦଳଫିଙ୍ଗି ପାଣି ଉପରେ ଭ୍ରମୁଥିବା ପକ୍ଷ ଓ କାଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଘୁପଦରେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରେ । ପଦାଙ୍ଗୁଳି ଅତି ଲମ୍ବା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ତା' ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେହର ଓଜନକୁ ବଞ୍ଚନ କରିଦେଇପାରେ । ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରା ନ ଯାଏ, ସେଠାରେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୟ କରନ୍ତିନାହିଁ । ଗାଁ ପୋଷଣମାନଙ୍କରେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହୋଇ ମାଠିଆ ବୁଢ଼ାଇ ପାଣି ନେଉଥିବେ ବା ଯୋବା ତାର ଅଭ୍ୟାସ ପଥର ଉପରେ ଶବ୍ଦକରି ଲୁଗା କାଟୁଥିବ—ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଦୂରରେ ଦଳଫିଙ୍ଗି ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୁଇଜାତି ଦଳଫିଙ୍ଗି ଉଭୟ ଭଲ ବୁଢ଼ାଳି ଓ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପହଁରି ପାରନ୍ତି ମଧ୍ୟ; ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଉଡ଼ା ଦୁର୍ବଳ । ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ସେମାନେ ଦ୍ରୁତବେଗରେ ପକ୍ଷ ସ୍ଥଗିତ କରନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ବେକ ସମ୍ମୁଖକୁ ପ୍ରସାରିତ ରହେ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଗୋଡ଼ ପକ୍ଷ ଆଡ଼େ ଘୋହୁଲୁଥାଏ । କାଳି ଝାଲେଇର ରାବ ଏକ ପ୍ରକାର କର୍କଶ ସ୍ୱର ଯାହା ଗାଳ ଓ

ଶୁଣିବାକୁ ‘ସିକ୍-ସିକ୍-ସିକ୍.....’ ପରି । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଦଳ୍ପଦଳ୍ପ ଭାରି ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି ଓ କଲହ କରନ୍ତି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସ୍ବଦ୍ଧ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଘଷୁଆ (grunt) ଶବ୍ଦ କରନ୍ଥାନ୍ତି ।

ଆମର ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଆବାସୀ ଦଳ୍ପଦଳ୍ପଟି ହେଲା ପାନ୍ଦ୍ର ଝାଞ୍ଜେଇ । ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ‘ଫେଜେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଜିଆ ଦଳ୍ପଦଳ୍ପ’ (Pheasant-tailed Jacana) କହନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆଜନକ ନାମ ‘ହାଇଡ୍ରୋଫାସିଆନସ୍ ଚିରୁରଗାସ୍’ (Hydrophasianus chirurgus) । ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଓ ବାସ କାଳିଝାଞ୍ଜେଇ ପରି ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦଳ୍ପଦଳ୍ପ ଏକାଠି ଏକା ପୋଖରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । ପାନ୍ଦ୍ର ଝାଞ୍ଜେଇ ପକ୍ଷୀର ବର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କଳା ଓ ଚକୋଲେଟ୍-ବାଦାମୀ ଏବଂ ଲଞ୍ଜି ଲମ୍ବା, ଗୋଜିଆ, ଦାଆ-ଆକାର ଓ ଫେଜାଣ୍ଟ ମୂରଗୀ (pheasant) ର ଲଞ୍ଜି ପରି । ଉଭୟ ମାଛ କାଳି ଝାଞ୍ଜେଇ ଓ ପାନ୍ଦ୍ର ଝାଞ୍ଜେଇ ଏକାଧିକ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ମାଛ ଦଳ୍ପଦଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡର ସହଜ ପ୍ରଜନନ ପରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ । ଅଣ୍ଡର ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ସମାଳ ଫୁଟାଏ ଓ ଶାବକ ପ୍ରତିପାଳନ କରେ । ମାଛ ପକ୍ଷୀ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଣ୍ଡର ପକ୍ଷୀ ସହଜ ସହବାସ କରି ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ । ଏହୁପରି ଭାବେ ସେ ପର ପର ବହୁ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଦଳ୍ପଦଳ୍ପ ଉଭୟ ଦିଗ କାଣ୍ଡକୁ ମୋଡ଼ି ଦଳ୍ପଦଳ୍ପ ଛୁଦ୍ର ନାଡ଼ ରଚନାକରେ । ନାଡ଼ ପାଣି ସିଙ୍ଗିବା ବା ବିଲ୍ଦ ଦଳ୍ପଦଳ୍ପର ଭାସମାନ ପଦ ଉପରେ ରହୁଥାଏ । କାଳି ଝାଞ୍ଜେଇ ପକ୍ଷୀ ଥରକେ ସାଧାରଣତଃ ଚାରିଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ । ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଗ୍ରୋଷ୍ଟ-ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର । ତା ଉପରେ ଆରୁରୁ ଜାବୁରୁ ହୋଇ କଳାରଙ୍ଗର ଜାଲଜାଲିଆ ଚିହ୍ନ ଥାଏ । ପାନ୍ଦ୍ର ଝାଞ୍ଜେଇ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ମସୃଣ, ସରୁନ ଆସିଆ ଗ୍ରୋଷ୍ଟ ବା ସରୁନ ବାଦାମୀ ଓ ତା’ ଉପରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନଥାଏ ।

ଟିକ୍‌ଟିକ୍ (Plover), ଚାନ୍ଦି (Sand piper) ଆଦି ପକ୍ଷୀ ଚାନ୍ଦିଞ୍ଜି (Charadriidae) ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏ ଦେଶର ଆବାସୀ ପକ୍ଷୀ ଓ ଆଉ କେତେକ ଶୀତକାଳରେ ପ୍ରଧାନତଃ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଆମର ଆବାସୀ ଟିକ୍‌ଟିକ୍ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଓ ପରିଚିତ ହେଲା ଚେଣ୍ଡୋଇ (ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର 37) । ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଟେଁଟେଇ, ଟିଅେଇ ଟିକ୍‌ଟିକ୍, ଟେଅେଇ ଆଦି ନାମରେ ପରିଚିତ । ଇଂରାଜୀ ନାମ Redwattled lapwing. ଓଡ଼ିଆଜନକ ନାମ ‘ଭେନେଲସ୍ ଇଣ୍ଡିକାସ୍’ (Vanellus indicus) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ—ଡିଉରି, ଡିଉରୀ । ଏହାର ଆକାର ଗ୍ରେ (grey Partridge) ର

ଆକାର ପରି ! ଉପର ପାଖର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରୋଞ୍ଜ-ବାଦାମୀ, ତଳ ପାଖ ଧଳା; ଗୁଡ଼ି, ମୁଣ୍ଡ ଓ ବେକ ଧଳା ଏବଂ ଆଖି ଆଗକୁ ଗାଢ଼ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଏକ ମାଂସଳ ଖଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ । ଗୋଟିଏ ଓଁସିରିଆ ଧଳା ପକ୍ଷୀ ପଛରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବେକର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଯାଇ ଦେହ ତଳ ପାଖର ଧଳା ସହଜ ମିଶିଛି । ଏମାନେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଅଥବା ଚିନି-ଗୁରୁଟି କରି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ଖୋଲା ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ଷିତ ଭୂମି ଓ ଗୋଗୁରଣ ଭୂମିରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ବିଶେଷକରି ପୋଖରୀ, ଗାଡ଼ିଆ ଥିବା ସ୍ଥାନର ପାଖ ଆଖରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଅନ୍ଧକୁ ଭୂମି ସହଜ ସିଧା ଠିଆ ବାଗରେ ରଖି ଏମାନେ ସବେଗରେ ଅଥଚ ଅଳ୍ପ ଦଉଡ଼ି ଦଉଡ଼ି ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ । ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଟିକିତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଗୁଣ । ଏମାନେ ଦିନ ଓ ରାତି ଉଭୟ ସମୟରେ ଜାଗ୍ରତ ଓ ସକ୍ରିୟ । ଟିକିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟ ଅବା ଶ୍ଵାପଦ ହେଉ, କୌଣସି ଅନାହତ ସନ୍ଦେହଜନକ ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କ ଲଲ୍ଲକାରେ ପ୍ରବେଶକଲେ ଟିକିତ ଉଦ୍‌ଘେଷିତ ଓ ଉନ୍ମତ୍ତ ଭାବେ ରାବକରେ । ଏହି ଧ୍ଵନି—‘ଡି-ଇ-ଡି-ଇ-ଡି’ ବା ‘ପି-ଟି-ଟି-ଡି-ଇ-ଡି’—ଆମର ଅତି ପରିଚିତ । ପ୍ରୟୋଜନ ଓ ଉଦ୍‌ଘେଷନାର ହେତୁ ଅନୁସାରେ ଏହି ରାବ କେବଳ ଥରେ, ଦୁଇଥର ବା ବାରମ୍ବାର ଉନ୍ମତ୍ତ ବା ଧୀରଭାବେ ଧ୍ଵନିତ ହୋଇଥାଏ । ମାଡ଼ ବା ଶାବକ ଆତ୍ମାନ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ହେଲେ ବିଚଳିତ ବାପ ମା’ ଉନ୍ମାଦଭାବେ ଚିତ୍କାର କରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ଅନାହତ ପ୍ରାଣୀ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ମାରନ୍ତି ଯଦେ ଯେପରି ତାକୁ ଆଘାତ କରିବେ । କାଟି ପତଙ୍ଗ, କୋଟଳ ଶୂଳ (grub) ଓ କମ୍ପୋଜ (mollusce) ଟିକିତମାନଙ୍କର ଆହାର । ପକ୍ଷର ବାରମ୍ବାର ସଞ୍ଚାଳନ ଫଳରେ ଏହା ଉଡ଼ିଥାଏ ଓ ଏହାର ଉଡ଼ା ଅତ୍ୟନ୍ତ । ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଉଡ଼ି ଟିକିତ ଓଁହୁଇ ପଡ଼େ ଓ ସାଧାରଣତଃ ଭୂର୍ମୁ ଛୁଇଁବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଳ୍ପ କେତେ ପାଦ ଦୌଡ଼ି ଯାଏ । ଭୂମିରେ ଛୋଟ ଖାତରେ ଏହା ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ଖାତରେ କୁଟା କାଠି ଦିଆଯାଇ ନ ଥାଏ ଓ ବେଳେବେଳେ କଡ଼ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଥାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଣିଲି ଗ୍ରାମ୍ୟ ପୋଖରୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରେ ଶୁଣି ରହୁଥିବା ଅନାବାଦୀ ଭୂମିରେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଟା ଦେବାକୁ ଭଲପାନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ କେତେକ ଅସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ‘ମାଡ଼’ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଯଥା—ବଙ୍ଗଳା ଦରର କଂଚିଟ ଗୁଡ଼ର ଚଟାଣ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ରେଳ ସାଇଡ଼ିଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ରେଳ ଧାରଣାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ବିଛାହୋଇଥିବା ପଥର ଉପରେ । ଟିକିତ

ଅରକେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାନ୍ଦି ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ଅଣ୍ଟାର ବର୍ଣ୍ଣ ଧୂସର-ବାଦାମୀ ଓ ଡା' ଉପରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଛୁପି ଛୁପିକା ଚିହ୍ନ ଥାଏ । ଅଣ୍ଟା ଏବଂ ନବଜାତ ପକ୍ଷିଶାବକ ବର୍ଣ୍ଣ ଏପରି ନିଖୁଣ ଭାବେ ପରିପାଶ୍ୱର୍ୟ୍ୟ ସହଜ ମିଶିଯାଏ ଯେ, ଆଖି ଆଗରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଜାଣି ହୁଏନାହିଁ ।

**ଗ. ଚଢ଼େଇ** (ବର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର 38)—ଏହାର ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ସାଧାରଣ ଗ୍’ ଚଢ଼େଇ’ (Common Sandpiper); ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ—‘ଟ୍ରିଙ୍ଗା ହାଇପୋଲେଉକସ’ (Tringa hypoleucos) । ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ନଗ୍ନପାଦ ଓ ସମ୍ପର୍କିତ ଶିଶୁ କଳାଭୂମି ଓ ଡରବାସୀ ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଗ୍’ ଚଢ଼େଇ (‘snippet’) ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଆମର ସାଧାରଣ ଗ୍’ ଚଢ଼େଇ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହାର ଆକାର ପ୍ରାୟ ପୁଣି ଗ୍’ ଚଢ଼େଇ (quail)ର ଆକାର ପରି । ପିଠି ପାଖର ବର୍ଣ୍ଣ ଧୂସରଥା ସବୁଜ-ବାଦାମୀ, ତଳ ପାଖ ଧଳା, ଛୁଇଁର କଡ଼ ମଝିଆ ଶ୍ୟାମଳ ଏବଂ ବେକର ଅଗ୍ରଭାଗରେ କେତୋଟି କଳା ରେଖା ପଡ଼ିଥାଏ । ଉଡ଼ୁଥିଲାବେଳେ ଏହାର ବାଦାମୀ ଲୁହ (କେବଳ ବାହାର ଆଡ଼କୁ କେତୋଟି ଧଳା ପର ଥାଏ) ଓ ବାଦାମୀ ଲୁହ ତଳ ଏବଂ ତେଣାରେ ଥିବା ଧଳା ରେଖାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ‘ଚୁପ୍‌କା’ (wood sandpiper) ଚଢ଼େଇଠାରୁ ବାରି ହୁଏ । ଗ୍’ ଚଢ଼େଇ ଓ ଚୁପ୍‌କା (ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାତି ଗ୍’ ଚଢ଼େଇ) ଉଭୟ ସମଭାବରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି । ଶୀତକାଳରେ ଆମ ଦେଶକୁ ପରିବ୍ରଜନରେ ଯେତେ ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଗ୍’ ଚଢ଼େଇ ସହଜ ଆସେ ଓ ଡେରିରେ ଯାଏ । ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ଏମାନଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା କାଶ୍ମୀର ଓ ଘରଓଁଲା । କେତେକ ପ୍ରଜନନ ନ କରୁଥିବା (non-breeding) ସାଧାରଣ ଗ୍’ ଚଢ଼େଇ ନ ବାହୁଡ଼ି ସାରାବର୍ଷିକ ଆମ ଦେଶର ସମତଳ ଭୂମିରେ କଟାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଚୁପ୍‌କା ଚଢ଼େଇ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ରହନ୍ତି; ମାତ୍ର ଗ୍’ ଚଢ଼େଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଗ୍’ ଚଢ଼େଇ ଏକାକୀ ପାଣି କଡ଼ରେ ଲୁହ ଅଂଶକୁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରି, ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ମୁଣ୍ଡ ଓ ବେକକୁ ଫୁଲାଇ ଅଙ୍ଗାନ୍ତ ଭାବେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲୁଥିବାର ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ହୁରୁଡ଼ିଲେ ସେ ଦେହକୁ ‘କାଠ’ କରି ଘୁଡ଼ି ପକ୍ଷସଞ୍ଚାଳନଦ୍ୱାରା ପାଣିର ଅଳ୍ପ ଉପରେ କର୍କଶ ପେଁ କାଳିଆ ‘ଟି-ଟି-ଟି’ ଶବ୍ଦ କରି ଉଡ଼ିଯାଏ । ଏଭଳିଭାବେ ଉଡ଼ିବା ଗ୍’ ଚଢ଼େଇର ବିଶେଷତ୍ୱ । ସ୍ତବ୍ଧରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ପୁନ୍ଦର ପେଁ କାଳିଆ, ସ୍ୱରରେ କେତେଥର ‘ହୁଇଟ୍, ହୁଇଟ୍’ ସ୍ୱନ କରିଥାଏ । ଗ୍’ ଚଢ଼େଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ



ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ପରେ ଘନ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁ' ଚଢ଼େଇ ତା' ଇଲକାରେ ଚରେ । ପୋକ ଜୋକ, ଛୋଟ ଛୋଟ କମ୍ବୋଲ (mollusc) ଆଦି ଗୁ' ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ । ଏସବୁକୁ ସେମାନେ ପାଣିକୂଳରେ ଟୁଙ୍ଗନ୍ତି । କଙ୍କରମୟ ତଟ ବା ପ୍ରବହମାନ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଟାପୁରେ ଭୂମିକୁ ଉଡ଼ୁରାଇ ସାମାନ୍ୟ ଖାଲୁଆ କରି ସେଥିରେ ପକ୍ଷୀ ଦେଇ ଗୁ' ଚଢ଼େଇ ନାଡ଼ି ରଚନାକରେ । ସାଧାରଣତଃ ଅରକେ ସେ ଗୁରୁଟି ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ଅଣ୍ଟା ହଲଦିଆ-କମ୍ପା ବା ପଥର ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ତା' ଉପରେ ଲାଲ-ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଛୁଟା ଓ ଗୁପ୍ତ ଥାଏ ।

**ବୁଫକା**—ଏହାର ଇଂରାଜୀ ନାମ 'କାଉ ଗୁ' ଚଢ଼େଇ' (Wood sand piper) ବା 'ଦାଗ ଦାଗିଆ ଗୁ' ଚଢ଼େଇ' (Spotted sand piper) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ଟ୍ରିଙ୍ଗା ଗ୍ଲାରେଓଲା' (Tringa glareola) । ଶୀତ ଋତୁରେ ଆମ ଦେଶରେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବ୍ରାଜୀ ପକ୍ଷୀ । ଏମାନେ ବହୁଦୂର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରୁ-ସାଇବେରିଆରୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ଦଳବଦ୍ଧଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି । ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଧଳା ପିଚ୍ ଓ ଲୁହ ଦେଖାଯାଏ । ଉଡ଼ିଲାବେଳେ 'ଚପ୍-ଚପ୍-ଚପ୍-ଚପ୍' ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶବ୍ଦଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗୁ' ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଚିହ୍ନି ହୁଏ ।

**ଜରଥା** (ବର୍ଣ୍ଣିତ 39)—ଏହାର ଇଂରାଜୀ ନାମ 'ଲିଟଲ ରିଙ୍ଗେଡ ପ୍ଲବର' (Little Ringed Plover) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ଚାରାଡ୍ରିୟସ୍ ଡ୍ୟୁବିୟସ୍' (Charadrius dubius) । ହୃଦା ନାମ ଜରଥା, ମେରଓଁ । ଏହା ପୁଣ୍ଡୁଳ ଚଢ଼େଇ (quail) ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ । ଏହା ଟିଟ୍ଟିଭ ପକ୍ଷୀ (Plover)ର ଏକ ପ୍ରତିରୂପ (typical) । କାରଣ ଏହାର ପିଠି ପାଖର ବର୍ଣ୍ଣ ବାଲିଆ-ବାଦାମୀ ଓ ତଳପାଖ ଧଳା; ମୁଣ୍ଡ ନିଦା ଓ ଗୋଲକାର; ପାଦ ନହକା ଓ ଅନାବୃତ୍ତ ଏବଂ ଅଣ୍ଟା ପାର୍ଶ୍ୱାଞ୍ଚ ପରି ଛୋଟ ଓ ମଜବୁତ୍ । ଜରଥାର ଲଲଟ (fore head) ଧଳା; ମୁକ୍ତକାନ୍ତ (fore crown), କାନକୁ ଢାଙ୍କିଥିବା ପରୁ ଓ ଆଖି ଗୁରୁପାଖ କଳା । ବେକର ପୁରା ଗୁରୁପଟେ କଳାରଙ୍ଗର ପଟି ଥାଏ । ଏହା ପଶ୍ଚାତ୍ ଗଳାବନ୍ଧ (hind collar)ର ଧଳା ଅଂଶକୁ ପିଠି ଉପରର ବାଦାମୀ ବର୍ଣ୍ଣଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରାଏ । ଠିକ୍ ଜରଥା ପକ୍ଷୀ ପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟିଟ୍ଟିଭ ପକ୍ଷୀ ଅଛି । ତାକୁ 'କେଣ୍ଟିଆ ଟିଟ୍ଟିଭ' (Kentish Plover) କହନ୍ତି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ଗୁରୁଡ୍ର ଆସ ଆଲେକସ ଜାଣ୍ଟି ନାସ'

(*Charadrius alexandrinus*) । ଜିରଆ ଉଡ଼ିଲବେଳେ ତା' ପକ୍ଷରେ ଧଳା ଶଳାକା ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ; ମାତ୍ର କେଶ୍ମିଆ ଟିଟ୍ଟିଭ ପକ୍ଷୀରେ ଏହି ଧଳା ଗାର ଥାଏ । ପକ୍ଷର ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଦା ନ କଲେ କେଶ୍ମିଆ ଟିଟ୍ଟିଭକୁ ଜିରଆ ବୋଲି ଭ୍ରମ ହେବା ସହଜ । ସନ୍ତସନ୍ତା ପୋଖରୀ କୂଳ, ନଦୀ ବନ୍ଧ ଓ ଜୁଆରୀଆ କାଦୁଆ ଭୂମିରେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଅଥବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ, ମାତ୍ର ବର୍ଷିତ୍ର ଭାବେ ଏମାନେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଋତୁ ଓ ଦ୍ରୁତ ପଦକ୍ଷେପରେ ଉଦ୍ୟମ ସହକାରେ ସେମାନେ ଭୂମିରେ ଦୌଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି ଓ ହଠାତ୍ ଅଟକି ଯାଇ ଏଟା ସେଟା ଟଙ୍କି ପକାନ୍ତି । ଆଉ ତା' ସହିତ ଟେଣ୍ଡୋଇମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣେଷ ଲକ୍ଷଣ—ଧକ୍କା ମାରିଲା ପରି ଲୁହ ପାଖ ଉପର ତଳ ହେଉଥାଏ । ଜିରଆମାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି । ନରମ କାଦୁଅ ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲାବେଳେ ଗାତ ଭିତରେ ବା ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ପୋକ, ବାଲି ଡୁରୁର (sand hopper) ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ କଙ୍କଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଡରାଇଇ ପଦାକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦ୍ରୁତ ପଦକ୍ଷେପଦ୍ୱାରା ପାଦ ବାଡ଼େଇ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ଉପରେକ୍ତ ଜୀବ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଆହାର । ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ସହିତ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକଭାବେ ମିଶିଯାଏ । ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚଳ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରିବା କଷ୍ଟକର । ଏହି ଋତୁ ଟିଟ୍ଟିଭ ପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କାଳରେ ବର୍ଷିତ୍ରଭାବେ ବୁଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭୟ ପାଇ ଉଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଡ଼ି ଦେଇ ଏକାଠି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଘୁରି ବାଂକ ଉଡ଼ିଯାନ୍ତି । ଏ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ତଳପାଖର ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ଏକାଠି ଥରକୁ ଥର ଝଟ୍କି ଉଠିଥାଏ । ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ଗୋଜିଆ ଦ୍ରୁତ ପକ୍ଷ ସଂଜ୍ଞାଳନଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଛିପି ବେଗରେ ଉଡ଼ନ୍ତି; ମାତ୍ର ଭୂମିଠାରୁ 415 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ିନାହିଁ । ସାଧାରଣତଃ ଥରକେ ଚାରିଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି । ନଦୀ ଶଯ୍ୟାର ଶୁଷ୍କ ବାଲିବନ୍ଧର କଙ୍କର ଉପରେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି । ଟେଣ୍ଡୋଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ତାହା ଉପର ଆଡ଼କୁ କଲାପରି ଗୋଜିଆ । ଜିରଆର ଅଣ୍ଡାର ଆରାମ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ । ତା' ଉପରେ ଘନ ବାଦାମୀ ଓ ବାଇଗଣି ରଙ୍ଗର ଗିଜିର ମିଳିତ ରେଖା ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଥାଏ । ଅଣ୍ଡାର ବର୍ଣ୍ଣ ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ମେଲ ଖାଉଥିବାରୁ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣା ପଡ଼େନାହିଁ ।

**ରମା ଚଢ଼େଇ** (ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର 40)—ଏହା ବୁରହିନିଡ଼ି (*Burhinidae*) ବଂଶ

ଅନୁଗତ । ଏହାର ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ପଥର କାର୍ଲୋ’ (stone curlew) ବା ‘ଗଗଲ ଆଖିଆ ଟେଣ୍ଡୋଇ’ (Goggle-eyed Plover) । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ବୁରହୁନାସ ଓଇଡିକ୍ନେମସ’ (Burhinus Oedicnemus) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ— କରଓଁନକ୍ ବା ବରସିରି । ଏହା ଟେଣ୍ଡୋଇ ପରି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଓ ଭୂମି ଉପରେ ବାସକରେ । ଦେହରେ ବାଦାମୀ ଡୋରୀଆ ଦାଗ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହା ଚିତ୍ତ୍ରିର ପକ୍ଷୀଠାରୁ ବଡ଼ । ରାମା ଚଢ଼େଇର ଗୋଡ଼ ଚିତ୍ତ୍ରିର ପକ୍ଷୀର ଗୋଡ଼ଠାରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବ ମଧ୍ୟ । ଏହାର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଲକାର ଓ ଗୋଡ଼ର ଆଣ୍ଟ ମୋଟା । ଆଖି ବଡ଼, ଗୋଲକାର ଓ ଗଗଲ ଚପମା ପିନ୍ଧିଲା ପରି । ଉଡ଼ୁଥିଲାବେଳେ ପକ୍ଷର ଉପର ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଧଳା ଅଣ-ଓସାରିଆ ଡୋରୀଆ ଦାଗ ଓ ମୁଖ୍ୟ ପରଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ର ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଓସାରିଆ ଧଳା ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣଦ୍ୱାରା ରାମା ଚଢ଼େଇକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ । ଖୋଲ ଝାଟି ଓ ବୁଦ୍‌ବୁଦିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ, କର୍ଷତ ଓ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା ଜମି ଏବଂ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ନଦୀର କଙ୍କରିଲ ଶଯ୍ୟାରେ ରାମାଚଢ଼େଇ ବାସକରେ । ବେଳେବେଳେ ଏହା ଗ୍ରୀମ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପକ୍ଷ ଝଡ଼ୁଥିବା (deciduous) ହାଲୁକା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଝଙ୍କାଳିଆ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବା ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଏମାନେ ବାସ କରନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଚାରିଟିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଯାଏ ପକ୍ଷୀ ଥାନ୍ତି । ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଚଷ୍ମ ବଡ଼, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୋକ ଓ ରାତିରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି । ରାମାଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଦୋଷ ଓ ଗୋଧୂଳିର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୋକ ଓ ରାତିରେ ଚଳୁଥିବାବେଳେ ଏବଂ ଦିନବେଳା ନିଷ୍କ୍ରମ୍ଭ । ଭୟର ସୂଚନା ପାଇଲେ ବା ଡରକଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଂସପରି ତଳଆଡ଼କୁ ବଙ୍କାଇ, ବେକକୁ ଦେହ ସଳଖରେ ସିଧାରିଖି, ଦ୍ରୁତ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦକ୍ଷେପରେ ଖସି ପଳାଇଯାଏ । ତା’ପରେ ବୁଦା ବା ପଥର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେହକୁ ତଳେପାରି ଜଡ଼ ପରି ବସିରହେ । ଏତେବେଳେ ବେକ ଆଗଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ ରହୁଥାଏ ଓ ବିଚ୍ଛାରିତ ନେତ୍ରରେ ସେ ଆଗନ୍ତୁକର ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟକରେ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରାମାଚଢ଼େଇର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ରୂପରେଖ ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ସହଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ମିଶିଯାଏ । ଫଳରେ ଅତି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଠଉରାଇବା ସହଜ ହୁଏନାହିଁ । ପୋକଜୋକ, ଖୋଲହାନ ଗେଣ୍ଡା (Slug) ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ସରୀସୃପ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ । ତା’ ସହଜ କିଛି କଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉଦରସ୍ଥ କରନ୍ତି । ରାମାଚଢ଼େଇର ରାବ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଦୋଷ ଓ ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ । ଚନ୍ଦ୍ରପକ୍ଷ ରାତିରେ ସାରାସାର

ସେମାନେ ଧୂନ କରନ୍ତି । ଏହା ଏକପ୍ରକାର ଖଣ୍ଡେ ସ୍ତମ୍ଭ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱସ୍ୱର ପଶୁ ଓ ଶୁଣିବାକୁ ‘ପିକ୍, ପିକ୍, ପିକ୍, ପିକ୍...ପିକ୍-ଉଇକ୍, ପିକ୍-ଉଇକ୍’ । ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦାଂଶ ଉପରେ ସ୍ୱରପାତ ହୁଏ । ଅନେକେ ଏହି ଶବ୍ଦ ‘ସହଜ ପରିଚିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯେ ରାମାଚନ୍ଦେଇର ଡାକ ସେକଥା ଜାଣନ୍ତିନାହିଁ । କଙ୍କରିଲ ଭୂମିରେ ବୁଦା ବା ତୃତ୍ତେଇ ମୂଳେ, ଶୁଷ୍କ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ, ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଓ ଖୋଲ ସାନ ସାନ ବୁଦାଝାଟି ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ମାଟିକୁ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତରୁଇ ଖାଲୁଆ କରି ସେଠି ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଥରକେ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଟାଦିଅନ୍ତି । ଅଣ୍ଟାର ବର୍ଣ୍ଣ ମସିଆ କିମ୍ବା ପାକଳ ସବୁଜିଆ । ତା’ ଉପରେ ବାଦାମୀ ବା ବାଇଗଣି ରଙ୍ଗର ସ୍ତମ୍ଭ ଛୁପିଛୁପିକା ଚିହ୍ନିଥାଏ । କଙ୍କରିଲା ପରିବେଶରେ ରାମାଚନ୍ଦେଇ ପରି ତା’ର ଅଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ମିଶିଯାଏ ।

ଆମ ଦେଶର ସାଗର କଲ୍ଲ ଚିତ୍ରାଣ୍ଡି । ଏଠାରେ ଉତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଛଖିଆ (Gull) ଓ ଡର୍ବେନ୍ (Tern) ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଏଥିରୁ କେତେକ ଆବାସୀ ଓ କେତେକ ପ୍ରବାସୀ । ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାଛଖିଆ ଓ ଡର୍ବେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ତ ହେଲା, ମାଛଖିଆ ଡର୍ବେନଙ୍କଠାରୁ କିଛିଟା ଓଜନିଆ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର (ମାଛଖିଆ) ପକ୍ଷ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଓଢାରିଆ ଓ ଅଳ୍ପଗୋଜିଆ । ଆମର ଅତି ସାଧାରଣ ମାଛଖିଆ (ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର 41)କୁ ଇଂରାଜୀରେ ‘ବାଦାମୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଛଖିଆ’ (Brown-headed Gull) ବୋଲି କହନ୍ତି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଲାରସ ବ୍ରୁନସେଫାଲସ’ (Larus brunnicephalus) । ହଜି ନାମ-ଡୋମା । ଏହା ପର୍ବତୀଆ କାଉ (Jungle crow) ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼ । ଉପର ପାଖର ବର୍ଣ୍ଣ ଧୂସର ଓ ତଳପାଖ ଧଳା । ଶ୍ରୀଷ୍ଟକାଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଦିନ କଫିର ରଙ୍ଗପରି ବାଦାମୀ । ଶୀତକାଳରେ ଏହା ଆମଦେଶକୁ ଆସେ । ଏତେବେଳେ ତା’ର ମୁଣ୍ଡ ଧୂସରଥା ଧଳା ହୋଇଥାଏ ଓ ବେଳେବେଳେ ତା’ର କାନ ପଛକୁ ଏକ ବାଲ ଚନ୍ଦ୍ରାକାର କଳାଚିହ୍ନ ଉଲ୍ଲମ୍ବ (Vertical) ଭାବେ ରହିଥାଏ । ଆଉ ଜାତିଏ ମାଛଖିଆ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ତାକୁ ‘କଳାମୁଣ୍ଡି ମାଛଖିଆ’ କହନ୍ତି । ଇଂରାଜୀ ନାମ Blackheaded gull, ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଲାରସ ରିଡିବୁନ୍ଡସ’ (Larus ridibundus) । ଏହା ସାଧାରଣ ମାଛଖିଆଠାରୁ ଟିକିଏ ସାନ । ସାଧାରଣ ମାଛଖିଆ ଓ କଳାମୁଣ୍ଡି ମାଛଖିଆକୁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନି ହେବ । ତାହା ହେଲା ସାଧାରଣ ମାଛଖିଆ ଡେଶରେ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ପକ୍ଷ କଳା; ମାତ୍ର ତା’ର ଅଗ୍ରଭାଗର ସନ୍ନିକଟ ସ୍ଥାନ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ

ଧନା । ଏହାକୁ ‘ଦର୍ପଣ’ (mirror) ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । କଳାମୁଣ୍ଡି ମାଛଟିଆ ଡେଇଁରେ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ପକ୍ଷ ଧନା; ମାତ୍ର ତା’ର ପ୍ରାନ୍ତ ଓ ଅଗ୍ରଭାଗ କଳା । ଉଭୟ ଜାତିର ଅପ୍ରାନ୍ତ-ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଲୁହ ଧନା ଓ ଉଭୟର ଲୁହ ଅଗ୍ରଭାଗ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ କରି କଳାରେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଉଭୟ ଜାତି ମାଛରଜା ଏକତ୍ର ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଏମାନେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦେଶ (inland) ଅଞ୍ଚଳ ସେତେ ବେଶୀ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖାଯାନ୍ତିନାହିଁ । ଏହି ମାଛଟିଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟମାନେ ଆମଦେଶରେ ଶୀତକାଳଟି କଟାଇବା ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି । ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରତୀର ଓ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଥିବା ନଦୀ କୂଳରେ ବାସକରି ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବାହୁଡ଼ିଯାନ୍ତି । ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ-ତାଟ ବଦଳ ଓ ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ମାଛଧରାଳି ବସତିମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ରୋଷେଇଶାଳର ଟୁକୁରୁଟୁକୁରି ଓ ଆବର୍ଜନା ପାଣିକୁ ଫୋପଡ଼ା ହେଲେ ସେଥିରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲଙ୍ଗର ପକାଇଥିବା ଜାହାଜ ଚାରିପଟେ ଉଡ଼ି ଚୁଲୁଆନ୍ତି ଏବଂ ପୋତାଗ୍ରସ୍ତ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିବା ବା ପୋତାଗ୍ରସ୍ତ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ପିଛୁ ଧରି ଉଡ଼ିଥାନ୍ତି । ଆମ ଦେଶରେ ଥିଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା, ଜାହାଜରେ ରୋଷେଇଶାଳରୁ ଫୋପଡ଼ା ହେଉଥିବା ଟୁକୁରୁ ଟୁକୁରି ଓ ଆବର୍ଜନା ଏବଂ ମାଛମରା ଡଙ୍ଗାରୁ ଫୋପଡ଼ା ହେଉଥିବା ମଳ ମାଛ । ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଟିଆ ଚିଲ ଓ ଶଙ୍ଖଚିଲମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱତା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ପାଣି ଉପରେ ଭାସୁଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଳ୍ପରେ ଧରିବା ପାଇଁ ମାଛଟିଆ-ମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ପାଣିଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ମାରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଭାସମାନ ଖାଦ୍ୟଲତ୍ତରେ ଜଳରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଓ ପାତ୍ରହଂସ ପରି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଡେଉଁ ଉପରେ ମଜାରେ ଭାସୁଥାନ୍ତି । ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦେଶ (inland) ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ କାଟପତଙ୍ଗ, କୋଟଳ ଶୁକ (grub) ଓ କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି । ମାଛଟିଆ ଉକ ସ୍ତରରେ ନାନାପ୍ରକାର କର୍କଶ ରାବ କରିଥାଏ । ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ରାବ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଡାମରାକାଉର ରାବପରି ଏକପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ସୂଚକ ଚରଚିରିଆ ‘କଇଆ (ହ)’ ଶବ୍ଦ ।

ପ୍ରାକୃତିକ ଭରତବର୍ଷରେ ମାଛଟିଆ କେବଳ ଲଦାଖର ଉଚ୍ଚଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୃଦରେ ପ୍ରଜନନ କରେ । ଏମାନେ ସଫବକ ଭାବରେ ମାଡ଼ ରଚନା କରନ୍ତି । କଳା-ଭୂମିରେ ଅଳ୍ପ ଭାସମାନ ଭୂମିମୟ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ୱୀପରେ ଦଳକୁ ଉତ୍ତୁରାଇ ଏକାଠି ରହି ପରି କରି ସେଠାରେ ଅଣ୍ଡାଦିଅନ୍ତି । ଥରକେ ଦୁଇରୁ ତିନୋଟି ଅଣ୍ଡାଦିଅନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ

ଅଣ୍ଡାର ବର୍ଣ୍ଣ ହଳଦିଆ ଯଦ୍ୱାରୁ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ବାଦାମୀ ହୋଇଥାଏ । ତା' ଉପରେ କଳା ବା ଲଲବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ବଡ଼ ବଡ଼ ଛୁପ, ଦାଗ ଆଦି ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଡୁବେନ (tern) ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉଦାହରଣ ହେଲା **ନୁନ୍‌ବରନ** (ବର୍ଣ୍ଣଚିହ୍ନ 42) । ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ମାଛରଙ୍ଗା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥାନ୍ତି । ଇଂରାଜୀ ନାମ 'ଭରଡ଼ାୟ ନିଶୟୁକ୍ତ ଡୁବେନ' (Indian Whiskered Tern); ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ, 'ଚ୍ଲିଡୋନିଆ ହାଇବ୍ରିଡା' (Chlidonias hybrida) । ହିନ୍ଦୀରେ ଏହାକୁ ଡେହାସ କହନ୍ତି ଓ ସବୁପ୍ରକାର ଡୁବେନଙ୍କୁ କୁଉସ କୁହାଯାଏ । ଏହା ଗୋଟିଏ ଶୀତ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୌପ୍ୟ ଧୂସର ଓ ଧଳାପକ୍ଷୀ । ଆକାର ପାରାପରି; ମାତ୍ର ତା'ଠାରୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ପତଳା । ଏହା 'ପାଟ ଡୁବେନ' (Marsh terns) ପକ୍ଷୀ ଦଳଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ଦଳର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ଲଞ୍ଜ ସାମାନ୍ୟ ଦିର୍ଘାଳିଆ ଓ ପ୍ରାୟ ସମତରୁତ୍ୱଜାକାର । ଅଳ୍ପ ଲଲ ବା କଳାସିଆ ଲଲ । ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ପକ୍ଷର ଅଗ୍ର ଲଞ୍ଜକୁ ଟିପି ପଛଆଡ଼କୁ ବାହାର ରହୁଥାଏ । ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ଋତୁ । ଏ ସମୟରେ ଉଭୟ ମାତ୍ର ଓ ଅଣ୍ଡିରଙ୍ଗର ମୁଣ୍ଡ ଉପର ଓ ପେଟ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ କଳା ଦେଖାଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଜଳାଭୂମି, ଜଳସ୍ଥାବିତ ଧାନବିଲ ଓ କୂଳର କାଦୁଆ ଭୂମି ଉପରଦେଇ ନୁନ୍‌ବରନ ଉଡ଼ି ଯା' ଆସ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏତେବେଳେ ତା'ର ଲମ୍ବା ଅଣ୍ଡପାରିଆ ପକ୍ଷ ଲଳିତ ଛନ୍ଦରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ଓ ଆଖି ତଳଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ନିବଦ୍ଧ ରହୁଥାଏ । ଥରକୁ ଥର ସେ ସ୍ପର୍ଶକ (tangent) ଭାବେ ଝାମ୍ପି ମାରି ବାଲିକଙ୍କଡ଼ା, ପୋକ, ବେଙ୍ଗଫୁଲ ବା ଛୋଟମାଛ ତଳୁ ଉଠାଇ ନିଏ । ମାଛମତ୍ତ ଡଙ୍ଗା ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛମାରି ଫେରିଲାବେଳେ ନୁନ୍‌ବରନ ତା' ପିନ୍ଧି ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ମାଛ ପାଣିକୁ ଫୋପଡ଼ା ହେଲେ ତାକୁ ଝାମ୍ପି ନିଅନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ପାଦରେ ଅଳ୍ପ ଲିଯୋଜକ ଚର୍ମ ଥାଏ ଓ ପହଁର ପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ମାଛଖିଆ (gull) ସେମିତି ପାଣିରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼େ, ସେମିତି ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ନ୍ତିନାହିଁ । ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଉପରେ ଉଡ଼ିବାରେ ବା ଟୀରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଭରଂଦେଇ ହାସ୍ୟକର ଠାଣିରେ ବସି ରହୁଥିବାରେ କଟିଥାଏ । ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ସେମାନେ ଏକପ୍ରକାର ଟାବ୍ର କର୍କଶ ରାବ କରନ୍ତି । ଡ଼ାହା 'କ୍ରୁଇକ୍, କ୍ରୁଇକ୍' ପରି ଶୁଣାଯାଏ । ଏହି ରାବ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଦୂରରୁ ଲିଟୋରା (Shrike) ପକ୍ଷୀର ଶୀତ କର୍କଶ ଶବ୍ଦପରି ମନେହୁଏ ।



ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଭେଦ ହେଲା ‘ନଦୀତୁବେନ୍’ । ଏମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ River Tern କହନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଷ୍ଟେରନା କୁରାନ୍ତା’ (Sterna qurantia) । ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ମାଛରଙ୍ଗା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି । ଏହା ପାଟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବେଶି ଭାଗ ନଦୀ ଖରରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ପରି ଧୂସର ଓ ଧଳା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଉପର ବାଦାମୀ ଦାଗଯୁକ୍ତ; ମାତ୍ର ନଦୀ ଉଦ୍ଭେଦ ନୁହେଁ, ପକ୍ଷୀଠାରୁ କେତେକିଟା ବଡ଼ । ଏହାର ଅଣ୍ଟା ହଳଦିଆ । ଲୁହ ନୁହେଁ, ଲୁହ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲମ୍ବ ଓ ଗୁଡ଼ିକ ଚଢ଼େଇ (Swallow)ର ଲୁହ ପରି ଅଧିକ ଦିର୍ଘାଳିଆ । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରର ବର୍ଣ୍ଣ ଘନ କଳା ହୋଇଥାଏ; ମାତ୍ର ଯେତେ ପାଖ ଧଳା ରହିଥାଏ ।

ନୁହେଁ କାଶୀର ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରଜନନ କରେ । ସେମାନେ ହ୍ରଦ ବା ଜଳାଭ୍ୟୁମ୍ବରେ ଅର୍ଦ୍ଧନିମଜ୍ଜିତ ପାଣି ସିଞ୍ଚିବା ବା ସେଇପରି ଗଛ ଉପରେ ନିଜତୁଣରେ ଯାହା ତାହା ଗୋଲକାର ମାଡ଼ ରଚନା କରଥାନ୍ତି । ଥରକେ ଦୁଇଦିନୋଟି ଅଣ୍ଟାଦିଅନ୍ତି । ଅଣ୍ଟାର ରଙ୍ଗ ସବୁଜିଆରୁ ନୀଳ ଆସୁଥିବୁ; ଏପରିକି ବାଦାମୀ ଅସିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ତା’ ଉପରେ ଘନବାଦାମୀ ବା ବାଜଗଣିଆ ବାଦାମୀ ବର୍ଣ୍ଣର ଛୁପଛୁପିଆ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ରେଖା ପଡ଼ିଥାଏ ।

କଳ୍ପନା ଫରମିସ୍—(COLUMBIFORMIS) ବର୍ଗ—ଏହି ବର୍ଗର ପକ୍ଷୀ ହେଲେ ଆମର ଭାଟ ଡିଉର (sand grouse) (ଟେରୋକ୍ଲିଡ଼ ବଂଶ, family Pteroclididae) ଏବଂ ପାଉଁର (pigeon) ଓ କପୋତ (dove) (କଲୁମ୍ବିଡ଼ ବଂଶ, (Columbidae) । ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାତିର ଚଢ଼େଇ ଏହି ଦୁଇ ପକ୍ଷିବଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେସବୁ ଶିକାର ପକ୍ଷୀଭାବେ ଓ ମାଂସ ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କର ପାଣି ପିଇବା ଶକ୍ତି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର । ଗୃହପାଳିତ କୁକୁଡ଼ା ପାଣିରେ ଅଣ୍ଟା ବୁଡ଼ାଇ ଜଳ ଆହରଣ କରେ ଓ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ତାକୁ ଗିଳେ; ମାତ୍ର ପାଉଁ, କପୋତ, ଭାଟ ଡିଉର ଆଦି ପକ୍ଷୀମାନେ ଘୋଡ଼ାପରି ପାଣିରେ ଅଣ୍ଟା ବୁଡ଼ାଇ ଅବ୍ୟାହତ ଭାବେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି । ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକଲେ, ଭାଟ ଡିଉର ପାଉଁପରି ପକ୍ଷୀ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଅଲକ୍ଷିତ (cryptically coloured) ବାଦାମୀ ବର୍ଣ୍ଣର ପରଦ୍ବାରା ଘନଭାବେ ଆଚ୍ଛାଦିତ । ସେମାନଙ୍କର ବେକ ଶୁଦ୍ର, ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ସାନ ଏବଂ ଲୁହ ଝମ ସୁସ୍ଥ । ଅନେକ ଜାତିର ଭାଟ ଡିଉରଙ୍କ ଲୁହର ମସି ପରି ପ୍ରସାରିତ ଓ ପିନ୍ଧିକଣ୍ଟା ପରି ସୁସ୍ଥ । ସେମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ମରୁଭୂମି ଓ ଅନାବାଦ୍ୟ

ଭୂମିରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପକ୍ଷୀ ଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଜଳପାନ କରିବାର ଦେଖାଯାଏ ।

**ଭଟ ଚଢ଼ିର** (ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର 43)—ଏହାର ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ସାଧାରଣ ଭଟ ଚଢ଼ିର’ (Common Sandgrouse), ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଟେରୋକ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସଷ୍ଟସ୍’ (Pterocles exustus); ହିନ୍ଦୀ ନାମ ଭଟ ଚଢ଼ିର । ଏହା ପାରାଠାରୁ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଛୁଦ୍ର । ବର୍ଣ୍ଣ ବାଲିପରି ହଳଦିଆ ବାଦାମୀ । ଲୁହ ପିନ୍ଧିଲା ପରି ସୁସ୍ଥାଗ୍ର । ଗୁଡ଼ରେ ଏକ କ୍ଷୀଣ କଳାରଙ୍ଗର ପଟି ଚିହ୍ନିତ । ପେଟ ପାଖର ବର୍ଣ୍ଣ ବାଦାମୀ ଆସିଥା କଳା । ଗଣ୍ଡଦେଶ, ଚକ୍ର ଓ ଡକ୍ଟି ମସିଆ ହଳଦିଆ । ମାଠ ପକ୍ଷୀର ସାରା ଦେହରେ ଡୋରାଆ ଦାଗ ଓ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ । ମୁଣ୍ଡ ଉପର ଦେଇ ଉଡ଼ିଗଲବେଳେ ଭଟ ଚଢ଼ିରକୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଜିଆ ପକ୍ଷ, ଲୁହ ଓ ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦ ଦୋହରା ଡାକଦ୍ବାରା ଚିହ୍ନିତ କରିହୁଏ । ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଏପରି ଯେ ଢେଙ୍କାନାଣ ଖାଲି ଭୂମି ଉପରେ ବସିଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ଜାଣି ହୁଏନାହିଁ । ସେମାନେ ଜଳଠାରୁ ବେଶ୍ କିଛି ଦୂରରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ, ସକାଳେ ଓ ଉପରବେଳା ନିୟମିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୃତ ଜୋର ବା ପୋଖରରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଚଢ଼ିଗରୁ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି । ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସି ଜମା ହେଲବେଳେ ବା ପାଣି ପିଇ ବାହାରିଗଲବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ବନ୍ଦୁ କରେ ଶିକାର କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଧୂଳି ବେଗରେ ଦୃଢ଼ଭାବରେ ଉଡ଼ନ୍ତି ଓ ଉଡ଼ିଗଲବେଳେ ଏକପ୍ରକାର ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରିତରିଆ ଦୋହରା ‘କୁଟ୍-ବେ’ ଡାକ ଦିଅନ୍ତି । ଭଟ ଚଢ଼ିର ମୁଣ୍ଡ ଉପର ଦେଇ ଉଡ଼ିଗଲବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଇଥାଏ । ଦାସ ଓ ଅଗସ୍ତ୍ୟର ବାଜ, ବାଜ ଏବଂ ଛେଦିତ ଶବ୍ଦର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅବଶେଷ ଭଟ ଚଢ଼ିରର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ । ତା’ ସହିତ ସେମାନେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ କଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗିଳିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଖୋଲ ଭୂମିରେ ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ ଟିକିଏ ଚଟକା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି; ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେଥିରେ କୁଟାକାଠି ରଖି ମାଡ଼ି ରିଜନା କରନ୍ତିନାହିଁ । ଭଟ ଚଢ଼ିର ଥରକେ ସାଧାରଣତଃ ଦିନୋଟି ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ଅଣ୍ଟାର ବର୍ଣ୍ଣ ପଥରର ରଙ୍ଗ ପରି ଫକା ଧୂସର ବା ଫକା ହଳଦିଆ । ତା’ ଉପରସାରା ବାଦାମୀ ଦାଗ ଓ ଚିହ୍ନିତ । ପକ୍ଷୀଶାବକମାନଙ୍କର କୋମଳ ପରି ରକ୍ଷାବର୍ଣ୍ଣର

ହୋଇଥିବାରୁ ଶବ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ବାରିପାରେ ନାହିଁ । ଆହୁର ମଧ୍ୟ, ଅଣ୍ଡାରୁ ଫୁଟିଲା ମାତ୍ରେ, ପକ୍ଷୀ କୁଆ ଦୋଡ଼ି ପାରନ୍ତି । ଅଣ୍ଡାର ପକ୍ଷୀ ଜଳରେ ପଶି ପାଣି ପିଇଲ-ବେଳେ ତା' ପେଟର ପର ଓଦା ହୁଏ । ସେ ପିଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଲେ ପକ୍ଷୀ ଶାବକମାନେ ସେଥିରୁ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରି ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାନ୍ତି ।

ପାଉଁଶିଆ (duck) ଓ ବାଲି ହଂସ (teal) ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ ନଥିଲପରି ପାଉଁ (pigeons) ଓ କପୋତ (doves) ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫରକ ନାହିଁ । ପାଉଁ ବଡ଼ କପୋତ ଅଟନ୍ତି ଓ କପୋତ ସାନ ପାଉଁ ଅଟନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଦଳ ପାଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫଳଭକ୍ଷୀ । ସେମାନଙ୍କୁ ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ କହନ୍ତି । ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ଏମାନଙ୍କର ନାମ ହରଡ଼ ଖାଇ, କାଉଆ ହରଡ଼ ଓ ସଲ୍ଲୁର । ହିନ୍ଦୀ ନାମ ହରିଆଲ୍; ଇଂରାଜୀ ନାମ 'ସାଧାରଣ ସବୁଜ ପାଉଁ' (Common Green Pigeon); ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ, 'ଟିରନ୍ ଫୋଏନିକପ୍ଟେରା' (Treron phoenicoptera) (ବର୍ଣ୍ଣିତ 44) । ଏହା ଗୋଟିଏ ପେଣ୍ଡା କୋଦମା ପକ୍ଷୀ, ଆକାର ପାର୍ବପରି । ବର୍ଣ୍ଣ ହଳଦିଆ, ଗାଡ଼ ସବୁଜ ଓ ପାଉଁଶିଆ ଧୂସର । ସ୍ଥଳ ସ୍ଥାନରେ ପକ୍ଷରେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଚିହ୍ନଥାଏ । ଏହି ରେଖା ପୁରୁଷ ପକ୍ଷୀଠାରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ମାଈ ପକ୍ଷୀ ଦେହରେ ଉଷା ସ୍ପଷ୍ଟ । ଏହାର ଗୋଡ଼ ହଳଦିଆ (ଲଲ ରୁହେ) । ଏହି ଲକ୍ଷଣଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭାରତୀୟ ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ (green pigeon) ଠାରୁ ଏହାକୁ ପୃଥକ୍ କରାଯାଇପାରେ । ଏମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଖୋଲି ଜମିରେ ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରୀମ ଓ ସହର ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳଭର ଗଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗ୍ରୀମ ଓ ସହରର ଫଳ ବଗିଚାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି । ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଯଥେଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୃକ୍ଷବାସୀ । କିନ୍ତୁ ଏହା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ । ଫଳଭର ବୃକ୍ଷତାଳ ଭିତରେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ସହକାରେ ବିଚରଣ କରେ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ନିକଟରେ ନଥିବା ବର ବା ଓଷ୍ଠ ଫଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାପାଇଁ ତାଳକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ତଳ ଆଡ଼କୁ ଝୁଲି ବେକ ଓ ମୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଥାଏ । ବିପଦର ସୂଚନା ପାଇଲେ ଏମାନେ ଜଡ଼ ହୋଇଯାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷୀର ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁଜ ପକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣ ସହଜ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦରଭାବେ ମିଶିଯାଏ ଯେ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼େନାହିଁ । କେବଳ ଏଠି ସେଠି ସାମାନ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାଳନଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼େ ।

ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟିଲେ ଗୋଟିଏ ଫଳଭରା ବରଗଛରୁ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଲ୍ଲୁରି ଉଡ଼ି ଯାନ୍ତି ତାହା ଦେଖିଲେ ଆଖି ଖୋସି ହୋଇଯାଏ । ଦିନବେଳେ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗଛରୁ ଗଛ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି ଓ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗଛର ସବା ଉପର ଡାଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି । ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉପର ଅଂଶରେ ବସି ନିୟମିତ ଭାବେ ସକାଳେ ଓ ସଞ୍ଜରେ ହରଡ଼ଖାଇ ପରକୁ ଫୁଲାଇ ଖରା ଘୁଞ୍ଚନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଉଡ଼ା ସ୍ପନ୍ଦ୍ର, ବଳବାନ୍ ଓ ସିଧା । ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ପକ୍ଷ ସଞ୍ଚାଳନ ଫଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାତବ ଶବ୍ଦ ଜାତ ହୋଇଥାଏ । ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫଳ ଖାଇ ଜୀବନ ଧାରଣ କରନ୍ତି । ବର, ଓଷ, ଡମିରି ଫଳ ଆଦି ଚିତ୍ତନ୍ତ ଜାତିର ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆହାର । ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଉଚ୍ଚ ଜାତି ତାଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତିକର ଓ ସ୍ନିଗ୍ଧ ମୃଦୁ ସ୍ୱପ୍ନର ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି । ସଲ୍ଲୁରିର ନୀତି କପୋତ ପରି ସ୍ପନ୍ଦ୍ର କାଠିଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ମଞ୍ଚା ପରି । ଏହା ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ବୃକ୍ଷ ଡାଳ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହୁଥାଏ । ପାରାବର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅରକେ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି । ହରଡ଼ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡାଦିଏ । ତାହା ଧଳା ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ।

ପାରାବତ (ବଣିଚି 45)—ଏହା ପାରା, ଦେଉଳିଆ ପାରା, ଗୋଲ ପାରା, କୋଠ ପାରା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ପରିଚିତ । ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ନୀଳ ପାରାବତ ପାରା’ (Blue Rock Pigeon) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘କଲମ୍ବିଆ ଲିଭିଆ’ (Columba livia) । ହୃଦ-କରୁତର । ଏହା ଆମର ଗୋଟିଏ ଅତି ପରିଚିତ ପକ୍ଷୀ । ବର୍ଣ୍ଣ ଶିଳିଟିଆ ଧୂସର ଏବଂ ବେକ ଓ ଭିତର ଉପର ଅଂଶ ଚକଚକିଆ ଧାତବ ସବୁଜ, ବାଇଗଣି ଓ ମାଜେଣ୍ଡା ଲାଲ । ପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି କଳା ଶଳାକା ପରି ଚିହ୍ନିତ ଏବଂ ଲଞ୍ଜରେ ଏକଡ଼ରୁ ସେକଡ଼କୁ ଏକ ଓସାରିଆ କଳା ଚିହ୍ନିତ । କାଉ ଓ ଘରଚଟିଆ ପରି ପାରା ଆମର ଏକ ଅତି ପରିଚିତ ପକ୍ଷୀ । ବଣ୍ୟ ପାରାବତ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଯାଇଥିବା ଆମର ବିଭିନ୍ନ କିସମ (breed) ମୃଦୁପାଲିତ ପାରାମାନଙ୍କର ଆଦିପୁରୁଷ । ଏମାନେ ଖୋଲା ଗିରିଚଢ଼ା ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସକରନ୍ତି । ପାରାବତ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହନ୍ତିନାହିଁ । ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବଣ୍ୟ ପାରାବତ ଓ ମୃଦୁପାଲିତ ପାରାବତ ଅବାଧରେ ପ୍ରଜନନ କରନ୍ତି । ଫଳରେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ସହଜ୍ଞେଷ (Commensal) ପ୍ରାଣୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ଭାରତର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧିବାସୀ ପାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଗହଳ ହେଉଥିବା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର କୋଳାହଳ ଓ ଧମଧାମ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ

ଅର୍ଥାତ୍ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କୋଠାଘର ଉପରେ ଓ ଭିତରେ ଏକତ୍ର ରାନ୍ଧି ଯାଏନ କଲେ, ଓ ନାଡ଼ ରଚନାକରନ୍ତି । ଗୋଦାମଘର, କାରଖାନାର ଛୁଦ୍ଦ ଘର, ମସଜିଦ୍, ରେଲ୍‌ଷ୍ଟେଶନ ଓ ମାଲଗାଡ଼ି ଡବା ଲଦା ଉତ୍ତୁର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଏମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରିୟ ବିଚରଣ ସ୍ଥାନ । ଏସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଏମାନେ ଆବର୍ଜନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଅପ୍ରସନ୍ନିତ ଭାବେ ବିଚରଣ ଓ ଉତ୍ସାହକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ବଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପାରାବତ ସାଧାରଣତଃ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ପୁରୁତନ କୂପର ଖୋପ, ଭଗ୍ନ କୋଠାଘର, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୁରୁତନ ଦୁର୍ଗର ଗର୍ଭମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ପର୍ବତର ଉତ୍ତର ଭାଗର ଥାଳ ଓ ଫାଟମାନଙ୍କରେ ବାସ କରନ୍ତି । ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଟୁଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନୂଆ ବୁଣା ହୋଇଥିବା ବା ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଶସ୍ୟ, ତାଲି ଜାମ୍ବୁ ଶସ୍ୟ ଓ ଚିନାବାଦାମ ଶେତକୁ ଯା'ଆସ କରିଥାନ୍ତି । ପାରାମାନଙ୍କର ସ୍ବନ ସହଜ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଚିତ । ଅଣ୍ଟିର ପାରା ବେଳ ଫୁଲ୍ଲ ଗନ୍ଧର 'ଗୁଟ୍ଟ-ଗୁ, ଗୁଟ୍ଟ-ଗୁ' ଶବ୍ଦକ୍ରମେ । ଏ ଶବ୍ଦ କଲବେଳେ ସେ ସାଧାରଣତଃ ତା'ର ସଙ୍ଗ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡୁଆ ଏ ଓ ତା' ସମ୍ମୁଖରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚକା ଭର୍ତ୍ତି ଖେଳିଲପରି ବୁଲେ । ପାରା କୁଟା କାଠିରେ ନାଡ଼ ରଚନାକରନ୍ତି । ପାରାବଂଶର ପକ୍ଷୀମାନେ ଅରକେ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । ପାରା ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଟାଦିଏ । ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଓ ତା' ଉପରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନଥାଏ ।

କପୋତ (ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର 46, ଉପର ଚିତ୍ର)—ଏହାର ଇଂରାଜୀ ନାମ 'ସ୍ପଟ୍ଟେଡ୍ କପୋଡ୍' (Spotted dove) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ସ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋପେଲିଆ ଚିନେନସିସ୍' (Streptopelia chinensis) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ—ଚିହୋକା ଫାଙ୍ଗଟା, ପାକି । ଏହାର ଆକାର ବଣି ଚଢ଼େଇ ଓ ପାରାର ମଧ୍ୟମର୍ତ୍ତି । ଏହା ଗୋଟିଏ ପାତଳା ପାରା । ଦେହ ଉପରଭାଗର ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଳ୍ପ ଧଳାଦାଗଯୁକ୍ତ ବାଇଗଣି-ବାଦାମୀ ଓ ଧୂସର । ବେକର ପଛ ପାଖରେ କଳା ଉପରେ ଧଳାଚିହ୍ନ ଥିବା ଚେସ ଖେଳ ପାଲ ପରି ଚିହ୍ନିତ । ଏମାନେ ଉତ୍ତମରୂପେ ଜଳ ପାଉଥିବା ଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲଞ୍ଚଳ ଓ ଗୃଷ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ ଦଳରେ ଧୂଳି ଧୂସରିତ ରାନ୍ଧା, ଅମଳ ହୋଇ ଥଣ୍ଡା ଥିବା ଶେତ ଆଦିରେ ବାଜି ଟୁଙ୍ଗୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଯେଉଁଠି ଡରଭୟର କାରଣ ନାହିଁ, ସେଠାରେ କପୋତ ପୋଷ ମୁନିଲପରି ବଗିଚାରେ ପଶି ବାଜି ଟୁଙ୍ଗେ । ଏପରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିବାଆସିବାରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ବଙ୍ଗଳା ଘରର ବରଗା ଖୋପରେ ନାଡ଼ ରଚନା କରେ । ଏହାର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ସ୍ବନ ପ୍ରୀତିକର, ବରଂ କେତେକ ପରିମାଣରେ ବିଚାଦବୋଲା 'ଡୁ-କୁ-ଡୁ-ଡୁ-ଡୁ...ଡୁ-ଡୁ-ଡୁ' । ଏହି ସ୍ବନରେ

‘ଡୁ’ର ସଂଖ୍ୟା ତିନିରୁ ଛଅ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥାଏ । ଏହାର ନାଡ଼ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ନାଡ଼ଝରି । ତାହା ବଙ୍ଗଳା ଘରର ଗୁଡ଼ିଆ ବା ଖୋପରେ ଓ ବୁଢ଼ାରେ କାଠିରେ ଘିଆର ହୋଇଥାଏ କପୋତ ଥରକେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ଧଳା ଅଣ୍ଟା ଦେଇଥାଏ ।

ଆଉ ଗୋଟିଏ କପୋତ ହେଲା ଲଲ କପୋତ (ବର୍ଣ୍ଣଚିହ୍ନ 46 ତଳ) । ଏହାର ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ଲଲ କଲଅ କପୋତ’ (Red Turtle Dove); ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ସ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋପେଲିଆ ଟ୍ରାଙ୍କୁଇବାରିକା’ (Streptopelia tranquebarica); ହିନ୍ଦୀ ନାମ ମେଘେଟି ଫାଖ୍ଟା, ଗିରଉଲ ଫାଖ୍ଟା, ଇଡ଼ା । ଏହା ମରନା ପକ୍ଷୀଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼ । ବର୍ଣ୍ଣଚିହ୍ନରେ ଅଣ୍ଟାର ଲଲ କପୋତର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଅଛି । ମାଈ ଲଲ କପୋତର କାନ୍ଧ ଓ ପକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବାଇଗଣି ଆସିଆ ଇଟାପରି ଲଲ-ବାଦାମୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମସିଆ ବାଦାମୀ ଆସିଆ ଧୂସର । ମାଈପକ୍ଷୀ ପଙ୍କା (Ring Dove) ହିନ୍ଦୀ ନାମ ଡୋର ଫାଖ୍ଟା ଚଢ଼େଇର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂସ୍କରଣ ପରି ଦେଖାଯାଏ । ଲଲ କପୋତ ଖୋଲୁ ଗୁପ୍ତଜମି ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ-ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଏମାନେ ସାଧାରଣ କପୋତ ପରି ଖୁବ୍ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଆମର ଯେତେ ପ୍ରକାର କପୋତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ସାଧାରଣ କପୋତ ମନୁଷ୍ୟ ବାସ ନିକଟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଲଲ କପୋତ କୃଷିର ମନୁଷ୍ୟ ବାସ ବା ଯାତାୟତ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । ଏହାର ସ୍ୱର ଏକପ୍ରକାର କର୍କଶ ଦୂର୍ଗମାନ ଶବ୍ଦ ଓ ‘ଗୁ-ଗୁର-ଗୁ, ଗୁ-ଗୁର-ଗୁ’ ପରି ଶୁଣାଯାଏ । ପର ପର ଏହା ବହୁବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣ କପୋତର ନାଡ଼ ପରି ଲଲ କପୋତର ନାଡ଼ କାଠିରେ ଘିଆର ହୋଇଥାଏ ଓ ବୃକ୍ଷତାଳରେ ତଳୁ ତିନିରୁ ଛଅମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଥରକେ ଦୁଇଟି ଧଳା ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ତଳୁ ଅନାଇଲେ ଅଣ୍ଟା ନାଡ଼ ଫାଙ୍କଦେଇ ଦେଖାଯାଏ ।

ସିଗ୍ନାସି ଫର୍ମିସ ବର୍ଗ (Order Psittaciformes)—କେବଳ ଗୋଟିଏ ବଂଶର ପକ୍ଷୀ ଏହି ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ତାହା ହେଲା ସିଟାସିଡ଼ି (Psittacidae) । ଶୁଆ ବା ଶୁକ (Parrots) ଏହି ବଂଶର । ଏମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା—ଛୋଟ, ମଜବୁତ ଓ ବନ୍ଦୁକ କଣ୍ଠାପରି ଏକାବେଳକେ ବନ୍ଦ ଅଟେ; ଗୋଡ଼ ଶୁଦ୍ର, ଆବେର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗୀ ବା ଯୁଆଳ-ଅଙ୍ଗୁଳ (Zygodactyl) ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ପଦାଙ୍ଗୁଳ ସାମନାକୁ ଓ ଦୁଇଟି ପଛକୁ ମୁଣ୍ଡ କରିଥାଏ । ଶୁକମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ମୁଖ୍ୟତଃ



ସବୁଜ ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ବର୍ଣ୍ଣ, ମାତ୍ର ଏମାନେ ଫସଲ ଓ ଫଳ ବଗିଚାର ବିସ୍ତର କ୍ଷତି କରନ୍ତି । ଅଧିକତମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏମାନେ ଏତେ ଦୋଷୀ ଯେ ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଈଲ ଭଳି ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ । ଆମର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଶୁକ ହେଲା ଚନ୍ଦନା (ବର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର-47) । ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ନାମ ଭଲିଆଖାଇ, ଭଲିଆଇ ଶୁଆ, ଚନ୍ଦନ, ଶୁଆ ଓ ଟିଆ । ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ଲଲମୁଦିଆ ତୋତା’ (Roseringed Parakeet) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ସିଟାକୁଲା କ୍ରାମେରୀ’ (Psittacula Krameri) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ—ତୋତା, ଲିବାର ତୋତା । ଏହା ମଇନା ଅପେକ୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼ । ଏହାର ଲୁହ ଲମ୍ବା ଓ ଗୋଳିଆ । ବର୍ଣ୍ଣ ଦାସ ପରି ସବୁଜ । ଅଳ୍ପ ଛୋଟ, ମଜବୁତ, ବନଶୀକଣ୍ଠା ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଓ ଲଲ । ବେକ ଗୁରୁପଟେ କଲା ଓ ଗୋଲପାଁ ବାଇଗଣି ମିଶା ଏକ ପଟି ଥାଏ । କାଉ, ଘରଚଢ଼ିଆ, ବଣି ଓ ପାରୁପରି ଚନ୍ଦନା ଏକ ଅତି ପରିଚିତ ପକ୍ଷୀ । ଏମାନେ ଅତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଥିବା କ୍ଷେତବାଡ଼ି ଓ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶି ଫସଲ ଉତ୍ତୁଡ଼ାନ୍ତି । କୃଷକ ଓ ଫଳ ଉଦ୍ୟାନ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଏମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ । ଶସ୍ୟ ଓ ଫଳ ପାତ୍ରଥିବା ସମୟରେ ଏମାନେ ଆସି ସେ ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିପକାନ୍ତି । ଯେତେ ଖାଆନ୍ତି ତା’ର ବେଶି ଖଣ୍ଡିଆ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି । ରେଳଷ୍ଟେସନ ମାନଙ୍କରେ ବଳଦଗାଡ଼ି, ଟ୍ରକ୍ରେ ଲଦା ହୋଇ ଯିବାକୁ ରହୁଥିବା ଶସ୍ୟ ଓ ଚନାବାଦାମ ବସ୍ତା ଉପରେ ଚନ୍ଦନା ପକ୍ଷୀସବୁ ବସ୍ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଅଳ୍ପରେ ସେଥିରୁ ଶସ୍ୟ ଓ ଫଳ ଖାଇବା ଏକ ସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ । ଚନ୍ଦନାମାନେ ଏକତ୍ର ଚରୁବାସମାନଙ୍କରେ ଦଳବାନ୍ଧ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ କୋଳାହଳମୟ ନଗରର ସୀମା ନାହିଁ ଭିତରେ ଥିବା ନିକୃଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରନ୍ତି । ଆଖପାଖର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପଶି ଚଢ଼ାଉ କରି ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୂରଦୂରନ୍ତରୁ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଚନ୍ଦନା ପକ୍ଷୀ କଲରବ କରି ସେଠାକୁ ଫେରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ସେମାନଙ୍କର ଚର ଚରିଆ ଖସ୍ତ ଶବ୍ଦ ‘କଅକ୍, କଅକ୍, କଅକ୍’ ଆମର ପରିଚିତ । ବସିଥିଲାବେଳେ ଓ ଉଡ଼ୁଥିଲାବେଳେ ଉଭୟ ସମୟରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ । ଚନ୍ଦନା ଓ ନାହାକା ଶୁଆ (ପରେ ଦେଖ) ଉଭୟ ପକ୍ଷୀକୁ ଲୋକେ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରଖି ପାଳନ୍ତି ଓ କଥା ଶିଖାନ୍ତି । ସେମାନେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟକୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରନ୍ତି । ଶିଖାଇଲେ ସେମାନେ ନାନାପ୍ରକାର କୌତୁକିଆ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି; ଯଥା—ଖେଳ ତୋପରେ ବାରୁଦ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଫୁଟାଇବା । ଚନ୍ଦନା ଥରକେ ଗୁରୁଟିକୁ

ଛଅଟି ଯାଏ ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ଏହା ବିଶୁଦ୍ଧ ଧଳା ଏବଂ ଗୋଳା ଅଣ୍ଟାକାର । ସିନ୍ଧୁର ମୁଣ୍ଡି (Barbet) ବା କାଠହଣା (Woodpecker)ର ପୁରୁଣା ଗର୍ଭି, ଝଟ ଚୂଡ଼ାର ଡାଲୁ ଅଂଶର ପଥର ତଳେ ଓ ଅବ୍ୟବହୃତ ଘରର କାନ୍ଥ ଉପରେ ଏମାନେ ଅନ୍ତଃ ଦିଅନ୍ତି । ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅଲଗାଭାବେ ଅଣ୍ଟା ଦେଇଥାନ୍ତି ।

ନାହାକା ଶୁଆକୁ ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ ଚନ୍ଦନା, ମେରୁ, ଶୁଆ, ଟିଆ ଓ ମଦନା କୁହାଯାଏ । ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ବୃହତ୍ ଭରତୀୟ ତୋତା’ (Large Indian Parakeet) ଓ ‘ଆଲେକ୍ସିନ୍ଦ୍ରୀନ ଶୁଆ’ (Alexandrine Parakeet) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ପିଟକିଉଲ୍ ଇଉପାଟ୍ରିଆ’ (Psittacula eupatria) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ ରାଉ ତୋତା, ସ୍ୱାମିନ୍ ତୋତା । ଏହାର ଆକାର ବଡ଼, ଅଣ୍ଟା ବଡ଼ ଓ ନିଦା । ଅଣ୍ଟିର ନାହାକା ଶୁଆର କାନ୍ଥରେ ବାଦାମୀ ଆସିଆ ଗାଡ଼ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଏକ ଛୁପ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ଓ ବେକ ଗୁରୁପଟେ କଳା-ବାଇଗଣି ରଙ୍ଗର ପଟି ଚିହ୍ନିଥାଏ । ମାଉପକ୍ଷୀର କାନ୍ଥ ଓ ବେକ ଗୁରୁପଟେ ଏପରି ଚିହ୍ନ ସବୁ ନଥାଏ । ନାହାକାଶୁଆ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଓ ଅଳ୍ପ ସହରୀଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି । ଉଭୟ ଚନ୍ଦନା ଓ ନାହାକା ଶୁଆ ଶାବକ ବହୁ ଫୁଲରେ ବିହୀନ ହେବା ଲାଗି ପକ୍ଷିବିକାରକୁ ଆସିଥାଏ ।

କୁକୁଲି ଫର୍ମିସ୍ (Order CUCULIFORMES) ବର୍ଗବିଭିନ୍ନ ଜାତି କୋଇଲି ଏହି ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏମାନେ ପୁଞ୍ଜବର ପ୍ରାୟ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖାଯାନ୍ତି । ପ୍ରାଚୀନ ଗୋଲ୍ଡ (Old world)ର ଅନେକ ଜାତି କୋକିଲ ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ପରଜୀବିତା (brood parasitism) ଅଭ୍ୟାସ ଲାଗି କୁଖ୍ୟାତ । ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀର ଗର୍ଭରେ ଅଣ୍ଟା ଦେଇ ସେହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଣ୍ଟା ଉତ୍ପ୍ରମାଦବା ଓ ଶାବକ ପାଳନ ଭାର ଗୋପନରେ ଲଦିଦିଅନ୍ତି । ଏପରି ପରଜୀବୀ କୋକିଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋଟିର ଉଦାହରଣ ହେଲା ‘ୟୁରୋପୀୟ ପିକ’ (European Cuckoo) । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘କୁକୁଲସ୍ କାନୋରସ୍’ (Cuculus canorus) କାଶ୍ମୀର ଓ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ବିସ୍ତୃତି । ଏ ଜାତୀୟ ପିକର ଏକ ପ୍ରଜାତି (race) ଆସାମରେ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧିବାସୀରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ; ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଉପ-ମହାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଏ ଜାତୀୟ ପରଜୀବୀ ପିକ ହେଲା ଆମର ଅତି ପରିଚିତ କୋଇଲି (ବର୍ଣ୍ଣିତ 48) । ଏ ପକ୍ଷୀକୁ ଇଂରାଜୀରେ ‘କୋଏଲ୍’ (Koel) କହନ୍ତି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଇଉଡାଲନାମିସ୍ ସ୍କୋଲୋପାସିଆ’

(*Eudynamis scolopacea*) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ—କୋଏଲ, କୋକିଲ । ଏହା ଆକାରରେ କାଉ ପରି ହେବ; ମାତ୍ର କାଉ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷୀଣ ଓ ଲଞ୍ଜ କାଉ ଚାଲିବାରେ ବଡ଼ । ଅଣ୍ଟା ପକ୍ଷୀର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଚକଚକିଆ ଧାତବ କଳା, ଅଳ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଳଦିଆ ଆସିଆ ସବୁଜ ଓ ଆଖି ଗାଢ଼ ଲାଲ ବା ରକ୍ତ-ଲେହୁତ । ମାଛ ପକ୍ଷୀର ବର୍ଣ୍ଣ ବାଦାମୀ ଓ ତା’ ଉପରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଟିପିଟିପିଆ ଚିହ୍ନ ଥାଏ । କୋଇଲି ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ତରୁଣାଘରେ ଏକ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କମ୍ ଲୋକ ଦେଖି ଚିହ୍ନିନ୍ତି । ବରଂ ତାର ଡାକ ସହିତ ଲୋକେ ବେଶି ପରିଚିତ । ଏହା ପୂର୍ବସର ବୃକ୍ଷବାମୀ ଓ କେବେହେଲେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଭୂମିରେ ଆସି ବସେନାହିଁ । ଶୀତ କାଳରେ ଏହା ମାରବ । ତେଣୁ ଲୋକେ ତାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତିନାହିଁ ଓ ବିଚାରନ୍ତି କୋଇଲି ଶୀତକାଳରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଏ । ଗ୍ରୀଷ୍ମରୁ ଓ ତା’ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଜନନ ରତ୍ନ ଆସିଗଲେ ଅଣ୍ଟା ପକ୍ଷୀର କଣ୍ଠ ପୁଣି ଟିପିଯାଏ ଏବଂ ତା’ର ଉଚ୍ଚନାହିତ ଡାକରୁ ଡାକିତର ‘କୁଉ-କୁଉ-କୁଉ’ ଡାକରେ ଉଦ୍ୟାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଗ୍ଧିତ ହୋଇଉଠେ । ପ୍ରଥମେ ଅନୁଚ୍ଚ ‘କୁଉ’ ଡାକ ପରେ ସେହି ଡାକ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ହୋଇ ସମ୍ପ୍ରମ ବା ଅଷ୍ଟମ ଡାକବେଳକୁ ଅତି ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇଉଠେ ଓ ତା’ପରେ ବନ୍ଦ ହୁଏ । ଅବଳମ୍ବେ ପୁଣି ସେହିପରି କୁହୁସ୍ବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସଙ୍ଗେତ ଡାକ ଯାଏ ଉଠେ, ଏଇପରି ଚାଲିଥାଏ । କୋକିଲର ‘ସଙ୍ଗୀତ’ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ରସମୟ କବିତାରେ (ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ) ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଅଛି । ପିକର ଧ୍ବନି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଶୁଣିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ମଧୁର; ମାତ୍ର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ସେହି ଏକା ‘କୁହୁ’ ଶବ୍ଦ ଫିମ୍ପେ ଏକଭାବପନ୍ଥ (monotonous) ଲାଗେ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଅବିରାମ ଚରିଚରିଆ କୁହୁଡାନ୍ ଅସହ୍ୟାୟ ଓ ବିରକ୍ତକର ହୋଇଉଠେ । ଏହି କାରଣରୁ କୋଇଲିକୁ ଭ୍ରମବଶତଃ ‘ମଥାଧର ପକ୍ଷୀ’ (Brainfever bird) ବୋଲି କହାଯାଏ । ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ମଥାଧର ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ପାପିୟା ପକ୍ଷୀ । ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ‘ବାଜ କୋଇଲି’ (Hawk-Cuckoo) ଓ ହିନ୍ଦୀରେ ପାପିୟା କହନ୍ତି । ମାଛ କୋଇଲିର ସ୍ବର ନାହିଁ । ଗଛରୁ ଗଛକୁ ଉଡ଼ିଗଲିବେଳେ ବା ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଡେଇଁଲି ବେଳେ ସେ କେବଳ ଏକପ୍ରକାର କର୍କଶ ‘କିକ୍-କିକ୍-କିକ୍’ ଶବ୍ଦ କରେ । ବର ଓ ଓହ୍ଲ ଗଛର ଫଳ, ନାନା ପ୍ରକାର ଭୂତ ଜାତୀୟ କୋଳି ଓ ସ୍ବବାକୃତ୍ୟ କୋଇଲିର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ । କାଉ ଓ ଡାମରା କାଉ ସେତେବେଳେ ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି, କୋଇଲି ସେହି ସମୟରେ ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ଅନ୍ୟ ‘ପରଜାତି’ କୋଇଲି-

ମାନଙ୍କପରି କୋଇଲି ସାଧାରଣତଃ କାଉ ଓ ଡାମରା କାଉ ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଚାଲି ଆସେ, ନିଜେ ମାତ୍ର ରଚନା କରେନାହିଁ । କାଉ ଓ ଡାମରା କାଉ କୋଇଲି ଅଣ୍ଡାକୁ ଉତ୍ତୁମାନୁ ଓ ଛୁଆକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି । ମାଛ କୋଇଲି ଗୋଟିଏ କାଉ ବା ଡାମରା କାଉ ବସାରେ ଯାଇ ଅଣ୍ଡା ନ ଦେଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବସାରେ ବାଣ୍ଟି କରି ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଆସେ । ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ଫିକା ଧୂସର ସବୁଜ; ତା ଉପରେ ଲାଲ-ବାଦାମ ବର୍ଣ୍ଣର ଟିପ୍ ଟିପ୍ ଓ ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ଚନ୍ଦ୍ର ଥାଏ । କୋଇଲି ଅଣ୍ଡା ଅନେକ ପରିମାଣରେ କାଉ ଅଣ୍ଡା ପରି ମାତ୍ର ଛୁଦ୍ରତର । ଏକ ପ୍ରକାର କୋଇଲି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ‘ପରଜାବା’ ନୁହଁନ୍ତି । ଏହି କୋଇଲି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ନ ଦେଇ ନିଜେ ବସାକରି, ସେଥିରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଶାବକର ଯତ୍ନ ନିଏ । ତା’ର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଲା କୁମ୍ଭାଟିଆ (ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର 49) । ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ କୁମ୍ଭାଟି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି । ଇଂରାଜି ନାମ ‘କ୍ରା-ଫେଜେଣ୍ଟ’ (Crow-Pheasant), କୋଉକାଲ (coucal) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ସେଣ୍ଟ୍ରୋପସ୍ ସାଇନେନସିସ୍’ (Centropus sinensis), ହିନ୍ଦି ମୋହୋକା, କୁକା । ଏହାର ଆକାର ପକ୍ଷୀର ଆକାର ପରି । ଏହା ଗୋଟିଏ ପରିପାତୀୟ ପକ୍ଷୀ, ଦେଖିବାକୁ କେମିତିକି ଆଗୁରୁ ଜାଗୁରୁ, ମାତ୍ର ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ । ଚକଚକିଆ କଳା, ପକ୍ଷ ଘନ ବାଦାମୀ, ଲୁହ କଳା, ଘାଘି, ଓସାରୀଆ ଏବଂ ମୂଳ ଓ ଅଗ ଆଡ଼କୁ ହଳଦିଆ ସାମାନ୍ୟ ସବୁ । ବୁଢ଼ା ଓ ଛୋଟ ଗଛ ଥିବ, ତା’ ଭିତରେ ଠାଏ ଠାଏ ଉଡ଼ି ଘାସ ଭୂମି ଓ ଗୁମ୍ଫା ଜମି ଥିବ, ଏପରି ଖୋଲା ଅଞ୍ଚଳରେ କୁମ୍ଭାଟିଆ ରହେ । ଏହା ଅନେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ବାସ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଓ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ବଗିଚାରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଭୂମିବାସୀ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଭୂମିରେ ଇଚ୍ଛାକରି ଚାଲି ଚାଲି ଗୁଳ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବିତାଏ । ଏ ସମୟରେ ଲୁହ ପ୍ରାୟ ତଳେ ଲୁଗି ଘୁମୁରୁଥାଏ ଏବଂ ଲୁହ ରହିଥିବା ଜାଣି ପଡ଼ିଯିବାକୁ ହୁଏତାକି ପଦାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ପକ୍ଷ ଖୋଲେ ଓ ବଦଳରେ । ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ କୁମ୍ଭାଟିଆ ବୁଢ଼ା ଗଛରେ ଚଢ଼େ ଓ ତହିଁରୁ ସହକାରେ ଏ ଜାଲରୁ ସେ ଜାଲକୁ ଡେଇଁଥାଏ । ଏହାର ରାବ ଏକ ପ୍ରକାର ଗହର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ‘ଉକ୍’ । ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏହି ସ୍ୱର ଧୀର ମାତ୍ର ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ । ବିଶେଷକରି ଖରାଦିନେ ଏହି ରାବ ବେଶି ଶୁଣାଯାଏ ଓ ଅନେକ ଦୂରଯାଏ ଶୁଣାଯାଏ । କୁମ୍ଭାଟିଆ ଏହି ରାବକୁ ଆଉ ପ୍ରକାରେ ମଧ୍ୟ କରଥାଏ । ତାହା ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ବର୍ଷା ସଙ୍ଗୀତ-

ମୟ 'କୁସୁ-କୁସୁ-କୁସୁ-କୁସୁ' । ଏହି 'କୁସୁ' ସାତଥର ଓ କୋଡ଼ିଏ ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ଓ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ଉନୋଟି 'କୁସୁ' ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ଏ ପ୍ରକାର ରାବ ପରେ ଦୂରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ତା'ର ଜବାବରେ ସେପରି ଡାକ ଦିଏ । ଅନୁସୂଚିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଡାକ ଦିଆଦେଇ ଚାଲିଥାଏ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଭାବେ ମିଶ୍ରିତ କର୍କଶ ରାବ ଓ କଲରବ କରେ । ତାହା ଶୁଣିଲେ ଭାତ ଲାଗେ । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଯୁରୁଷ ପକ୍ଷୀ ମାରି ପକ୍ଷୀ ସମ୍ମୁଖରେ ବଚନ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ; ଯଥା—ଲୁହ ଦୋହଲାଇବା ଓ ପିଠି ଉପରକୁ ଡେଇଁ କରି ବଙ୍କାଇବା ଏବଂ ପକ୍ଷକୁ ନଡ଼ କରି ସରବରେ ପଦଚାରିଣୀ କରିବା । କୁମ୍ଭାଟୁଆର ଉତ୍ତମ ସ୍ତନ ଛାଣ ଓ କୃତ୍ରିମ ଝିକ । ରଥକେ ସେ ଅଳ୍ପଦୂର ମାତ୍ର ଉଡ଼ିଯାଇପାରେ । ଝିଲିକା ଓ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପତଙ୍ଗ, ପାଦଗ ଶୁକ ବା ସମ୍ଭାଳୁଆ, ପଡ଼ିଆ ମୁଣା, ଏଣୁ ଆଦି ସର୍ବସ୍ୱପ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାପ ଆଦି କୁମ୍ଭାଟୁଆର ଖାଦ୍ୟ । ଋତୁ ଋତୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଓ ଶାବକମାନଙ୍କୁ ସେ ବହୁଳଭାବେ ହତ୍ୟାକରି ଖାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଭୂମି ଉପରେ ଓ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କରେ ଶିକାର କରେ । ଅନାଡ଼ି ବୈଦ୍ୟମାନେ କୁମ୍ଭାଟୁଆର ମାଂସ ଶ୍ୱାସନଳୀ ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗରେ ବର୍ଣ୍ଣେଷ ଉପକାରୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଗୋଟିଏ ପରମାତ୍ମା କୋଇଲି ନୁହେଁ ଏବଂ ନିଜର ଶାବକମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିଥାଏ; କୋଇଲି ପରି ପର ମାଡ଼ରେ ଯାଇ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ ନାହିଁ । କଣ୍ଟା ଗଛରେ ଭୂମିଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚରେ ସେ କାଠି ପତ୍ତରେ ମାଡ଼ ରଚନା କରେ । ମାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଲକାର ଓ ତା'ର ଦ୍ୱାର ମଝିରେ ନଥାଇ କଡ଼ପଟିଆ ଥାଏ । ଥରକେ ଉନୋଟିରୁ ଚାରିଶ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ । ଅଣ୍ଡାର ବର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଓ ଉପରି ଭାଗ ଚକ ପରି, ତା ଉପରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନଥାଏ ।

**ଝୁଜିଫର୍ମିସ୍ ବର୍ଗ (order STRIGIFORMES)**—ପେଣ୍ଟ ଏହି ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଝୁଜିଫର୍ମିସ୍ ବର୍ଗ ଦୁଇଟି ବଂଶ (family)ରେ ବିଭକ୍ତ; ଯଥା—ଟାଇଟୋନିନ (Tytoninae) ଓ ଝୁଜିଡ଼ି (Strigidae) । ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପେଣ୍ଟ (Barn owl) ଟାଇଟୋନିନ ବଂଶର ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ପେଣ୍ଟ (True owl) ଝୁଜିଡ଼ି ବଂଶଭୁକ୍ତ । ଲକ୍ଷ୍ମୀପେଣ୍ଟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ଟାଇଟୋ ଆଲବା' (Tyto alba) । ଟାଇଟୋ ନିଡ଼ି ବଂଶର ପେଟକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଚପା, ଅନେକ ପରିମାଣରେ ମାଙ୍କଡ଼ର ମୁହଁପରି । ଏମାନେ ପୃଥିବୀସାରା ଦେଖାଯାନ୍ତି । ପ୍ରକୃତ ପେଟକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଲ, ଆଖି ବଡ଼, ଗୋଲକାର ଓ ସମ୍ମୁଖକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇରହିଥାଏ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ

ଜାତି-ପେଟକଙ୍କର ଆଖି ଉପରକୁ ଉତ୍ତୋଳନକ୍ଷମ ଶିଫ୍ ପରି ପରଗୁଡ଼ିଆ ଏବଂ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଧ୍ୟାୟାରଣ ପେଟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲା, ରାଜପେଟକ (ବର୍ଣ୍ଣିତ 50) । ଏହାକୁ ଇଂରାଜିରେ ‘ଟିପ୍‌ଟିପିଆ ପେଟକ’ (Spotted owlet) କହନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଏଥେନେ ବ୍ରାମା’ (Athene brama) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ— ଖୁସାଟିଆ, ରୁରୁହଡ଼୍ । ଏହାର ଆକାର ବଣି ପରି ମାତ୍ର ଅଧିକ ସ୍ଥୁଳ । ଏହା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥୁଳ ଓ ବାଙ୍ଗର ପେଟକ । ବର୍ଣ୍ଣ ଧୂସର ବାଦାମୀ ଓ ତା’ ଉପରେ ଧଳା ଟିପ୍‌ଟିପିଆ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ । ପ୍ରକୃତ ପେଟକ ଗଢ଼ଣ ପରି ଏହାର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଲକାର, ଆଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସାରିତ ଓ ସେ ଅପଲକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନାଇଥିଲା ପରି ମନେହୁଏ । ଏହା ଖୋଲ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସକରେ । ଜନବସତି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଜପେଟକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବାସ କରିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଘୁରୁଣା ଆମ୍ବ, ବର ବା ସେହିପରି ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଏମାନେ ରହନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଏକ ବା ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ରାଜପେଟକ ଆସନ୍ତି । ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗଣ୍ଡିରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ ଖୋଲର ଦ୍ଵାର ମୁହଁରେ ଦୁଇଟି ମୁହଁ ଦେଖାଯାଏ । କୌଣସି ନିରୁଦ୍ଧ ଡାଳ ଉପରେ ଜାକିଲୁକି ହୋଇ ଯୋଡ଼ାଏ ରାଜପେଟକ ବସିଥିଲେ, ଏପରି ଠକ୍‌ଠକ୍ ଆଠ୍ଠାଳରେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଯାନ୍ତି । ବୃଥାରେ କୋଲାହଳ କରି ଗୋଟିଏ ନିକଟ ଡାଳକୁ ଉଡ଼ିଯାଇ, ସେମାନେ ବିଦୂଷକ ଠାଣିରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପରତଳ କରି ଅପଲକ ନେତ୍ରରେ ଅନାହତ ପ୍ରବେଶକାରୀକୁ ତର୍କି ଅନାନ୍ତି । ଏପରି ତକାଇବାବେଳେ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଫେପପରି ସୁର ମୋଡ଼ିଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ଷୀଣାଲେକତର ଓ ନିଶାତର । ଦିନବେଳେ ଏମାନେ ଲୁଚି ରହନ୍ତି ଓ ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତି । ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ ରାଜପେଟକ ବାଡ଼ର ଖୁମ୍ବ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ୍ ତାର ବା ସେଇପରି ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଅରକ୍ତପରି ଭୂମି ଉପରେ ଚାଲୁଥିବା କୋଟଳି (beetle) ଓ ଝିଣ୍ଟିକା-ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟତା ପୁଣି ଯାଇ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସନ୍ତି । ନହେଲେ ନିଶାତରେ ଗୋଟିଏ ସୁବଧା ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁବଧା ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ିଯାନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ ରାଜପେଟକ ହଠାତ୍ ବାହାର ଆସି ଭିକାରୀରୁ ବାହାରୁଥିବା ଝିଡ଼ିପୋକ ବା ରାସ୍ତାର ବଡ଼ଖୁଣ୍ଟ ଚାରିପଟେ ଉଡ଼ି ଥିବା କୋଟଳି (beetle) ପିଛା ଏପଟ ସେପଟ କଦାକାର ଭବେ ଉଡ଼ି ନିଶରେ ଧରି ତା’ ବସିବା ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଆସେ । ସେଠାରେ ଶୁଆପରି ଗୋଡ଼କୁ ଅଳ୍ପ ପାଖକୁ ଉଠାଇ କାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ରୁଆରୁଆ କରି ଚରିପକାଏ । ବେଳେବେଳେ ରାଜପେଟକ କୋରୁଟିଆ ବାଜପକ୍ଷୀ (Kestrel) ପରି, ଛପି ଛପି ଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ



ପ୍ରାଣୀକୁ ଗୋପିନରେ ଦେଖିବା ଲାଗି ଉପରେ ଉଡ଼ିବୁଲେ । କୋଟଳ (beetles) ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଠପତଳ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଆହାର, ମାତ୍ର ଏଣୁ ଅ ପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସାନ ମୁଣ୍ଡ ଓ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଖାନ୍ତି । ରାଜପେରୁ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଶବ୍ଦକରେ । ଏ ସବୁ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁରର କର୍କଶ କଡ଼କଡ଼ିଆ ଗୁପା ଶବ୍ଦ । ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱେଷିତାରେ ଯୋଗଦେଇ କର୍ଣ୍ଣକଟୁ ଶବ୍ଦ କରିବାରେ ଲାଗିଯାନ୍ତି । ରାଜପେରୁ ଅରକେ ଦିନୋଟି ବା ଗୁରୁଟି ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । ଭଙ୍ଗା ବା ବ୍ୟବହୃତ କୋଠାଘରର ଗାତ ବା ଖୋଲରେ ଅଳ୍ପ ଘାସ ଓ ପରି ଇତ୍ୟାଦିରେ ମାଡ଼ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ । ଅଣ୍ଟା ଧଳା ଓ ଗୋଲ ଅଣ୍ଟାକାର ।

ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପେରୁ ହେଲା କାଳପେରୁ (ବର୍ଣ୍ଣଚିହ୍ନ 51) । ଓଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ ବାନ୍ ଓ ଭଲ୍ଲୁକ ମଧ୍ୟ କହୁଥାନ୍ତି । ଇଂରାଜି ନାମ ‘ଗ୍ରେଟ୍ ହରନ୍ ଗ୍ରେଟ୍’ (Great horned owl) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ, ‘ବୁବୋ ବୁବୋ’ (Bubo bubo) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ ଘୁରୁ । ଏହାର ଆକାର ପ୍ରାୟ ମାଟିଆ ଚଳପଣ; ମାତ୍ର ତା’ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟିପୁରୁଷ । ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼, ଓଜନିଆ, ଘନ-ବାଦାମୀ ପେରୁ । ଦେହ ଉପରେ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ବାଦାମୀ, କଳା ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଓ ଗାର ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ । ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବଳ (ear tuft) ବା ‘ଶିଙ୍ଗ’ ରହିଥାଏ । କାଳପେରୁକୁ ସହଜରେ ହୁଁ ହୁଁ ପେରୁ [ଇଂରାଜି ନାମ ‘ବାଦାମୀ ମାଛଖିଆ ପେରୁ’ (Brown fish owl), ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ବୁବୋ ଜିଲେନେନସିସ୍’ (Bubo zeylonensis)] ବୋଲି ଭ୍ରମ ହୋଇପାରେ; ମାତ୍ର କାଳପେରୁର ବର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ଲାଲ-ବାଦାମୀ ଓ ଅଧିକ ଘନ-ବାଦାମୀ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କାଳପେରୁ ବା ବାନ୍ ଗୋଡ଼ ପୁରୁଷର ପରିରେ ଆବୃତ୍ତ; ଅଥଚ ହୁଁ ହୁଁର ଗୋଡ଼ ଅନାବୃତ୍ତ । ଦିନବେଳେ ବାନ୍ ବୁଦାତଳେ ଭୂମିରେ ବିଛାମ ନିଏ, ନଚେତ୍ ନିଦାତଟ ବା ଗରୁର ସଙ୍ଗାଣ୍ଡି ଗିରିପଥରେ ଛାଇ ଜାଗା ଦେଖି ପଥର ଉପରେ ବସିଥାଏ । ଏହା ହୁଁ ହୁଁ ପେରୁ ପରି ପୁରୁଷର ଶାଣିଲେକର ଓ ଶବ୍ଦିତର ନୁହେଁ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଦିନବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସାଧାରଣତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ କାଳପେରୁ ତାର ଦିନବେଳର ଲୁକ୍କାୟିତ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଲାବେଳେ ଏକପ୍ରକାର ଗରୁର, ଗମ୍ଭୀର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିବା ‘ବୁ-ବୋ’ ଶବ୍ଦ କରେ । ଏଥିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ୟାଂଶ ବହୁତ ବେଶି ପ୍ରଲମ୍ବିତ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଡାକ ଯେ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚନାଦିତ ତା’ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରକାରିଆ ଖଣ୍ଡ ଓ ବହୁଦୂରକୁ ଶୁଣାଯାଏ । ସେମାନେ ବାହାର ଆସି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ

ବୃହତ୍ ଖୋଲକାର ଶିଳାଖଣ୍ଡ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ବସନ୍ତି । ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଅନାୟାସରେ ଧୀର ସଞ୍ଚରଣରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଶିକାର ଭୂମିକୁ ଉଡ଼ିଯାନ୍ତି । ସାଧାରଣ ରାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ତେଜନା ବା ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନାନା କ୍ରମରେ ରହସ୍ୟମୟ ଗନ୍ଧାର ଗର୍ଜନ ଓ ସୀତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଅଛି । ଛୁଦ୍ର ଛୁଦ୍ର ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, ପକ୍ଷୀ, ଲୁଣ୍ଠାକାଶୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବାନ୍ୟ ପେଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଆହାର । ତା' ସାଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ମାଛ ଓ କଙ୍କଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି । କୃଷି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିଆ-ମୁଣା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆହାର । ଏହି ବହୁଗର୍ଭଧାୟା, ଧୂସକାଞ୍ଚ ଓ ଅନିଷ୍ଟକାଞ୍ଚ ଛୁଦ୍ର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଅବିରାମ ଭାବରେ ଦମନ କରୁଥିବାରୁ କାଳପେଶୁମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଶି । ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଯଥାଯଥ ସରକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ । ଏମାନେ ଧରଣେ ଦିନୋଟିରୁ ଗୁରୁଟି-ଯାଏ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି । ବାନ୍ୟ ଜାଡ଼ ରଚନା କରେ ନାହିଁ; ନଗ୍ନ ଭୂମିରେ ମାଟି ବନ୍ଧର ନିଭୂତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଶିଳାସ୍ତମ୍ଭର ଡାଲ୍ୟାଂଶ ଖୋପ ବା ଆକରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ । ସବୁପ୍ରକାର ପେଟକମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ପରି ବାନ୍ୟର ଅଣ୍ଡା ଗୋଲ ଅଣ୍ଡାକାର । ବର୍ଣ୍ଣ ଲହୁଣୀ-ଆସିଆ ଧଳା ।

**କାପ୍ରିମୁଲ୍‌ଗିଫର୍ମେସ (Order CAPRIMULGIFORMES)**  
 ୨୯—ଭାରତୀୟ ଉପଦ୍ଵୀପରେ ଏହି ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଦୁଇଟି ବଂଶର ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ତନ୍ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବଂଶର ପକ୍ଷୀ ସହଜ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ । ତାହା ହେଲା କାପ୍ରିମୁଲ୍‌ଗିଡ଼ା ବଂଶ (Caprimulgidae) । ଭୂଇଁ ଗୁମ୍ଫା (Night jar) ପକ୍ଷୀ ଏହି ବଂଶର । ଭୂଇଁଗୁମ୍ଫା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ ‘ରାଟି-ସୁକର୍’ (Nightjar) ବ୍ୟତୀତ ‘ଗୋଟ-ସୁକର୍’ (Goat-sucker) ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି । ଏମାନେ କ୍ଷୀଣାଲେକର ବା ରାତିର । ପେଶୁପରି ଏମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୋପନଦ୍ଵାରା ଆହରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହାର ଗୋଡ଼ ଗ୍ରେଟ ଓ ଦୁଗଳ । ଏହାର ପାଟିର ଆଁ ଫୁଲ ଓ ଉଡ଼ୁଥିବା କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀଣ ଅଲେକରେ ଧରି ପାରିବା ଉପଯୋଗୀ । ଶକ୍ତ କଣ୍ଠା ପରି ପକ୍ଷ ପାଟି କଡ଼ରୁ ବାହାରିଥିବାରୁ ଯଦି ଶିକାର ପାଇଁ ପରିସରର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ । ଅନେକ ଜାତିର ଭୂଇଁଗୁମ୍ଫା ଦେଖାଯାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଓ ବହୁତ ଭୂଇଁଗୁମ୍ଫା (ବର୍ଣ୍ଣସ 52)କୁ ଇଂରାଜୀରେ ଭାରତୀୟ ଭୂଇଁଗୁମ୍ଫା (Indian Nightjar) ବୋଲି କହାଯାନ୍ତି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘କାପ୍ରିମୁଲ୍‌ଗାସ

ଏସିଆଟିକାସ୍ (Caprimulgus asiaticus) । ହୁନ୍ଦ ନାମ—ଚପକ, ଡାବ୍‌ବର । ଏହା ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ ଚଢ଼େଇର ଆକାର ହେବ । ଏହାର ଦେହ କୋମଳ ପରବୃତ୍ତ; ବର୍ଣ୍ଣ ଧୂସର, ବାଦାମୀ; କଣ୍ଠ ଓ ହଳଦିଆ-ବାଦାମୀ । ତା' ଉପରେ ଗୁପ୍ତଗୁପ୍ତିଆ ଓ କଳାଗାର ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ । ମୋଟ ଉପରେ ଛଦ୍ମାବରଣ ପାଇଁ ଭୂଇଁ ଗୁପ୍ତଲିର ବର୍ଣ୍ଣ ଜଟିଳ ଗୁଞ୍ଜର । ଏହାର ପକ୍ଷରେ ଧଳା ଚିହ୍ନ ଅଛି । ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ । ଦିନବେଳେ ଗୁପ୍ତଗୁପ୍ତିଆ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମି ଉପରେ ଭୂଇଁଗୁପ୍ତଲି ଏକାକୀ ଝୁଙ୍କି ବସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ ଏହା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଡାକ୍ତା-ମାନ ପତଙ୍ଗ ଶିକାର କରେ, ନଚେତ୍ କରୁ ମାଟି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିଥାଏ । ଏହାର ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଜୀବପତଙ୍ଗ—ଯଥା; କୋଟଳି (beetles), ମଧୁ (moth) ଇତ୍ୟାଦି । ତାର ବଡ଼ ଆଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ି ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଶିକାର କରେ । ଭୂଇଁଗୁପ୍ତଲିମାନଙ୍କର ଉଡ଼ିତା ଶକ୍ତି ଅତି କମ୍ । ଏହା ତା'ର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ସେ ମଧୁ ପରି ଇତିପ୍ରତ୍ୟ ଉଡ଼ିଗୁଲି ପତଙ୍ଗ ଶିକାର କରେ । ଶିକାର ପିତ୍ତ ଧରିଥିଲାବେଳେ ସେମାନେ ଉଡ଼ି ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋଡ଼ରେ ଘୂରିଲା ପରି ଘୂରି ଓ ବାଜି ପାରନ୍ତି । ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଏଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଚଞ୍ଚଳତା ସହକାରେ କେତେବେଳେ ଚକ୍ର ଘୂର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପକ୍ଷରେ ଝାପଟା ମାରନ୍ତି ଓ କେତେବେଳେ ପାଲଟି ଗୋଟିଏ ନୌକାପରି ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି । ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିଥିଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଉପରେ ମଟର ଗାଡ଼ିର ହେଡ଼୍ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲେ ପଦ୍ମରାଗ-ମଣି (Ruby) ପରି ଚକଚକ କରେ । ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଅତି ନିକଟକୁ ଆସି ହେଇ ମାଡ଼ି-ଗଲଜାଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ବେଳକୁ ଭୂଇଁଗୁପ୍ତଲି ବିଚକ୍ଷଣତା ସହକାରେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ । ଏହାର ଡାକ 'ଚୁ-ଚୁ-ଚୁ-ଚୁ-ଚୁ-ଚୁ-ଚୁ-ଚୁ' ଅନେକ ପରମ୍ପରାରେ ବରଫ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ପୋଖରୀ ପାଣି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପଥରକୁ ଗଢ଼ାଇଲେ ଯେପରି ହେବ ସେହିପରି । ଏହି ରାବ ସେ ତଳେ ବସିଥିଲାବେଳେ, ନଚେତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଆବା ଅଶ୍ଳା ଗଛ ଉପରେ ବସି ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ ଓ ସାରା ରାତି ଦେଇଥାଏ । ଦୁଇଟି ଭୂଇଁଗୁପ୍ତଲି ଅନେକ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଛଡ଼ାରେ ବସି ଅନେକ ସମୟ ଯାଏ ପରସ୍ପରକୁ ଡାକି ଡାକି । ଏମାନେ ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ବିଶେଷ କରି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଲୋକିତ ରାତିରେ ବେଶ୍ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି । ଭୂଇଁଗୁପ୍ତଲି ମାଡ଼ ରଚନା କରେନାହିଁ । ଅଳ୍ପ ଗୁପ୍ତଗୁପ୍ତିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭୂମି ଉପରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ଓ ଅରଳେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ । ଅଣ୍ଡା ଲମ୍ବାଳିଆ, ଗ୍ରନ୍ଥାକାର ଓ ଡମ୍ବାକାର । ବର୍ଣ୍ଣ ହାଲୁକା ବାଇଗଣିରୁ ଘନ ଲୋହକ

ବାଦାମୀ । ତା' ଉପରେ ଲାଲ-ବାଦାମୀ ଓ ନାଲ-ଲୋହୁତ ରଙ୍ଗର ଟିପ୍ପିପିଆ ଓ ଗୁପ୍ତଗୁପ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଏ ।

**ଏପୋଡ଼ିଫର୍ମିସ୍ ବର୍ଗ (Order APODIFORMES)**—ଗୁଡ଼ିକ (swift) ପକ୍ଷୀ ଏହି ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ପାତଳ, ଲମ୍ବାଳିଆ, ପକ୍ଷ ଧନୁସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଉଡ଼ିତପ୍ଦର୍ଶି ଉପଯୋଗୀ । ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଏମାନେ ଉଡ଼ିଥାନ୍ତି; ଏବଂ ଏପଟ ସେପଟ ପ୍ରବଣ ବେଗରେ ଶିକାର ପଡ଼େ; ଯଥା—କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ମାଛକାତାୟ ଖାତ (midges), ଗଛପୋକ (bug) ଓ କୋଟଳି (beetle) ମାନଙ୍କ ପିଛା ସେପଟ ମାରି ଶିକାର କରୁଥାନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ଉଣ୍ଡର ଆଁ ଓପାରିଆ ଓ ପଡ଼େ ଶିକାର ଉପଯୋଗୀ । ଗୁଡ଼ିକମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଅତି ଶ୍ଵେତ ଓ ପାଦର ଗୁରୁତ୍ଵାକ୍ଷୀ ଅଙ୍ଗୁଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ । ଫଳରେ ସେମାନେ ଅବାବଲ (Swallow) ପକ୍ଷୀ ପରି ଟେକିଗ୍ରାଫ ତାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରି ମୁନିଆ ଆକୃଷ୍ଟୀ ପରି ନୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂଲମ୍ବ (vertical) ବା ଆନନ୍ତ ବହୁଭାଗ ଉପରେ ଲାଗି ରହି ପାରନ୍ତି । ଏପୋଡ଼ିଫର୍ମିସ୍ ପକ୍ଷୀ ବର୍ଗ (family Apodidae)ର (ପ୍ରକୃତ ଗୁଡ଼ିକ, true swifts) ସବୁଠାରୁ ପରିଚିତ ଗୁଡ଼ିକ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ । ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ‘ଘର ଗୁଡ଼ିକ’ (House swift) କହନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଏପୁସ୍ ଏଫିନିସ୍’ (Apus affinis) (ବର୍ଣ୍ଣିତ 53, ତଳଛବି) । ହିନ୍ଦି ନାମ—ବବଲୁ, ବତାସୀ । ଏହା କେତେକ ପରିମାଣରେ ଘରଟିଆଠାରୁ ସାନ । ବର୍ଣ୍ଣ ଧୂଆଁଟିଆ କଳା, ବେକ ଧଳା । ପିଚ୍ଛ ଅଂଶ ଧଳା । ଲୁହ ଶ୍ଵେତ ଓ ଗୁରୁକୋଣିଆ । ପକ୍ଷ ଲମ୍ବା, ଅଣଓପାରିଆ ଓ ଗୋଜିଆ । ପୁରୁଣା ଦୁର୍ଗ, ଭଗ୍ନ ମସଜିଦ୍ ଓ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବାସଗୃହ ନିକଟରେ ଏମାନେ ବାସ କରନ୍ତି । ଏମାନେ ସାରାଦିନ ଦଳବାଦି ଉଡ଼ି ଚାଲୁଥାନ୍ତି ଓ ଉଡ଼ିଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପଡ଼େ ଶିକାର କରନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ କିରିମିରି ଶବ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତି । ଗୁଡ଼ିକଗୁଡ଼ିକ ମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ଲମ୍ବା ଓ ପ୍ରବାହନରୂପୀ (streamlined) । ତା’ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଅବରୂପ ଭାବରେ ଅତି କ୍ଷିପ୍ରବେଗରେ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଡ଼ିକଗୁଡ଼ିକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଚକ୍ରର ମାରି ଉଡ଼ିଥିବାର ଓ ନାଟକୀୟ ଭାବେ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଉଠୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ‘ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ କିରିମିରି ଧ୍ବନି କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଉଡ଼ି ଓ ଧ୍ବନି କରି ସେମାନେ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼େ । ଗୁଡ଼ିକଗୁଡ଼ିକମାନେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦା ।

ମନ୍ଦ୍ର କରି ମାଡ଼ ରଚନା କରନ୍ତି । କାହ୍ନୁ ବା ଛୁତର କୋଣ ସ୍ଥାନରେ ଏଠି ସେଠି ଅଧ୍ୟାୟିତ ଭାବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ । ମାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ କୋଠାଘର, ଶିଳା ବା ତୋରଣ ଛତାରେ ଏପରିକି ଜନାଙ୍ଗଣ ବନାର ଭିତରେ ଥିବା ଏଇସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ମାଡ଼ ଗୋଲକାର ମାନ୍ଦ୍ର ଅମୟଣ କପ୍ ବା ତାଟିଆ ପରି । ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁରାପୁରା କୁଟା, ପରି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଘିଆରି ହୋଇଥାଏ ଓ ଗୃହଗୃତକର ଲାଲଦ୍ୱାରା ଏକାଠି ପଲସ୍ତରା ହେଲପରି ଲାଗିଥାଏ । ଛୁତ ଓ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଛଦ୍ମ ଫାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏମାନେ ଧରଣେ ଦୁଇଟିରୁ ଚାରିଟି ଯାଏ ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । ଅଣ୍ଟା ଲମ୍ବାଳିଆ ଅଣ୍ଟା ଆକାରର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫେଦ । କୌଣସି ଏକ ଦଳ ବା ‘କଲେନା’ ଗୃହଗୃତକ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ସେଇ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମାଡ଼ ରଚନା କରି ବାସ କରିଥାନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ବା ବାଧାଦେଲେ ନିଆରା କଥା ।

ବର୍ଗ କୋରାସିଫର୍ମିସ୍ (order CORACIIFORMES)-ଆଲସିଡିନିଡ଼ି (Alcedinidae), ମେରୋପିଡ଼ି (meropidae); କୋରାସିଡ଼ି (coraciidae) ଓ ବୁସେରେଟିଡ଼ି (Bucerotidae) ପକ୍ଷୀ ବର୍ଗ ଏହି ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ମାଛରଜା (King fisher) ଆଲସିଡିନିଡ଼ି ଶ୍ରେଣୀ, ବାଂଶପାତୁରି (Bee-eater) ମେରୋପିଡ଼ି ଶ୍ରେଣୀ, ଭରଦ୍ୱାଜ ପକ୍ଷୀ (Roller) କୋରାସିଡ଼ି ଶ୍ରେଣୀ ଓ କୋରଲିଖାର (Horn-bill) କାଖାୟ ପକ୍ଷୀ ବୁସେରେଟିଡ଼ି ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ଯାଆନ୍ତି ।

ଗଜେଇଡ଼ି (ବର୍ଣ୍ଣିତ 54) ଇଂରାଜି ନାମ ଛଦ୍ମ ମାଛରଜା (Small Blue King fisher) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଆଲସିଡ଼ୋ ଏଥସ’ (Alcedo atthis) । ହିନ୍ଦି—ଛୋଟା କଳକିଲା, ସରଫନ୍ । ଏହା ଘରଟିଆ ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼ । ଏହା ଗୋଟିଏ ଛଦ୍ମ ସୁନ୍ଦର ନୀଳ-ସବୁଜ ମାଛରଜା । ପେଟ ପାଖର ବର୍ଣ୍ଣ ଘନ ଲାଲ-ବାଦାମୀ । ଲୁହ ଛୋଟ ଓ ଥୁଣ୍ଡା । ଅଣ୍ଟା ଲମ୍ବା, ସିଧାସଳଖ ମୁନିଆଁ । ଝରଣା, ପୋଖରୀ ଓ ଗାଡ଼ିଆ କୂଳରେ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଥିବା ତରୁଣାଖାରେ ଗଜେଇଡ଼ି ସାଧାରଣତଃ ବସିଥିବାର ବା ଜଳ ନିକଟରେ ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ବେଗରେ ଉଡ଼ିଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କଦବା କେମିତି ଏହା ପଥୁଆ ସମୁଦ୍ର ଖରଟରେ ଅଭିଯାନରେ ବାହାରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ଗଜେଇଡ଼ି ପାଣିର ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚରେ ରହୁଥିବା ତରୁଣାଖାରେ ବସି ଅବିଚଳ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପର ତଳ, ଏପଟ ସେପଟ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଥୁଣ୍ଡା ଲୁହକୁ ସଂକଳନ କରୁଥାଏ । ଲୁହ ଫୁଲନ କଲବେଳେ ଏକ ଶାଖ କିମ୍ବା ଶବ୍ଦ ହୁଏ । ସବୁବେଳେ ତା’ର ଦୃଷ୍ଟି

ରହିଥାଏ ଜଳ ଉପରେ । ମାଛ ବା ବେଙ୍ଗଫିଶ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଜଳ ଉପରେ ଉଡ଼ିବା ଉପରେ ଦେଖିଲମାନେ ସେ ତା' ଉପରେ ଦୁଇ କର ଯାଇ ପଡ଼େ । ଏତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ଜଳକୁ ମୁହେଁ ରହିଥାଏ । ପାଣି ଛୁଟିକିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ଶିକାରକୁ ଲମ୍ବାବାଗରେ ଅଳ୍ପରେ ଧରିପକାଇଛି । ସେ ନିକଟସ୍ଥ ବସିବା ସ୍ଥାନକୁ ପୁଣି ଉଡ଼ି ଆସେ । ସେଠାରେ ଶିକାର ଜୀବକୁ ମାରି ଗିଳି ପକାଏ । ବେଳେ ବେଳେ ଗଙ୍ଗେଇଡ଼ୁର ଜଳ ଉପରେ ଉଡ଼ି ବୁଲି ଶିକାର ଜୀବ ପିଛୁ ଡୁବିମାରେ । ପାଣି ଉପରେ ଉଡ଼ିବୁଲି ଶିକାର ପିଛୁ ଡୁବିମାରବା କଳକଳା ମାଛରଜା (Pied king fisher)ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ଏକ ଦେଖିବାର ଜନନୀୟ । ଅହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗେଇଡ଼ୁର ଜଳର ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚରେ ଖସିବେଳେ ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖ, ସେ ପାଖରୁ ଏ ପାଖ ଉଡ଼ି ଯାଏ ଦଉଡ଼ି କରୁଥିଲାବେଳେ ଏକ ପ୍ରକାର ଖସି ଚି ଚି ଶବ୍ଦକରେ । ମାଂସ ଓ ବେଙ୍ଗଫିଶ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଜଳବାସୀ କୋଟଳି (Water beetle) ଓ ସେମାନଙ୍କର ଲାର୍ଭା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଳବାସୀ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାଏ । ଝରଣା, ପୋଖରୀ ଓ ଖାଲର ମାଟି ବନ୍ଧରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଘିଆରି କରି ଗଙ୍ଗେଇଡ଼ୁର ବସା କରିଥାଏ । ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭୂସମାନ୍ତର ଭାବେ ରହିଥାଏ ଓ ଏକମିଟର ବା ତା' ଠାରୁ ଅଧିକ ଯାଏ ଲମ୍ବ ହୋଇଥାଏ । ତା ଶେଷମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଓସାରିଆ ଅଣ୍ଟା କୋଠା ଥାଏ । କୋଠା ଭିତର ଅଂଶରେ କୁଟା, କାଠି, ପର ଆଦି ଲେପାହୋଇ ନଥାଏ; ମାତ୍ର ଗଛ କରୁଥିବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମାଛ କଣ୍ଟା ଓ କୋଟଳି (beetle) ପକ୍ଷବର୍ମ (elytra) ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିଥାଏ । ଅରକେ ଗଙ୍ଗେଇଡ଼ୁର ସାଧାରଣତଃ ପାହୁରୁ ସାତଟି ଯାଏ ଅଣ୍ଟା ଘିଏ । ଅଣ୍ଟାର ବର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଧଳା । ଆକାର ଗୋଲ ଅଣ୍ଟାକାର ଓ ଖୁବ୍ ଚକ୍ଚକ ।

ଅଉ ଜାତିର ମାଛରଜା ଅଛି, ତାକୁ ଇଂରାଜରେ 'ଧଳାଛୁରିଆ ମାଛରଜା' (White breasted king fisher) ବୋଲି କହନ୍ତି । ଏହା ବରଂ ଗଙ୍ଗେଇଡ଼ୁର ଭୂମିରେ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଓ ଆମର ପରିଚିତ । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ହାଲ୍‌ସିୟନ୍ ସ୍ମାଇରେନ୍‌ସିସ' (Halcyon smyrensis) । ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଜାତି ମାଛରଜାଙ୍କ ଭୂମିରେ ଏହା ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଜଳ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ନିର୍ଭରଶୀଳ । କାରଣ ଏହାର ଟାଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୂମିବାସୀ ଜୀବ ପଡ଼େ । ଏହା ଆକାରରେ ପ୍ରାୟ ବଣି ପରି ହେବ । ପିଠି ଉପର ଅଞ୍ଚଳ ନୀଳମଣି ବର୍ଣ୍ଣର । ମୁଣ୍ଡ, ବେକ ଓ ପେଟ ପାଖ ଘନ ଚକୋଲେଟ୍-ବାଦାମୀ । ଛୁଇଁ ଅଂଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଧଳାବର୍ଣ୍ଣ



[ ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ‘କୁର୍ତ୍ତା’ର ସାମନାପଟ’ (‘shirt front’) ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି ]  
ଏହା ଲମ୍ବା, ନିଦା ଓ ଗୋଜିଆ ଲାଲ ଅଳ୍ପ ଦ୍ଵାରା ଏହାକୁ ଚିହ୍ନି ହୁଏ । ଉଡ଼ିଲାବେଳେ  
କିଲା ପକ୍ଷରେ ଏକ ବଡ଼ ଧଳା ଗ୍ରସ୍ତ ଦେଖାଯାଏ ।

**କଳକଳା** (ବର୍ଣ୍ଣପତ୍ର 55)—ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ଗ୍ରେପିଡ଼ିଆ ମାଛରକ୍ଷା’ (Pied king fisher) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ସେରୁଜିଲ ରୁଡ଼ିସ’ (ceryl rudis) ।  
ହଳ ନାମ କୋରୁୟାଲ, କଳକଳା, କରୋନା । ଏହାକୁ କେହି ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏପରି  
ନାହିଁ । ଏହାର ଆକାର ବଣି ଓ ପାରୁର ମଧ୍ୟମରେ । କଳା-ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣର ଗ୍ରେପିଡ଼ିଆ ଓ  
ଡୋରାଆ ଚିହ୍ନ ଦେହରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ଅନ୍ୟ ମାଛରକ୍ଷାମାନଙ୍କ ପରି ଏହାର ଅଳ୍ପ  
ମଜରୁଡ଼ି ଓ ଗ୍ରେପି ପରି । ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ମାଛ ପରି ।  
ମାଛ ପକ୍ଷୀର ଗଳାରେ କଳାବର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ହାର ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଂଶରେ ଟିକିଏ  
ଭଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ । (ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ରରେ ମାଛ କଳକଳାର ଛବି ଦିଆଯାଇଅଛି) । ଅଣ୍ଟିର  
ପକ୍ଷୀର ଗଳାରେ ମଧ୍ୟ କଳାରଙ୍ଗର ଗଳାହାର (gorget) ଥାଏ; ମାତ୍ର ତାହା  
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭଙ୍ଗିଯାଇ ନଥାଏ ଓ ଗୋଟିଏ ହାର ବଦଳରେ ଦୁଇଟି । ଏକ ବା ଯୋଡ଼ି  
ଯୋଡ଼ି ହୋଇ କଳକଳା ନଦୀ, ଜୋର, ଗାଁ ପୋଖରୀ, ବନ୍ଦ ଓ ଜୁଆରୁଆ ଖାଡ଼ି  
କୂଳରେ ଏକ ସମାନ୍ତର ଖୁଣ୍ଟି ବା ପଥର ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି ଆଉ ଅରକୁଅର  
ଲୁହକୁ ଉପର ତଳ ଓ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳ ଉପର ଏ ପାଖ ସେ ପାଖ କରୁଥାନ୍ତି । ଉଡ଼ୁଥିଲା  
ବେଳେ ଏହା ଏକ ଟାଣ୍ଟ ଉଲ୍ଲାସକର ‘ଚିରୁଚୁକ୍, ଚିରୁଚୁକ୍’ ରାବକରେ । ଏହା ଯେ  
ଥରେ ଶୁଣିଲୁ, ସେ କିଲକିଲା ପକ୍ଷୀକୁ ଭୁଲି ନ ପାରେ । ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷତ୍ଵ  
ହେଉଛି, ଶିକାର ବେଳର ଦର୍ଶନୀୟ ଠାଣି । ପାଣି ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା ବେଳେ ତାର ଆଖି  
ତଳେ କୌଣସି ମାନ ପାଣି ଉପର ଆଡ଼କୁ ଉଠିଥିବା ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ସଂଦେହ ନାହିଁ ।  
ମାନଟିଏ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ଉଡ଼ୁଥିବା କଳକଳା ହଠାତ୍ ଶ୍ଵିର ହୋଇଯାଏ, ପବନ  
ଆଡ଼କୁ ମୁହଁକରି ଦେହକୁ ସିଧା ଭାବରେ ଠିଆ କରିଦିଏ । ସେହି ସମୟରେ ଯେପରିକି ସେ  
ଲୁହ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି । ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପକ୍ଷ ସଞ୍ଚାଳନ କରି ସେ ପାଣି ଉପରେ  
ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ମାନ ଉଡ଼ୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଉପରେ ‘ଝଲି ରହେ’ ଆଉ ସାନ ମାଛଟିକୁ  
ଧରିବାକୁ ଅଳ୍ପ ଦିଆର ରହୁଥାଏ । ମାନ ପାଣି ଭିତରେ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ  
ଓ ଆଦାତ କରିବା ଦୂରତ୍ଵକୁ ଆସିଗଲା ମାତ୍ର କଳକଳା ପକ୍ଷ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏବଂ  
ଛ-ଆଠ ମିନିଟ ଉପରୁ ବଜ୍ରପରି ତଳକୁ ଘୁରୁଘୁରି ପାଣି ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼େ । ପରେ  
ପରେ ସେ ଅଳ୍ପରେ ଶିକାର ଧରି ଉଠି ପଡ଼େ, ଦେହରୁ ପାଣି ଝାଡ଼ିବା ପାଇଁ

କାନ୍ଧକୁ ଟିକିଏ ଦୋହଲାଇ ଥିଏ ଓ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ବସିବା ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ିଯାଏ । ସେଠାରେ ଅଳ୍ପ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ସାନ ମାଛଟିକୁ ମାରି, ଠିକ ବାଟେ ଫେରି ମୁଣ୍ଡ ପଟୁ ଗିଲେ । ମାଛ କଳକଳାର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ । ମାଛ ବେଙ୍ଗଫୁଲ, ବେଙ୍ଗ ଫୁଲ କାନ୍ଦା କାଟ ମଧ୍ୟ ଖାଏ । କଳକଳା ମାଟି ବନ୍ଧି ଭିତରେ ଭୂସମାନ୍ତର ଭାବେ ଫୁଡ଼ାଇ ଚାଲି କରୁଥାନ୍ତି । ଫୁଡ଼ାଇ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଜାଡ଼ ରହିଥାଏ । ତା' ଭିତରେ କାଠ ବା ପର ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ; ମାତ୍ର ଖିଆହୋଇ ବଳିଥିବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମାଛ ହାଡ଼ ପଡ଼ିଥାଏ । ଥରକେ 5-6ଟି ଅଣ୍ଡା ଥାଏ । ଅଣ୍ଡା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା, ଚକଚକିଆ ଓ ଗୋଲ ଅଣ୍ଡାକାର ।

**ହିମାଳୟ କଳକଳା**—ଏହାକୁ ଇଂରାଜିରେ ‘ହିମାଳୟ କଳକଳା’ ( Himalayan pied king-fisher ) କହନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ସେରିଲ ଲୁଗୁବ୍ରିସ’ ( *Ceryle lugubris* ) । ଏହା ସାଧାରଣ କଳକଳା ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଓ ଏହାର ମୁଣ୍ଡର ଚଢ଼ା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ । ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ସାଧାରଣ କଳକଳା 800 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ । ତାଠୁ ଉପର ଅଞ୍ଚଳରେ ହିମାଳୟ କଳକଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

**ଟିନ୍ଥୁନ**—( ବର୍ଣ୍ଣିତ 56—ଇଂରାଜି ନାମ ‘ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ରୀନ ବୀ-ଇଟର’ ( Small green Bee-eater ) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ମେରପସ ଓରିଏଣ୍ଟାଲିସ’ ( *Merops orientalis* ) । ହିନ୍ଦି ନାମ ପସିଙ୍ଗା । ଏହା କୃଷି ଓ ଆକାରରେ ପ୍ରାୟ ଘରଟିଆ ପରି ହେବ । ବର୍ଣ୍ଣିତ ଘାସ ପରି ସବୁଜ । ମୁଣ୍ଡ ଓ ବେକରେ ଲଲବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଆଭାସ ଥାଏ । ଲମ୍ବର ମଝି ପରି ଦୁଇଟି ପଛ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ଓ ମୁଣ୍ଡ ପିନ୍ଧିକଣ୍ଡା ପରି । ଅଣ୍ଟା ଶାଓ, ସାମାନ୍ୟ ବଙ୍କା ଓ କଳା । ବେକରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ କଳା ‘ଗଳାହାର’ ଥାଏ । ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ଵାରା ଟିନ୍ଥୁନକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ହୋଇପାରେ । ଏମାନେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଅଧିକା ଅସମ୍ବନ୍ଧ ଦଳରେ ଖୋଲି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଏମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭୂମି, ସଫାକରିଯାଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୋବୁରଣ ଭୂମିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଅସମ୍ବନ୍ଧ ଦଳରେ ଟିନ୍ଥୁନ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ତାର, ବାଡ଼ ଖୁଣ୍ଟି ଓ ବୁଦା ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି । ଏଠାରୁ ଶିଘ୍ର ବେଗରେ ବାହାରି ପଡ଼ି ଲଳିତ ଛନ୍ଦରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପତଙ୍ଗ ପିଛା ‘ଧରନ୍ତି’ ଏବଂ ଶିକାର ଧରିବା ପରେ ପ୍ରସାରିତ ପକ୍ଷକୁ ନିଶ୍ଚଳ ରଖି ଚକ୍ଚକ ମାରି ବସିବା ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି । ସେଠାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଶିକାର ପତଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେ ବେଗରେ ଆଘାତ କରି ମାରି

ଶୁଣନ୍ତି । ଉଡ଼ି ଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ଅବରାମ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରୀତିକର ଠୁଣୁଣିଆ ‘ଟିଟ୍-ଟିଟ୍’ ବା ‘ଟି-ଟି-ଟି’ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ଫୁଲ ଫଣ୍ୟାରେ ଚିନ୍ତୁନ ଆଦୃତ ଗହଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗଛରେ ରୁଦ୍ଧି କଟାଇବା ପାଇଁ ଆସି ଜମା ହୁଅନ୍ତି । ଚିତ୍ରାକ୍ ହୋଇ ବସିବା ଯାଏ ବହୁତ କୋଳାହଳ ଓ ତରୁପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ । କୌଣସି ସ୍ଵଷ୍ଟ କାରଣ ନ ଥାଇ ଛୋଟାଯାକ ଚିନ୍ତୁନ ଯଶସ୍ୟାବେକେ ହୃତହୃତ କରି ଠେଲିଠେଲି ହେଇ ଉଠିପଡ଼ନ୍ତି ଓ ଉଦ୍‌ବେଗିତ ଭାବେ କମ୍ପିତ ସ୍ଵରରେ ଶବ୍ଦ କରି ଗଛ ଚାରିପଟେ ଚକ୍‌ଚକ ମାରନ୍ତି । ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍‌ବେଗନା ଓ କାକଲି ଅମି ଆସେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସନ୍ତି । ବୃକ୍ଷ ଜାଲରେ ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳରେ ଠେସାଠେସି ହୋଇ ବସନ୍ତି । ଏତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେହର ପରକୁ ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିଲା ପରି ଫୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ମୁଣ୍ଡକୁ ପକ୍ଷ ତଳେ ଗୁଞ୍ଜି ଦିଅନ୍ତି । ପକ୍ଷୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବେଳା କରି ଉଠନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଲଭାବେ ଉଦୟ ନ ହେଲା ଯାଏ ଚିନ୍ତୁନମାନେ ଶୋଇଥାନ୍ତି । କର୍ଜୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ଆହାର । ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ମହୁମାଛମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମହୁଗୁଣ୍ଡ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି । ଚିନ୍ତୁନ ପକ୍ଷୀମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ମାଡ଼ ରଚନା କରନ୍ତି । ବାଲିଆ ମାଟି ଭିତରେ ଆନୁଭୂମିକ ଭାବେ ଏକ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବର ଗୁଡ଼ିଆ ଡିଆରି ହୋଇଥାଏ । ତାକୁ ବନ୍ଧରେ ଗୁଡ଼ିଆ ତେରସ୍ତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, ଗୁଡ଼ିଆ ଶେଷ ଓଁସାରିଆ ହୋଇଥାଏ । ସେଥିରେ କୁଟାକାଠି ନଥାଏ । ଏକଠି ସେ ଅଣ୍ଟାଦିଏ । ଅରକେ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତଟିଯାଏ ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଧଳା ଓ ଆକାର ଗୋଲ ଅଣ୍ଟାକାର ।

**ବଡ଼ ବାଂଶ ପାତୁର -** ଚିନ୍ତୁନ ପକ୍ଷୀର ଏକ ଜାତି । ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ‘ମାଲଜୁ ବାଂଶ ପାତୁର’ (Bluetailed Bee-eater) ବୋଲି କହନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ମେରପସ୍ ଫିଲିପ୍ପିନାସ (Merops philippinus)’ ଏହା ଚିନ୍ତୁନଠାରୁ ଆକାରରେ ବଡ଼ । ଏହାର ଆଖି ଦେଇ ଆଗରୁ ଆଖି ଦୁଇପାଖେ (ଆଗକୁ ଅଗ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଓ ପଛକୁ) କଳା ଗାର ଥାଏ । ବେକ ବାଦାମୀ ଓ ଲାଞ୍ଜ ମାଲବର୍ଣ୍ଣର । ଖୋଲି ଜମିରେ ବଡ଼ ବାଂଶପାତୁର ଏକ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ଓ ସାଧାରଣତଃ ପୋଖରୀ ଏବଂ ଯୋର ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହା ଚାରି ଅନୁସାରେ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଗମନ କରେ; ମାତ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପକ୍ଷିତତ୍ତ୍ଵବିତ୍ତମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସୀମିତ । ସେମାନେ କୌଣସି ଦେଶ ଭିତରେ

ରୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି-ତାହା ଜଣା ନାହିଁ ।

**କୋରାସିଆ**—( Coraciidae ) ବର୍ଗ—ଏ ବର୍ଗର ପକ୍ଷୀ ହେଲା ଥିମ୍ବର ପରିଚିତ ଭଦଭଦଳିଆ ( ବର୍ଣ୍ଣଗତ 57 ) । ଓଡ଼ିଆରେ ମୂଳ ବିଶେଷରେ ଏହାକୁ ଭରଦ୍ବାଜ; ତମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ଓ ଟିହାବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥାନ୍ତି, । ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରଲ୍ଲର’ ( Indian Roller ) ଓ ‘ବ୍ଲୁ ଜେ’ ( Blue Jay ) । ବେଙ୍ଗାଳୀ ନାମ ‘କୋରାସିଆସ୍ ବେଙ୍ଗାଲେନସିସ୍’ ( Coracias benghalensis ) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ ମାଳକଣ୍ଠ, ସବଜକ୍ । ଏହା ‘ଏକ ମନୋହର ମାଳପକ୍ଷୀ ଓ ଆକାରରେ ପ୍ରାୟ ପାରା ପରି । ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼, ଥଣ୍ଡା ଢାସ, ଗୁଡ଼ର ବର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ-ବାଦାମୀ, ଉଦର ଓ ଲଞ୍ଜ ତଳ ଫିକା ନୀଳ । ପକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣ କଳା ଓ ନୀଳ । ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ଅଙ୍ଗୁଳୀର ପଟିପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ପକ୍ଷୀ ଓ ଘନ ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଭଦଭଦଳିଆ ସାଧାରଣତଃ ଥଣ୍ଡା ଗଛ ବା ଟେଲିଗ୍ରାଫ ତାର ଉପରେ ବସିଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ସେ ଗୁଣ୍ଡାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରେ । ସେଠାରୁ ସେ ପୁନଃପୁନଃ ଭୂମିକୁ ଝାମ୍ପିଦେଇ ପୋକଟିଏ ଥଣ୍ଡାରେ ଧରି ପୁଣି ତାର ବସିବା ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଥାଏ, ନଚେତ୍ ଧୀର ମନ୍ତ୍ରର ଗଡ଼ରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବସେ । ସେଠାରେ ଆହାର ପୋକକୁ ମାରି ଗିଳେ । ଟ୍ରିକେଟ୍ ( Cricket ) ଟ୍ରିକେଟ୍, କୋଟଳି ( beetle ) ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟ ଭଦଭଦଳିଆ ପକ୍ଷୀର ପ୍ରଧାନ ଆହାର । ଏମାନେ ଫସଲ ନଷ୍ଟକାରୀ କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆହାର କରି କୃଷକର ପ୍ରଭୁତ୍ତ ଉପକାର କରନ୍ତି । କେତେବେଳେ କେମିତି ଏଣୁଥ, ମୁଝା ଓ ବେଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଭଦଭଦଳିଆର ସ୍ବର ଉଚ୍ଚ, କର୍କଶ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର । ବିଶେଷ କରି ଅଭିଯାନ-ବେଳେ ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ତା’ର ଶବ୍ଦ ବେଶ୍ ଉଚ୍ଚ ଓ କର୍କଶ ହୋଇଥାଏ । ଏ ସମୟରେ ସେ ନାନାପ୍ରକାର ଅଭୂତ ଖେଳ ଆକାଶରେ ଦେଖାଏ । ରକେଟ୍ ପରି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଯିବା, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଓଲଟି ଯିବା, ମୁହଁକୁ ତଳକୁ କରି ମାଡ଼ିଆସିବା, କଡ଼ ପଟିଆ ଓଲଟିବା ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ । ତା’ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍କଶ ଶବ୍ଦ କରେ ଓ ତା’ ପକ୍ଷର ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଚକ୍ ଚକ୍ କରି ଉଠେ । ବୃକ୍ଷର ପ୍ରାକୃତିକ ଖୋଲରେ କୁଟା, ପର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବର୍ଜନା ଦେଇ ଭଦଭଦଳିଆ ନିଜ ରଚନା କରଥାଏ । ଧରକେ ଗୁରୁଟିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଯାଏ ଅଣ୍ଟାଦିଏ । ଅଣ୍ଟା ଚିକ୍ ଚିକ୍, ପୁଣି ସଫେଦ ଓ ଗୋଲ ଅଣ୍ଟାକାର ।

ଆଉ ଜାତିଏ ଭଦଭଦଳିଆ ଅଛି, ତାକୁ ‘କାଶ୍ମୀର ଭରଦ୍ବାଜ’ ( Kashmir

ଚେ ନଂ 49  
 କୁମ୍ଭାଚିଆ  
 ( Crow-Pheasant or Coucal )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 100 ଦେଖ





ଚିତ୍ର ନଂ 50  
 ଗୁଳି ପେଶୁ  
 (Spotted Owlet)  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 102 ଦେଖ





ଚିତ୍ର ନଂ 51.

କାଳ ପେରୁ

(Great Horned Owl)

ପୃଷ୍ଠା ନଂ 103 ଦେଖ



କେ ନଂ 52  
ଭୂଇଁ ଗୁମୁଲ  
( Indian Nightjar )  
ପୃଷ୍ଠା ନଂ 104 ଦେଖ

ଚିତ୍ର ନଂ 53.  
ଘୃହ ଶ୍ଵେତକ  
( House Swift )  
ଚିତ୍ର ନଂ 106 ଦେଖ







ଚିତ୍ର ନଂ 54  
 ଛୋଟ ନୀଳ ଶିଉଳି  
 ( Small Blue Kingfisher )  
 ଚିତ୍ର ନଂ 107 ଦେଖ




ଚିତ୍ର ନଂ 55

କଳକଳା

( Pied Kingfisher )

ପୃଷ୍ଠା ନଂ 105 ଦେଖ



ଚିତ୍ର ନଂ 56  
 ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ  
 ( Small Green Bee-Eater )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 110 ଡେସ





ଂଚକ ନଂ 57

ଭବଭବନୀ

( Indian Roller or Blue Jay )

ପୃଷ୍ଠା ନଂ 112 ଦେଖ



ଚିତ୍ର ନଂ 58  
 ଶାଢ଼ଗୁଣା  
 ( Hoopoe )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 113 ଦେଖ

ବର୍ଷ '59  
 ଖୋର୍ଦ୍ଧା  
 ( Malabar Pied Hornbill )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 114 ଦେଖ







ଚିତ୍ର ନଂ 60  
 ସିନାମେଣ୍ଟ  
 (Coppersmith ~~Crimsonbreasted~~ Barbet)  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 116 ଦେଖ



ଚିତ୍ର ନଂ 61  
 କାଠହଣା  
 ( Mahratta Woodpecker )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 117 ଦେଖ




ଚଢ଼ ନଂ 62  
 ନବଲୋ!  
 ( Indian Pitta )  
 ପୁଷ୍ପା ନିର୍ମଳା ଦେବୀ





ଚନ୍ଦ୍ର ନଂ 63  
 କ୍ରେସ୍ଟେଡ୍ ଲାର୍କ  
 (Crested Lark)  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 121



ଚିତ୍ର ନଂ 64

ତୃଷ୍ଣା

(Ashvcrowned or Blackbellied Finch-Lark)

ପୃଷ୍ଠା ନଂ 122 ଦେଖ

Roller) କିଛି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘କୋରାସିଆସ ଗାରୁଲ୍‌ସ’ (Coracias garrulus) । ଏହା କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଆଉ କାକୁ ପ୍ରବାସ ଯାହା କଲିବେଲେ ହିନ୍ଦି, କର, ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଗୁଜରାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଚିଲି ବା ସହଜ । କାରଣ ଏହାର ପକ୍ଷ କୃଷ୍ଣ-ମାଲ ( ବର୍ଣ୍ଣ 57ର ଉପର କୋଣରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖ ) । ଏହାର ସାବ ତଳପାଖ ଓ ଗୁଡ଼ି ଫଳା ନାଲ ।

ଉପୁପିଡ଼ା (Upupidae) ବଂଶ—ଏହି ପକ୍ଷୀବଂଶର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଜାତି ହେଲା ଶାରଗୁଣା (ବର୍ଣ୍ଣ 58) । ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ହୁପୋ’ (Hoopoe); ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ୟୁପୁପା ଇପପସ’ (Upupa epops); ହିନ୍ଦୀ ନାମ ହୁପ୍‌ହୁପ୍ । ଏହା ଗୋଟିଏ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ହାଲୁକା ହଲହୁଆ-ବାଦାମି ରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀ । ପିଠି, ଡେଣା ଓ ଲୁହରେ ଜେବ୍ରା ଦେହରେ ଗାର ପଡ଼ିଥିଲା ପରି କଳାରଙ୍ଗର ଗାର ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହାର ମୁଣ୍ଡରେ ଚୂଡ଼ା ଅଛି । ତାହା ଗୋଲକାର, ସ୍ୱର ଖୋଲି ଯାଇଥିବା ପଙ୍ଖା ପରି ଓ ସଙ୍କୋଚ୍ୟ ଅଣ୍ଟା ଲମ୍ବା, ସ୍ୱର ଓ ସାମାନ୍ୟ ବଞ୍ଜା । ଏହାର ଲକ୍ଷଣଦ୍ୱାରା ଶାରଗୁଣା ପକ୍ଷୀକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ହେବ । ଏହାର ଆକାର ପ୍ରାୟ ବଣିପରି । ସାଧାରଣତଃ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ବା ଷ୍ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟ୍ରୁ ଦଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହା ତୃମେୟ ଭୂମି, ବଗିଚା, ନିକୃଷ୍ଟ ଓ ଅଳ୍ପ ଜାଙ୍ଗୁ ଜାଙ୍ଗୁ ଲିଆ ଖୋଲି ଅଞ୍ଚଳ, ବଣେଷ କର ସହର ଓ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବାକୁ ଭଲପାଏ । ଶାରଗୁଣା ମସଲ ଗଡ଼ରେ ପଦକୁ ଛାପି ଛାପି ଅନେକଟା ପୁଣ୍ଡୁକ (Quail) ଚଢ଼େଇ ପରି ଭୂମି ଉପରେ ଚାଲେ ବା ଦୌଡ଼େ ଏବଂ ଅଣ୍ଟାକୁ ଚିମୁଟା ପରି ଧେନୁଇ ଝିଡ଼ିପଡ଼ିଥିବା ପକ୍ଷ ଓ ମାଟି ଖୋଳାଇ ଆହାର ଖୋଜେ । ଅଣ୍ଟାରେ ଏକପରି ମାଟିକୁ ହାଣିଲବେଳେ ମସ୍ତକ ଉପରର ପଙ୍ଖା ପରି ଚୂଡ଼ା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ଗ୍ରେଟ ଗର୍ଭ ପରି ଦେଖାଯାଏ । ଉତ୍ତେଜିତ ବା ଶଙ୍କତିତ ହେଲେ ଚୂଡ଼ା ପଙ୍ଖାପରି ଖୋଲିଯାଏ । ଶାରଗୁଣା ଭରଜାୟିତ ଗଡ଼ରେ ଅନିଷ୍ଟିତ ଭାବେ କିଛି ବାଟ ଉଡ଼ିଯାଇ ଦୁର୍ଘଟିତ ଓହ୍ଲାଇପଡ଼େ ଓ ଚୂଡ଼ା ପୁଣି ବୁଜିଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗର୍ଭ ପରି ରହେ । ଏହାର ଡାକ ଏକ ପ୍ରକାର ମୃଦୁ ସଙ୍ଗୀତମୟ ‘ହୁ-ପୋ’ ବା ‘ହୁ-ପୋ-ପୋ’ । ଏହା ବାୟୁମ୍ବର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏକକାଳୀନ ପ୍ରାୟ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଯାଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ । ଡାକ ଦେଲବେଳେ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଲାଇ ଉପର ତଳ ଛିପିଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ; ଫଳରେ ଅଣ୍ଟା ଛୁଇଁଉପରେ ଆସି ଯାଏ । ଅନ୍ୟ ସମୟରେ

ସେ ପ୍ରତି ଡାକ ପୂର୍ବରୁ ଭୁକିଲପର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କର୍ତ୍ତାଏ ଓ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଚୂଡ଼ା ଖୋଲେ ଓ ବନ୍ଦ ହୁଏ । ‘ହୁ-ପୋ’ ଡାକ ବ୍ୟତୀତ ଶାରଗୁଣୀ ଆଉ କେତେକ ବଢ଼ିଲା ପ୍ରକାର କର୍କଶ ରାବ ଓ ଗୁପା ହାସ୍ୟପର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରେ । ଜୀବତକ, କୋଟଳ ଶବ୍ଦ (grub) ଓ ଜୀବର ଘୁଞ୍ଚା (pupa) ଏମାନଙ୍କର ଯଥାନ୍ତର ଅହାର । ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆମ ଫସଲର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ । ଏଣୁ ଶାରଗୁଣୀ ଆମର ଏକ ଅତି ଉପକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ । ଏହା କାହୁଁର ଗର୍ଭି, ଛାତ, ପକ୍କା ଘରର ଖୋପ ବା ବୃକ୍ଷର ପ୍ରାକୃତିକ ଗହ୍ବରରେ ନିଜ ରଚନାକରେ । ମଇଳା କନା, କେଶ, କୁଟା ଓ ଆବର୍ଜନାଦ୍ୱାରା ନିଜ ରଚିତ ହୁଏ । ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କର ନିଜ ଶାସନ ଗନ୍ଧକରେ । ଶାରଗୁଣୀ ଥରକେ ପାଞ୍ଚଟିରୁ ବଅଟି ଅଣ୍ଡାଦିଏ । ଅଣ୍ଡା ଧଳା ମାଂସ ସାଧାରଣତଃ ଉଷୁମା ହେଉଥିବାବେଳେ ମଇଳା ଲାଗି ଭେଦେଇ ହୋଇଯାଏ ।

କୋରୁସି ଫରମିସ୍ ପକ୍ଷୀ ବର୍ଗର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଂଶ ହେଲା ବୁସେଲେଟିଡ଼ି । କୋରୁଲିଖାଇ ଏହି ବଂଶର । ଏମାନେ ବୃହତ୍‌କାୟ, ଫଳଭୋଜୀ ଓ ବୃକ୍ଷବାସୀ ପକ୍ଷୀ । ଏମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଅତି ବଡ଼ । କୋରୁଲିଖାଇ ବା ଧନେଶ (ବର୍ଣ୍ଣିତ 59)—ଏହାର ଇଂରାଜି ନାମ ‘ରିଡି ମାଲବାର କୋରୁଲି ଖାଇ’ (Malabar Pied Hornbill) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଏନ୍ଥ୍ରାକୋସେରସ୍ କରୋନେଟସ୍’ (Anthracoceros Coronatus) । ହିନ୍ଦି ନାମ ଧନେଶ । ଏହା ଆକାରରେ ମାଟିଆ ଚିଲ ଅପେକ୍ଷା ଅଳ୍ପ ବଡ଼ । ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ କଳା ଓ ଧଳା । ଲୁହ ଲମ୍ବା, ଓସାରୁଆ ଓ କଳା । ଲୁହର ବାହାରଆଡ଼କୁ ଥିବା ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫେଦ । କୋରୁଲିଖାଇର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ତା’ର ଅଣ୍ଟା । ତା’ର ଆକାର ଶିଙ୍ଗା-ବାଦ୍ୟ ପରି । ଆଉ ତା’ ଉପରେ ଦୁଇ କଡ଼ରୁ ଚେପ୍ଟା, ଅଳ୍ପ ଗୋଜିଆ କିରୀଟ (Casque) ରହିଥାଏ । ଅଣ୍ଟର ବର୍ଣ୍ଣ ଘନ ହଳଦିଆ କଳା । ଆଉ ଜାଣିବ କୋରୁଲି ଖାଇ ଅଳ୍ପ, ତା’ର ଇଂରାଜି ନାମ ‘ବଡ଼ ଚିରୁଲି କୋରୁଲି ଖାଇ’ (Large Pied Hornbill) । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଏନ୍ଥ୍ରାକୋସେରସ୍ ମାଲବାରିକସ୍’ (Anthracoceros malabaricus) । ଦ୍ରାବିଡ଼ ଜାତି କୋରୁଲିଖାଇର ଲୁହର ବାହାର ପାଖର ପର କଳା ଓ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଧଳା ଚିହ୍ନ ଥାଏ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଉପର କିରୀଟ ଦୁଇ କଡ଼ରୁ ଚେପ୍ଟା ନ ହୋଇ କୁବ୍ଜ (Convex) । ଏହା ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ—କୁମାଓନ୍‌ରୁ ଆସାମ-ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଧନେଶର ମାଲ ଅଣ୍ଡି ରାଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଶୁଦ୍ଧ । ବର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅଣ୍ଡି ର ଧନେଶର ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଆଯାଇଛି । ମାଲ ପକ୍ଷୀର ଆଖି ଗୁରୁପଟେ

ଥବା ପରିହାର କରି ଧଳା ।

ସବୁ କୋଚିଲିଖାଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଉପରେ ଅଧିକେ ଏକାପରି । ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜଙ୍ଗଲ, ବିଶେଷ କରି ସେଉଁଠି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଶାଖା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପରି ଜାଗାରେ ବୁଲିଥାଏ, ସେଠାରେ ରହନ୍ତି । ଏହିସବୁ ଗଛର ଫଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ । ବେଳେବେଳେ ଏଣୁଅ, ପକ୍ଷୀଶାବକ ଓ ମୁସା ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି । କୋଚିଲିଖାଇ ପକ୍ଷୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ସେମାନେ ‘ମୋ ଦଳ ପଡ଼ିବୁ ଅନୁସରଣ କର’ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏକ ବୃକ୍ଷରୁ ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷକୁ ଉଡ଼ନ୍ତି । ଏତେବେଳେ ସେମାନେ କଲରବ କରନ୍ତି ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରଜାୟିତ ଠାଣିରେ ଉଡ଼ନ୍ତି । ତାହା ହେଉଛି ଶିଫ୍ଟବେଗରେ ପକ୍ଷକୁ ଉପର ତଳ ଆଡ଼କୁ ପରି କେତୋଟି ଥର ମାରି ତା’ ପରେ ବୁଡ଼ିଲ ପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବାହତ ହେବା (glide) । ଗ୍ଲାଇଡ୍ କରବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ (Primaries) ଅର୍ଥାତ୍ ପକ୍ଷରେ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଥିବା ପର ସବୁ ଉପର ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କାଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେମାନେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ବହୁ ବିଭିନ୍ନ ପକାର ଗର୍ଜନ, ଚରଚରିଆ ଓ ଦୀର୍ଘକ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ କର୍କଶ ଚିତ୍କାରଧ୍ବନି କରିପାରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ନାଡ଼ ରଚନା ମଧ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । ବୃକ୍ଷରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଗନ୍ଧୁରଟିଏ ବାହୁ କୋଚିଲିଖାଇ ପକ୍ଷୀ ସେଥରେ ନିଜର ମଳ ଲେପି ଘର ଦିଆଯିକରେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ କରଣୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଗନ୍ଧୁରର ମୁହଁ ବୁଜି ହୋଇଯାଏ ଓ କେବଳ ବାହାରକୁ ଗୋଟିଏ ଜଳା ରହେ । ମାରି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କଲାପରେ ନିଜେ ଦିଆରି କରିଥିବା ନାଡ଼ ଭିତରେ ବସିବା ଭାବେ କଟାଏ । ସେ ସମୟରେ ଅଣ୍ଡାର ପକ୍ଷୀ ମାରିକୁ ଜଳାବାଟେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଦିଏ । ଅଣ୍ଡାରୁ କୁଆ ଫୁଟିଲେ ନାଡ଼ର କାନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ ମାରି ପକ୍ଷୀ ବାହାର ଆସେ । ତା’ ପରେ ଅଣ୍ଡାର ଓ ମାରି କୋଚିଲିଖାଇ ଉଭୟ ଆହାର ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣି ଶାବକକୁ ଖାଆନ୍ତି । ଧନେଶ ଅନିକୋଚିଲିଖାଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରି ପ୍ରଧାନତଃ ମାଟିରୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ, ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ନାଡ଼ ରଚନା କରିଥାଏ । ଅରକେ ମାରି ଧନେଶ ଦୁଇଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ । ସଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଣ୍ଡା ଧଳା; ମାରି ଉଷ୍ମ ମ ହେବା ଉପରେ ମଜଲା ହୋଇଯାଏ ।

ପିପିଫର୍ମିସ୍ (PICIFORMIS) ବର୍ଗ-କାପିଟୋନିଡ଼ି (Capitonidae) ଓ ପିପିଡ଼ି (Picidae) ପକ୍ଷୀ ବର୍ଗ ଏହି ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସିବ୍ବେଟ୍ସ (Burbets) କାପିଟୋନିଡ଼ି ବର୍ଗର ଓ କାଠହଣା (Wood Pecker) ପିପିଡ଼ି ବର୍ଗରୁ ।



ସିନ୍ଦୂର ମୁଣ୍ଡ ପକ୍ଷୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍କଳବର୍ଣ୍ଣର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବରଂ କେତେକଟା ମୋଟା ରେଦିଆ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ । ଏମାନେ ଚୂଷବାସୀ ଓ ଫଳଭକ୍ଷୀ । ଏମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ବଡ଼, ଓଜନିଆ ଓ ଅଣ୍ଟା ମଳରେ ଲମ୍ବା କଠିନ ଦୃଢ଼ରୂପେ ରହିଥାଏ । ଆମର ପରିଚିତ ସିନ୍ଦୂରମୁଣ୍ଡର (ବର୍ଣ୍ଣିତ 60) ସାଧାରଣ ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘କପ୍ପର ଧାତୁକାର’ (copper smith) ବା ‘ଗାଡ଼ ଲାଲ ଛାତିଆ ସିନ୍ଦୂରମୁଣ୍ଡ’ (crimson breasted barbet) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ମେଗାଲାଇମା ହିମାସେଫାଲା’ (Megalaïma Haemacephala) ହିନ୍ଦୀ ନାମ, ଛୋଟ ବସନ୍ତ । ଆକାରରେ ଚଟିଆଠାରୁ ଅଳ୍ପ ବଡ଼ ଓ ମୋଟା ।

ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ଘାସପରି ସବୁଜ; ଛାତି ଓ କପାଳ ଗାଡ଼ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ, ତଣ୍ଡୁଳ ହଳଦିଆ, ପେଟ ପାଖ ହଳଦିଆ ଓ ସେଥିରେ ସବୁଜବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ପନ୍ଦ ଗାର ଥାଏ । ଅଣ୍ଟା ଓଜନିଆ । ଲମ୍ବ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ତା’ର ଅଗ୍ରଭାଗ କର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲାପରି ମନେହୁଏ । ଉଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ହିତ୍ତୁକାକାର ମନେହୁଏ । ଖାଦ୍ୟ ବର, ଓଷ୍ଠ ଓ ଡମ୍ବିର ଜାଣାୟୁ ଫଳ । ଏ ଗଛସବୁ କୋଳାହଳମୟ ନଗର ବା ଜଙ୍ଗଲ କଡ଼ରେ ଥାଉ ପଛକେ ସେଠି ସିନ୍ଦୂରମୁଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏସବୁ ଗଛରେ ସିନ୍ଦୂରମୁଣ୍ଡ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନାନାଜାତି ଫଳଭୋଜୀ ପକ୍ଷୀ; ଯଥା—ବଣି (Myna), ଗୋବରା ଚଢ଼େଇ (Bulbul), ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ (Green pigeon) ଓ କୋରଲଖାର (Hornbill) ଆଦି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଠୁଲୁଅନ୍ତି । ସିନ୍ଦୂରମୁଣ୍ଡ ବେଳେବେଳେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଝଡ଼ିପୋକ ଓ ମଧ୍ (moth) ପିଛାନେଇ ସେ ସବୁକୁ ଆହାରକରେ । ସିନ୍ଦୂରମୁଣ୍ଡ ଗଛ ତାଳକୁ ବାହାର ଆସି ଉଡ଼ୁଥିବା ପୋକ ଶିକାର କଲବେଳର ଠାଣି ଦେଖିଲେ ହସ ଲାଗେ; କାରଣ ମନେ ହୁଏ ସେ ଯେପରିକି ପ୍ରହସନ କରୁଛି । ସିନ୍ଦୂରମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟୁଷ୍ଟ ପୁରୁଷର ଚୂଷବାସୀ ଓ କେବେହେଲେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନିଶ୍ଚିତ । ଏମାନଙ୍କର ଫଳ ଉଚ୍ଚ ଓ ଏକସୁରୀଆ ‘ଟୁକ୍...ଟୁକ୍...ଟୁକ୍’ । ପ୍ରତି ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ ବା ତିନିଟି ବ୍ୟବଧାନରେ ହନସାରା ସେ ଅବରମ ଭାବେ ଏଇପରି ଶବ୍ଦ କରୁଥାଏ । ଦୂରରେ କଂସାର ହନସାରା କଂସା ପିଟୁଥିବା ସହୃଦ୍ ଭୁଲନା କରି ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ‘କପ୍ପର ଧାତୁକାର’ (Coppersmith) ନାମ ଦିଅଯାଇଛି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାଧାରଣତଃ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସିନ୍ଦୂରମୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ । ସାଖରେ ଥାଇ କୌଶଳରେ ଖଜକଲେ ଦୂରରୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ବୋଲି ମନେ



ହୋଇପାରେ । ସିନ୍ଦୂରମୁଣ୍ଡି ତାଙ୍କ ଦେଲବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକଡ଼ରୁ ସେକଡ଼କୁ ଦୋହଲାଇ ଏପରିଭାବେ ଶବ୍ଦକରେ, ମନେହୁଏ ଯେପରିକି ଶବ୍ଦ ଦୂରରୁ ଆସୁଛି । ସଜନା ବା ପାଲଧୁଆ (Coral tree) ଗଛ ପରି ନରମ କାଠର ଗଛତାଳରେ ସଫି ଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ଖୋଳି ତାକୁ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ନୀଳ ଭୂମିଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚରେ ରହୁଥାଏ । ତା' ଭିତରେ କୁଟା କାଠି ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆଯାଇନଥାଏ । ମାତ୍ର ସିନ୍ଦୂରମୁଣ୍ଡି ଅରବିନ୍ଦ ସାଧାରଣତଃ ଦିନେଟି ଅଣ୍ଟାଦିଏ । ତାହା ଧଳା, ଚକ୍‌କଣ ନୁହେଁ ଓ ତା' ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିନଥାଏ ।

ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିନ୍ଦୂରମୁଣ୍ଡି ପକ୍ଷୀ ଅଛି, ତାକୁ ଇଂରାଜିରେ 'ବଡ଼ ସବୁଜ ସିନ୍ଦୂର ମୁଣ୍ଡି' (Large Green Barbet) କହନ୍ତି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ମେଗାଲାଇମା ଜିଲାନିକା' (Megalaïma Zeylanica) । ଏହା ବହୁତ ଅସ୍ଥଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହା ଅରଣ୍ୟବାସୀ । ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁଜ ହୋଇଥିବାରୁ ପକ୍ଷୀ ଆଡ଼ୁଆଳରେ ଲୁଚିଯାଏ । ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କମ୍ ଦେଖି ; ମାତ୍ର ତା'ର ସ୍ତନ ବେଶି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ । ଏହାର ଆକାର ପ୍ରାୟ ବଣି ଚଢ଼େଇ ପରି । ବର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଘାସ ପରି ସବୁଜ । ମୁଣ୍ଡ ଓ ବେକ ବାଦାମୀ । ଅଳ୍ପ ଗୁରୁପାଖରେ ଥିବା ପରହୀନ ଚର୍ମ କମଳା ଲେମ୍ବୁର ରଙ୍ଗ ପରି । ଏହାର ସ୍ତନ ଉଚ୍ଚ 'କୁଟୁ', 'କୁଟୁ' ପରି । ଅରଣ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ତନ ଅବରାମ ପ୍ରତିଧ୍ବନିତ ହେଉଥାଏ ।

ଭାରତୀୟ ଉପଦ୍ଵୀପରେ ଚଢ଼ନ୍ତି ଜାତିର କାଠହଣା ( woodpecker ) ଦେଖାଯାନ୍ତି । ବନ ରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ; କାରଣ ଗଛରେ ରହୁଥିବା ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା କୋଟଳି ( wood boring beetle ) ସବୁର ଶୁକ ( grub ) ଓ ଅନ୍ୟ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କର ଆହାର । କାଠହଣା ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଟା ବଟାଳି ପରି । ତା' ଜିଭ ଲୁମ୍ପିପରି, ଜିଭ ଆଗରେ ଜଣ୍ଟକ ଥାଏ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣଶୀଳ । ପ୍ରସାରିତ ହେଲେ ତାହା ଅଣ୍ଟାର ବହୁତ ଆଗକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିପାରେ । କାଠହଣା ତା'ର ବଟାଳିରୂପୀ ଅଣ୍ଟା ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣଶୀଳ ଜିଭ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷ ଗଣ୍ଡି ଓ ଶାଖାରେ, ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ରହିଥିବା ଲାଟ, ଶୁକ ଓ ପିଉସାକୁ ଧରି ଖାଇଥାଏ । ଆମର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାଠହଣାକୁ ଇଂରାଜିରେ 'ମହରାଟ୍ଟା କାଠହଣା' ( Mahratta woodpecker ) କହନ୍ତି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ପିକୋଇଡେସ ମହରାଟେନସିସ୍' (picoides mahrattensis) (ବର୍ଣ୍ଣିତ 61); ଉଦ୍ଭିଦ ନାମ କାଠଫୋର । ଅବଶ୍ୟ ସବୁଜାତିର କାଠହଣାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ

କାଠହଣା ଓ ହିନ୍ଦରେ କାଠଫୋରା କହନ୍ତି । ମହରଟା କାଠହଣା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ । ଏହାର ଆକାର ପ୍ରାୟ ଗୋବରା ଚଢେଇ ଆକାର ହେବ । ଅଳ୍ପ ଲମ୍ବ, ନିଦା ଓ ଗୋଜିଆ । ଲୁହ ଦୃଢ଼ ଓ କଳା ଆକାରର । ପିଠି ଉପରେ କଳା-ଧଳା ଗୁପ୍ତି ଗୁପ୍ତିଆ ଚିହ୍ନ ଥାଏ । ସେ ସବୁ କୌଣସି ଫମ ବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ନ ଥାଏ । ମସ୍ତକର ଅଗ୍ରାଂଶ ହଳଦିଆ-ବାଦାମୀ ଓ ଚୂଡ଼ା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ । ତଳ ପାଖ ଧଳା; ତା' ଉପରେ ଗୁଡ଼ ଅଂରେ ଓ କଡ଼କୁ ବାଦାମୀ ଡୋରୀଆ ଦାଗ ପଡ଼ିଥାଏ । ଉଦର ଓ ଲୁହ ତଳେ ଗାଢ଼ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ତାଳି ପରି ଚିହ୍ନ ଥାଏ । ମାଛ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମସ୍ତକ ଚୂଡ଼ାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଲାଲବାଦାମୀ ଚିହ୍ନ ନ ଥାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପହଡ଼ିବା ଦେଉଥିବା ଅଳ୍ପ ସଞ୍ଜ ଜଙ୍ଗଲ, ଆମ୍ବ କୁଳ, ଏପରିକି ଅଳ୍ପ ବୁଦା ଗଛ ଓ ଖଟବୃକ୍ଷ ଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଜାତି କାଠହଣା ବାସକରେ । ଏମାନେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଗଛରୁ ଗଛକୁ ଉଡ଼ି ଗଛ ଗଣ୍ଡିରେ ପୋକ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ବୃକ୍ଷ ଗଣ୍ଡିର ବେଶ୍ ତଳ ଅଂଶକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଫମେ ଗଣ୍ଡିର ଉପର ଆଡ଼କୁ ଧକେଇ ଚଳେଇ ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ି ଦେଇ ଦେଇ ସିଧା ବା ଘୁରୁଣିଆ ଭାବେ ଚଳାକାରରେ ଉଠନ୍ତି । ଏପରି ଓହ୍ଲାଇ ଓ ଉଡ଼ି ଗଣ୍ଡିର ଉପର ଆଡ଼କୁ ଉଠୁଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ବାଡ଼େଇ ଖଟକୁ ପଦାକୁ ବାହାର କରି ଧରି ଖାଆନ୍ତି ବା ଗଣ୍ଡିମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଥିବା ଖଟ ମାନଙ୍କୁ ଠାବକରନ୍ତି । କାଠହଣା ତା'ର କଡ଼ା ଗୋଜିଆ ଲୁହକୁ ଗଣ୍ଡି ଦେହକୁ ଗୁପ୍ତି ରଖିବା ଫଳରେ ତାହା ଦିନଗୋଡ଼ିଆ ବୈଠଙ୍ଗା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଓ ସେ ବସି ଖଟ ଶିକାର କରୁଥିଲାବେଳେ ଖସିପଡ଼େ ନାହିଁ । କୋଟଳ ଶୂଳ ( grub ) ଓ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ଫୁଲାନ ଆହାର । ଏସବୁକୁ କାଠହଣା ତା'ର ପ୍ରସାରଣୋଳି ଅଗରେ କଣ୍ଟାଥିବା କୁଣ୍ଡି, ସାହାଯ୍ୟରେ ଧରିଥାଏ । ସାଧାରଣ କାଠହଣା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସ୍ତର କର୍କଶ ଓ 'କ୍ଲିକ୍', 'କ୍ଲିକ୍' ବା 'କ୍ଲିକ୍ ରର-ରର-ରର' । ଏହାର ଉତ୍ତମ୍ବନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜାତିର କାଠହଣା ପରି । ଏହା ତରଙ୍ଗାୟିତ ଗତିରେ ଶିପ୍ରବେଗରେ ଉଡ଼େ । ଏହା ସୁଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦୂର ପକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରି ତା' ପରେ ଅଳ୍ପକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅମିବା ଫଳରେ ଏଭଳି ଉତ୍ତମ୍ବନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଭୂମିଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚରେ ସଡ଼ି ଯାଇଥିବା ତରୁଣାଖାରେ ଗାତ କରି କାଠହଣା ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ତରୁଣାଖା ଯଦି ଭୂ-ସମାନ୍ତର ଭାବେ ଥାଏ, ତେବେ ବର୍ଷା ଗୁଡ଼ରୁ ରକ୍ଷାକରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାର ତଳଆଡ଼କୁ ରହିଥାଏ । ନଡ଼ ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ସାଧାରଣତଃ କୁଟା କାଠି ଦିଆ ଯାଇ ନ ଥାଏ । ଅଳେକ ମାଛ କାଠହଣା ଦିନୋଟି ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ଅଣ୍ଟା ଚକଚକିଆ ଧଳା ଓ ପ୍ରାୟ ଗୋଲ୍‌ଲକାର ।

ମହରଟା କାଠହଣା ପରି ଆଉ ଏକ କାଠହଣା ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତାକୁ ଇଂରାଜିରେ ‘ଗୁନା ପିଠିଆ କାଠହଣା’ (Goldenbaked wood pecker) କହନ୍ତି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଡିନୋପିୟମ ବେଞ୍ଗାଲେନ୍ସ’ (Dinapodium benghalense) । ଏହା ମହରଟା କାଠହଣାଠାରୁ ବଡ଼ । ଏହାର ପିଠି ଫୁଲ୍ଲ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ଓ କଳା । ତଳପାଖ ଇଷତ୍ ପୀତାଭ ଧଳା ଓ ସେଥିରେ କଳାରେଖା ପଡ଼ିଥାଏ । ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀର ମୁଣ୍ଡର ମୁକୁଟ ଅଂଶ ଓ ପଶ୍ଚାତ୍ କପାଳ ଗାଢ଼ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ; ମାରିର କେବଳ କିଛି ଅଂଶ ଗାଢ଼ ଲାଲ । ଏ କାଠ କାଠହଣା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କୁଟୁମାନଙ୍କରେ, ବଗିଚାରେ ଓ ଅଳ୍ପ ଘଷ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ ।

ପାସାରଫରମିସ ବର୍ଗ (Order PASSERIFORMES)—ଭାରତରେ ଯେତେ ଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଏହି ପକ୍ଷିବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ବର୍ଗର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ବସାଳୀ ପକ୍ଷୀ (Perching birds) ବା ଗାୟକ ପକ୍ଷୀ (Sing birds) ବୋଲାଯାଏ । ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପକ୍ଷି ବର୍ଗ ପାସାରଫରମିସ୍ ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ବର୍ଗର ଏକ ବର୍ଗର ପକ୍ଷୀ ଅନେକଠାରୁ ଭିନ୍ନ; ମାତ୍ର ସେ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଶରୀରଗତ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ମେଳ ଦେଖାଯାଏ ; ଯଥା—ଗୋଡ଼ ଓ ପାଦର ପେଣ୍ଡା ରଞ୍ଜୁ (tendon), କରୋଟି (Skull) ଓ ତାଲୁ ଏବଂ ଶବ୍ଦିନୀ (Syrinx) ମାତ୍ରପେଣ୍ଡା । ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସନଳୀ (trachea) ର ନିମ୍ନାଂଶରେ ସ୍ୱରଜାତ ହୁଏ ତାକୁ ଶବ୍ଦିନୀ କହନ୍ତି । ପାସାରଫରମିସ ପକ୍ଷିବର୍ଗରେ କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ବର୍ଗର ଅଧିକ ପରିଚିତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଠାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଉଅଛି ।

ପିଟିଡିଡ଼ି (Pittidae) ବର୍ଗ—ନବରଙ୍ଗୀ ପକ୍ଷୀ (Pitta ବା Ant thrush) ଏହି ବର୍ଗର । ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲବାସୀ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳବର୍ଣ୍ଣର ଓ ଭୂମି ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ମଜଭୂତ । ଜଙ୍ଗଲର ଆଦ୍ର ଭୂମି ଓ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚରେ ଅଳ୍ପ ଗୁଞ୍ଜି ସେମାନେ କାଟ ଓ କୋଟଳ ଶୁଳ (grub) ବାହାର କରି ଖାଆନ୍ତି । ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଆହାର । ନବରଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ମଜଭୂତ ଓ ଲମ୍ବା । କସ୍ତୁରୀ (Thrush) ପକ୍ଷୀପରି ସେମାନେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲନ୍ତି ଓ କ୍ୱଚିତ୍ ଉଡ଼ନ୍ତି । ବିଚଳିତ ହେଲେ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ଦେଇଅଳ୍ପ ବାଟ ଉଡ଼ିଯାନ୍ତି ।

ଅବଶ୍ୟ କେତେକ ଜାତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଦୁରନ୍ତରକୁ ପରିବ୍ରଜନରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ।

ନବରଙ୍ଗୀ ( ବର୍ଣ୍ଣବିଧ 62 )—ଏହାର ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ସ୍ବରପିତ୍ତା ନବରଙ୍ଗୀ’ ( Indian Pitta ), ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ପିତ୍ତ ବ୍ରାକ୍ଚିଉରା’ (Pitta brachyura), ହିନ୍ଦୀ ନାମ—ନଡ଼ୁରଙ୍ଗ । ଏହାର ଆକାର ବଣି ଚଢ଼େଇ ପରି । ବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ୍ ଜାକ-ଜମକିଆ । ଏହା ଦେହରେ ବହୁରଙ୍ଗର ସମାହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯଥା—ସରୁଜ, ନଳ, ଘନ ହଳଦିଆ, କଳା ଓ ଧଳା । ତା’ ସାଙ୍ଗକୁ ପେଟ ଓ ଲୁହ ତଳର ବର୍ଣ୍ଣ ଗାଢ଼ ଲାଲ୍ । ଲୁହ ଥଣ୍ଡା ପରି । ପକ୍ଷର ଅଗ୍ର ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଧଳା ଅଂଶ ଉଡ଼ିଲା ବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ । ବୁଦ୍ଧିବୃଦ୍ଧିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବେଣି ଗୁଳୁ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଶୁଖିଲା ନାଳ ଓ ଗଭୀର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ନବରଙ୍ଗୀ ପକ୍ଷୀ ବାସକରେ । ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ବସତି ନିକଟରେ ଓ ଦୂରରେ ଉଡ଼ିଯୁଏ ଦେଖାଯାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୂମିଗୁରୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ବସି ରହିଯାପନ କରେ । କସ୍ତୁର ପକ୍ଷୀ ପରି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଡିଆଁ ମାରି ସେ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗତିକରେ ଏବଂ ଅଳ୍ପରେ ପଥ ଆଉଡ଼ାଇ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ବେଷଣ କରେ । ଥଣ୍ଡା ଲୁହ ଅଗ୍ରର ଧୀରେ ଓ ଇଚ୍ଛାମତେ ଉପର ତଳ ଅନ୍ତର୍ଲୀନ ହେଉଥାଏ । ଶାନ୍ତିଭଙ୍ଗ ହେଲେ ନବରଙ୍ଗୀ ଉଡ଼ିଯାଇ ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନ ତରୁଣାଖାରେ ବସେ । ଗୋଲମାଲର କାରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ପୁଣି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ବେଷଣରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ । ଏହାର ସାଧାରଣ ଡାକ ଉଚ୍ଚ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଦି-କାର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ପରି ଓ ‘ହୁଇଟ୍-ଟିଉ’ ପରି ଶୁଭେ । ପ୍ରଦୋଷ ଓ ଗୋଧୂଳ ସମୟରେ ଏପରି ଡାକ ଦିଏ । ମେଘ ତାଙ୍କୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଧମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଡାକ ଦେଇଥାଏ । ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ଓ ତଳେ ବସିଥିବାବେଳେ ଉଡ଼ିଯୁଏ ସେ ଡାକ ଦେଇଥାଏ । ପ୍ରତି ଦିନ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ଚିନି ଚାରିପରି ରବିରେ । ଏପରି ରବ ସେ ଏକାଦିକ୍ରମେ ପାଞ୍ଚମିନିଟ ଯାଏ କରିପାରେ । ରବକର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ନବରଙ୍ଗୀ ସିଧା ଉପରଆଡ଼କୁ ନିଜକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ ଓ ପାଣି ପିଇବା ଠାଣିରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଦୋଳାଏ । ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତିନି ଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷୀ ପରସ୍ପର ଡାକର ଜବାବ ଦେଇଥାନ୍ତି । ନବରଙ୍ଗୀର ନଡ଼ୁ ବଡ଼ ଓ ଗୋଲକାର । ଏହା ସରୁ କାଠି, ଘାସ ଚେର ଓ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଡିଆର ହୋଇଥାଏ । ନଡ଼ୁର ଗୋଟିଏ କଡ଼କୁ ଗୋଲକାର ପ୍ରବେଶ ପଥ ରହିଥାଏ । ଛୋଟ ଗଛର ଦୁଇଟି ନିମ୍ନ ଶାଖାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ନଡ଼ୁ ରଚିତ ହୁଏ । ବେଳେ-ବେଳେ ନବରଙ୍ଗୀ ବୁଢ଼ାମୂଳେ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟା ଦେଇଥାଏ । ଅଳ୍ପକେ ଚାରିଟିରୁ ଛଅଟି ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଚକ୍ଚକିଆ ଧଳା । ତା’ ଉପରେ ମସିଆ ବାଇଗଣି

ରଙ୍ଗର ଦାଗ, ଛୁଟା ଓ ସୁନ୍ଦର ପଡ଼ିଥାଏ ।

**ଏଲଉଡିଡ଼ା—( Alaudidae )** ବଂଶ—ଭରତ ପକ୍ଷୀ ( Lark ) ଏହି ବଂଶର । ଏମାନେ ଭୂମିରୁ ଓ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକାଠି ଦଳବାନ୍ଧ ବାସକରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ପର ବାଦାମୀ, ଧୂସର, ବାଲିରଙ୍ଗ, କଳା ଓ ଧଳା । ନାନା ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗରେ ଏପରି ଭାବେ ଝଙ୍କିତ ଯେ ଗୁରୁପାଖର ବର୍ଣ୍ଣ ସହଜ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଯାଏ ଓ ସେମାନେ ସହଜରେ ଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତିନାହିଁ । କେତେକ ଜାତିର ଭରତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଲ ଥାଏ । ସେମାନେ ଅନାବୃତ ଖୋଲଭୂମି ଓ ଗୋରୁର ଗାଈରେ ବାସ କରନ୍ତି । କେତେକ ଜାତି ଭରତ ପକ୍ଷୀ ଏ ଦେଶର ଛାୟା ବାସିନ୍ଦା ଓ କେତେକ ପରିବ୍ରାଜୀ । ଅନେକେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଗାନ କରିପାରନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍କଳ ଉଡ଼ିଲ-ବେଳେ ବା ଉପରେ ଚକକର ଦେଇ ଉଡ଼ିଲବେଳେ ସେମାନେ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି ।

**ଚୁଲିଆ ଭରତ ପକ୍ଷୀ—( ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର 63 )—**ଇଂରାଜି ନାମ ‘ଚୁଲିଆ ଭରତ ପକ୍ଷୀ’ ( Crested lark ), ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଗାଲେରିଡ଼ା କ୍ରିଷ୍ଟାଟା’ ( *Galerida cristata* ); ହିନ୍ଦି — ଚଣ୍ଡ ( ଚ ) ଲ । ଏହା ଆକାରରେ ଘରଟିଆଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼ । ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଜିଆ ହୋଇ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଚୁଲ ଉଠିଥାଏ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ । ପିଠିପାଖ ଧୂସରଆ, ମାଟିଆ ବାଦାମୀ ଓ ତା’ ଉପରେ କଳା ରଙ୍ଗର କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରେଖା ଚିହ୍ନିଥାଏ । ପେଟ ପାଖର ବର୍ଣ୍ଣ ନାଲି ରଙ୍ଗର । ଛାତି ଅଂଶରେ ତା’ ଉପରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଟିପ୍ପିପିଆ ଦାଗ ଥାଏ । ଏମାନେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବା ଗୁରୁ ପାଞ୍ଚଟି କରି ପାର୍ବବାରକ ଦଳରେ ଗୋଠ ବାନ୍ଧି ଖୋଲ ଅଳ୍ପ-ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଘାସ ଓ ଅଗଛର ବୀଜ, କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କୋଟଳି ( beetle ) ଓ ଆଉ ଆଉ ଜାତି ଏମାନଙ୍କର ଆହାର । ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଚୁଲିଆ ଭରତ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଲ ବା ପଥର ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ତରଳିଆ ସୁସ୍ପୃଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ଡାକ ଦିଏ । ତାର ସାଧାରଣ ଡାକ ପ୍ରୀତିକର ଓ ଶୁଣିବାକୁ ‘ଟି-ଉର’ । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଅଣ୍ଡିର ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଉଡ଼ି ନୃତ୍ୟଗୀତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ । ସେ ଧୀରମନ୍ତ୍ରର ଗତିରେ ପକ୍ଷ ଦୋହଲାଇ ଦୋହଲାଇ ତଳୁ ଉପରକୁ ଅଳ୍ପ କେଇ ମିଟାର ଉଡ଼ିଯାଏ; ତା’ପରେ ସୀମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟସ୍ଥାନ ଭାବେ ଉଡ଼ିବୁଲେ । ଏହାର ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ଛୁଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ତା’ର ମନମତାଣିଆ ସ୍ତରରେ ଗୀତ ଗାଉଥାଏ । ତା’ପରେ ଦୃଢ଼ଭାବେ ପକ୍ଷ ବିସ୍ତାରକରି ପକ୍ଷକୁ ଅଳ୍ପ ଆଦୋଳିତ କରି ତଳକୁ ଉଡ଼ିଆସି ତେଲ ବା ପଥରଟିଏ ଉପରେ ବସିପଡ଼େ । ଭରତ ପକ୍ଷୀ ( Skylark ) ର ସଜୀବ ଓ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସୁଲଳିତ ସ୍ବନ ଚୁଲନାରେ

ଚୁଲିଆ ଭରତ ପକ୍ଷୀର ଡାକ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବ୍ୟାପୀ ଓ ବହୁତ ନିକୃଷ୍ଣ । ତା' ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚୁଲିଆ ଭରତ ପକ୍ଷୀ ଜନପ୍ରିୟ ଓ ଲୋକେ ତାକୁ ପିଞ୍ଜରରେ ରଖି ପାଳନକରନ୍ତି । ପିଞ୍ଜରରେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ବହୁଦିନ ବଞ୍ଚେ । ଏହାର ନାଡ଼ ଗୋଟିଏ ଅଗଭୀର କପ୍ ପରି । ତାହା ଦାସରେ ଦିଆର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ତରେ କେଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଦିଆଥାଏ । ଖୋଲ ଭୂମିରେ ସାମାନ୍ୟ ନିମ୍ନସ୍ଥାନରେ ସାସ୍ତରୀୟ ବା ମାଟି ତେଲ ଆଉଁଶରେ ନାଚି ଥାଏ । ଚୁଲିଆ ଭରତ ପକ୍ଷୀ ଅଳ୍ପକେ ସାଧାରଣତଃ ଦିନ ଚାରିଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ । ଅଣ୍ଡାର ବର୍ଣ୍ଣ ମସିଆ ହଳଦିଆ, ଧଳା । ତା' ଉପରେ ବାଦାମୀ ଓ ବାଇଗଣି ରଙ୍ଗର ଛପିଛପିଆ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ।

ଭରତୀୟ ଉପଦ୍ଵୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଦୁଇଟି କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଚୁଲିଆ ଭରତ ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଚୁଲିଆ ଭରତପକ୍ଷୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଘନ ଲାଲ-ବାଦାମୀଆସିଆ । ଗୋଟିକୁ ଇଂରାଜିରେ 'ସାଇକ ଚୁଲିଆ ଭରତ ପକ୍ଷୀ' (Syke's Crested Lark) କହନ୍ତି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ଗାଲେରିଡା ଦେବ' (Gallerida deva) । ଏହାର ଛାତିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମଗାର ପଡ଼ିଥାଏ । ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚୁଲିଆ ଭରତ ପକ୍ଷୀକୁ ଇଂରାଜିରେ 'ମାଲବାର ଚୁଲିଆ ଭରତ ପକ୍ଷୀ' (Malabar Crested Lark) କହନ୍ତି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ଗାଲେରିଡା ମାଲବାରିକା' (Gallerida malabarica) । ଏହାର ବକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରେଖା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଓ ଓସାରା ।

ଦୁର୍ଗା (ବର୍ଣ୍ଣିତ 64)—ଏହାକୁ ଇଂରାଜିରେ 'ପାଉଁସିଆ ମୁଣ୍ଡ ଫିନର୍ ଭରତପକ୍ଷୀ' (Ashycrowned Finch-Lark) ଓ 'କଳା ପେଟିଆ ଫିନର୍ ଭରତ ପକ୍ଷୀ' (Black-bellied Finch-Lark) କହନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ଏରେମ୍-ଅପ୍ଟେରୋକ୍ସ ଗ୍ରିସିଆ' (Eremopterox grisea) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ—ଦିୟୋରା, ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଫୋଡ଼ହୋଲି । ଏହା ଆକାରରେ ଚଟିଆଠାରୁ ସାନ ଓ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଥାପି ବସିଥିବା ଫିନର୍ ପକ୍ଷୀ (୧) ପରି । ଅଣ୍ଡା ପକ୍ଷୀର ପିଠି ପାଖର ବର୍ଣ୍ଣ ବାଲିପରି ବାଦାମୀ; ତଳପାଖ କଳା । ଏହାର ମସ୍ତକ ପାଉଁଶିଆ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଧଳା ଓ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ । ମାଉସିଆର ଉପର ତଳ ସାରାଦେହ ବାଲିପରି ବାଦାମୀ । କର୍ଣ୍ଣ ଓ ପଡ଼ିଆ ଜମି ଥିବା ଶୁଷ୍କ ଖୋଲ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଏମାନେ ଅତି ବସିଥିବା ବେଳେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଅଥବା କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଅତି

(୧) ଫିନର୍ (Finch) ପକ୍ଷୀ ଆମେରିକାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଏମାନେ ଫ୍ରିଙ୍ଗିଲିଡ଼ି (Fringillidae) ପକ୍ଷୀ ବଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।



ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମାଟି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଶିଯାଏ । ଏମାନେ ଉଦ୍ୟମ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ି ଦେଇ ଦେଇ ବୃକ୍ଷମୂଳ ଭାବେ ଏପଟ ସେପଟ ଅଙ୍ଗାବଙ୍ଗା ପଥରେ ଆହାର ଖୋଜି ଲାଗିଥାନ୍ତି । ସାଧାରଣ , ଶ୍ୟାମ ଓ କାଟି ଦୁଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆହାର । ଏହା ଧ୍ରୁତ ବେଗରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଓ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ପକ୍ଷ ସଂଜ୍ଞାଳୀନ ନ କରି ଉଡ଼ୁଥାଏ । ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀର ସ୍ଥାନ ଅତି ମନୋମୁଖ୍ୟକର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଏହି ଗାନ କର୍ମ ଉପରେ ଗଳା ଥରାଇ ଗାଇବା ଓ ଟଣା ‘ହୁଇଚିଙ୍ଗ’ (Whuching) ସ୍ବରର ଏକ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣ । ଅଣ୍ଟିର-ପକ୍ଷୀ ତଳେ ବସିଥିଲାବେଳେ ଓ ଆକାଶରେ ଥିବା ଆକାଶ ଶୀର୍ଷ ଉଡ଼ି ଖୋଜି ଦେଖାଉ-ଥିଲାବେଳେ ଏପରି କୃତ୍ତବ୍ୟ କରିଥାଏ । ପକ୍ଷକୁ କର୍ମ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରି କରି ସେ ସିଧା ଉପର ଆଡ଼କୁ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ବାହାର ଗଲା ପରି ପ୍ରାୟ ଚରଣ ମିଟାଇ ଯାଏ ଉଡ଼ିଯାଏ । ତା’ପରେ ପକ୍ଷକୁ କଡ଼କୁ ଟାଣିଆଣି ପାହାଡ଼ିଆ ଡାଲୁ ଅଂଶରେ ଗଡ଼ିଲା ପରି କିଛିବାଟ ଉଡ଼ିଜାହାଜ ‘ନାକଡ଼ିବା’ (nose-dirve) ମାରିଲା ପରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେ । ସଂବେଗ (Momentum)ର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେ ହଠାତ୍ ଗୁଳିପଡ଼ି ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି, ତା’ କେତେଥର ଧ୍ରୁତ ବେଗରେ ପକ୍ଷ ସଂଜ୍ଞାଳୀନ କରେ, ତା’ପରେ ଡେଇଁ ଗୁଳିଦେଇ ସେ ପୁଣି ଉପରଆଡ଼କୁ କିଛିବାଟ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି ବାହାରଗଲା ପରି ଉଡ଼ିଯାଏ । ଏହି ପ୍ରବାହର ଚଢ଼ାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଉଡ଼ିଯିବା ଭାବେ ଗୁଳିପଡ଼ି ପୁଣି ‘ନାକ ଡିରା’ ଦିଏ । ଏଇପରି ସେ ବାରମ୍ବାର ନାକଡ଼ିବା ଖୋଜି ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ଉପରୁ ‘ପହାଡ଼ ପାହାଡ଼’ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେ । ଏଇପରି ଭାବେ ଆସି ଆସି ଶେଷରେ ଅବସ୍ଥାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଭୂମିରେ ଧକ୍କା ଖାଇଯିବ ମନେହେଲାବେଳକୁ ସେ ଚଟେଇ ଯାଇ ନମନାୟ ଭାବେ ବାହାର ଆସି କୁଦ ବା ପଥର ଉପରେ ଆସି ବସିଯାଏ । ପ୍ରତିଥର ଡିରା ଉଡ଼ିବାବେଳେ ସେ ତା’ର ମୁଖ୍ୟକର ‘ହୁଇଚିଙ୍ଗ’ ଧ୍ବନି କରେ । ଅବଳମ୍ବେ ପୁଣି ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୁନର୍ବାର ଅଭିନୀତ ହୁଏ । ଦୁଇ ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀ ଏହି ଆକାଶ ଖୋଜି ଅନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଲଳିତ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବାରୁ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ହୁଏ । ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପକ୍ଷୀ ଖୋଲା ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଦ ବା ଛୋଟ ବୁଦା ଆଡ଼ିଆଳରେ ଭୂମି ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ନୀଚ ଥାଳିଆ ଆକାର ଗାତରେ ସୁସ୍ଥ ସାଥ, କେଶ, ପର ଦେଇ ନୀଚ ରଚନାକରେ । ଅନେକ ସମୟରେ ଗାତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଙ୍କର ବଛାହୋଇ ତା’ ଉପରେ ସେ ସବୁ ଦିଆଥାଏ । ଥରକେ ମାଲି ଦୁଇ ଦୁଇଟିରୁ ତିନୋଟି ଯାଏ ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ଅଣ୍ଟାର ବର୍ଣ୍ଣ ଫିକା ହଳଦୁଆ ବା ଧୂସରଥା ଧଳା । ତା’ ଉପରେ ବାଦାମୀ ଓ ଫିକା ନୀଳରଙ୍ଗର

ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୁପ୍ତପିଆ ଦାଗ ଥାଏ ।

**ହିରୁନ୍ଦିନିଡ଼ା ବଂଶ (Family Hirundinidae)** — ମାର୍ଟିନ (Martin) ବା ଚଟିଆ-ବାବୁଇ ପକ୍ଷୀ ଓ ଅବାବିଲ ବା ବାବୁଇ ପକ୍ଷୀ (Swallow) ଏହି ବଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ଗୋଠ ବାନ୍ଧି ବୁଲନ୍ତି ଓ ଉପରଠାଉଣିଆ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଗୁଡ଼ିକ (Swift) ପକ୍ଷୀପରି ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଏହି ଓଡ଼ିଶାର ଛୋଟେଇ ଗ୍ରାମରେ ଏହାକୁ ଲୋକେ ଭ୍ରମବଶତଃ ଗୁଡ଼ିକ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଉଡ଼ି ଥାନ୍ତି ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ପତଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ମେଲାଇ ଧରି ଖାନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ଡେଣା ଲମ୍ବା ଓ ଗୋଜିଆ ; ମାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି । ଗୁଡ଼ିକର ଡେଣା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଧନୁ ପରି; ମାତ୍ର ମାର୍ଟିନ ଓ ବାବୁଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଡେଣା ଏଡେଟା ଧନୁପରି ନୁହେଁ । ହିରୁନ୍ଦିନିଡ଼ା ପକ୍ଷୀ ବଂଶର ଅନେକ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଦିଫାଳିଆ । ସେମାନଙ୍କର ଉଡ଼ିତାୟନ ଚଞ୍ଚଳ ଓ ମନୋହର । ଏହି ବଂଶର କେତେକ ପକ୍ଷୀ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଜନନ କରନ୍ତି । ଆଉ କେତେକ ପରିବ୍ରାଜା । ସେମାନେ ପେଲି-ଆରକ୍ଟିକ୍ (Palearctic Region) ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥାଆନ୍ତି । ଆମ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଅଧିବାସୀ ବାବୁଇ ପକ୍ଷୀ ହେଲା ଲାଲ-ନିତମ୍ବ ବାବୁଇ (ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର 65) । ଏହାକୁ ଇଂରାଜିରେ ‘ଲାଲ-ନିତମ୍ବ ବାବୁଇ’ (Redrumped Swallow) କହନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ହିରୁଣ୍ଡୋ ଡାଉରିକା’ (Hirundo daurica) । ହିନ୍ଦି ନାମ, ମସଜିଦ୍ ଅବାବିଲ । ଏହାର ଆକାର ପ୍ରାୟ ଚଟିଆ ପରି । ଲାଞ୍ଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦିଫାଳିଆ । ଦେହ ଉପର ବର୍ଣ୍ଣ ଚକଚକିଆ ଦଳ ନୀଳ-ବାଦାମୀ । ପେଟ ପାଖ ଫିକା ହଳଦିଆ-ଧଳା; ତା’ ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦଳ-ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଗାର ପଡ଼ିଥାଏ । ବେକର ପଛ ପାଖରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଏକ ଛୋଟ ପଟି ଥାଏ ଏବଂ ପିତ୍ତ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର । ଏ ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷଣରୁ ଲାଲ-ନିତମ୍ବ ବାବୁଇ ପକ୍ଷୀକୁ ଅନ୍ୟ ବାବୁଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରାଯାଇ ପାରେ । ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ଲାଲ ପିତ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ । ଏକାଧିକ ପ୍ରଜାତି ବା ବର୍ଣ୍ଣ (race)ର ଲାଲ ନିତମ୍ବ ବାବୁଇ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି । ଆମ ଦେଶର ଅଧିବାସୀ ଲାଲ ନିତମ୍ବ ବାବୁଇ ପକ୍ଷୀ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଶୀତକାଳରେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଜାତିର ଲାଲ ନିତମ୍ବ ବାବୁଇ ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି । ବହୁଦୂର ବ୍ୟାପୀ ଟେଲିଗ୍ରାଫ୍ ତାର ଉପରେ ଏମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଖକୁ ପାଖ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ପକ୍ଷୀର ପେଟ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗାର ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି ଓ ପିତ୍ତର ଲାଲ ରଙ୍ଗ ବହୁତ ଫିକା ।

ବାବୁଲ ପକ୍ଷୀ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଉଡ଼ାକାଶରେ ବା ଭୂମି ନିକଟରେ ଉଡ଼ୁଥିବାମାନ ସ୍ବଦ୍ର ଷ୍ବଦ୍ର ଜାତି ଶିକାର କରିବାରେ କଟାନ୍ତ । ପ୍ରଜନନ ଉତ୍ତୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଏମାନେ ସମାଜ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଶିକାର କରନ୍ତି । ସ୍ଵୀଫ୍ ସ୍ଵତ୍ଵ ଗୁଡ଼କ (Swift) ଓ ମାର୍ଟିନ୍ ବାବୁଲ (Martin) ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାର ଦେଖାଯାଏ । ସେମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନଳବଣରେ ବା ଆଖୁଲୁଆରରେ ବାଣେସ କରି ଜଳ ମାଡ଼ିଥିବା ନଳବଣ ବା ଆଖୁଲୁଆରରେ ରାତି ଯାପନକରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦ୍ରୁତ ଓ ସୁଦୃଶ୍ୟ । ଲୁକ୍ସ ଖୁବ୍ ବେଶି ଦିଫାଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଶିକାର ଜାତି ପତଙ୍ଗ ପିଛା ଉଡ଼ିଲବେଳେ ଘୁରୁବା ମୋଡ଼ିବାରେ ତାହା ବାଣେସ ସହାୟକ ହୁଏ । ଉଡ଼ିଲବେଳେ ବାବୁଲ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ରୁତବେଗରେ କେତେବାର ପକ୍ଷ ସଞ୍ଚାଳନ ପରେ ଭୃଷି ଭୃଷି (Glide) ଗତିରେ । ପ୍ରଜନନ କାଳରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ମିଶର ରଙ୍ଗ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ । ଲଲ-ନିତମ୍ବ ବାବୁଲ ପକ୍ଷୀର ଜଡ଼ ବନ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ର ଆକୃତିର (Retort-shaped) । ଏଥିରେ କାଦୁଅ ଲେସା ହୋଇଥାଏ । ଜଡ଼ର ମୁଖ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ନଳାକାର । ପଥର ଗୁହା, ବାସଗୃହ ବା ରସ୍ତା ଘୋଲ (Culvert)ର ଛାତ ଉତ୍ତର ପଟରେ ଜଡ଼ ମୁଖ ଲୁଚି ରହିଥାଏ । ଗୋଲକାର ଅଣ୍ଡ-କୋଠରୀ ଉତ୍ତରରେ ପର ଦିଆଯାଇଥାଏ । ସେମାନେ ଥରକେ ଦୁନୋଟି ବା ଗୁରୁଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି । ଅଣ୍ଡାର ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫେଦ । ଆଉ ଜାତିଏ ବାବୁଲ ପକ୍ଷୀ ଲଲ-ନିତମ୍ବ ବାବୁଲ ପକ୍ଷୀ ସହଜ ଶୀତଦିନେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଏହା ଗୋଟିଏ ପରିବ୍ରାଜୀ ପକ୍ଷୀ ଓ ସୁରୋପରୁ ଆସେ । ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ‘ସାଧାରଣ ବାବୁଲ ପକ୍ଷୀ’ (Common Swallow) ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ହିରୁଣ୍ଡୋରୁଷ୍ଟିକ’ (Hirundo rustica) । ଏହାର ପିଠି ପାଖର ବର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଚକିଆ ଇସ୍ପାତ୍ ବା ବାଇଗଣି-ମାଳ; ପେଟ ପାଖ ଫିକା ପାଟଳ ଧଳା । କପାଳ ଓ ତଣ୍ଡି ବାଦାମୀ । ତଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଫେଡ଼ି ବନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏକ ଓସାରୁଆ ଚକ୍ଚକିଆ କଳା ପଟି ଚନ୍ଦ୍ରଥାଏ । ଏହି ପକ୍ଷୀର ଲୁହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବେଶି ଦିଫାଳିଆ ।

ଲଟୋରା ପକ୍ଷୀ ଲନିଡ଼ି (Laniidae) ପକ୍ଷିବିଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ ‘ସ୍ରାଇକ୍’ (shrike) ବା ‘ବାତକ ପକ୍ଷୀ’ (Butcher bird) ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏ ବର୍ଗର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆକାର ସାଧାରଣତଃ ଗୋବରୁ ତଡ଼େଇ ଓ ବଣି ତଡ଼େଇ ମଧ୍ୟମରୁ ହେବ । ଏମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼; ଥଣ୍ଡ ମଜବୁତ୍, ନିଦା ଓ

ଆକ୍ରୀଣୀ ପରି ମୁନିଆଁ । ନଈ ଡାହାଣ । ଏ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଜୁଆଁର ଲକ୍ଷଣ କହିଲେ  
 ଚଳେ । ଲୁହ ଚମକିତ ( graduated ) ଅର୍ଥାତ୍ ଧାପେ ଧାପେ ସବୁ । ମାରି  
 ଅଣ୍ଟିର ଏକାପରି । ଏହି ପକ୍ଷୀ ବଂଶର ଅନେକ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା, ଶିକାର କରି  
 ଖାଇବା, ଯେତେ ଖାଇ ପାରିବେ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ମାରିବା ଓ ବଳକା ଶିକାରକୁ ପରେ  
 ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଖାଇବା ଲାଗି କଣ୍ଠାରେ ଝୁଲାଇ ରଖିବା । ଏଥିମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନଙ୍କୁ  
 'ଘାତକ ପକ୍ଷୀ' ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ । ଆମର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲତେରା ପକ୍ଷୀ ହେଲା  
 ଧଳା ଲତେରା । ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ 'ଗ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍' ( Grey shrike )  
 ବୋଲି କୁହାଯାଏ ( ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର ୫୫ ) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ଲାନିୟସ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁବିଟର'  
 ( *Lanius excubitor* ) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ, ସଫେଦ୍ ଲତେରା । ଆମର ଲତେରା  
 ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବୃହତ୍ତମ । ଆକାର ବଂଶୀ ଚଢ଼େଇର ଆକାର ହେବ । ବର୍ଣ୍ଣ  
 ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷକାରୀ ରୂପେ ଧଳା-ଧୂସର । ଲୁହ ଲମ୍ବା ଓ ତାର ବର୍ଣ୍ଣ କଳା-ଧଳା । ଅଣ୍ଟାରୁ  
 ପଛ ଆଡ଼କୁ ଆଖି ଦେଇ ଏକ ଓସାରୀଆ କଳାପଟି ପରି ରେଖା ପଡ଼ିଥାଏ । ପକ୍ଷ କଳା ।  
 ମାସ ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ଧଳା ଚନ୍ଦ୍ର ବା 'ଦର୍ପଣ' ( mirror ) ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ । ମୁଣ୍ଡ  
 ବଡ଼ । ଅଣ୍ଟା ଓଜନଆ; ନିଦା ଓ ଆକ୍ରୀଣୀ ପରି ବଜା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଦେଖିବାକୁ  
 ବାଜୁଆଁ ପରି ଭୟଙ୍କର । ଧଳା ଲତେରା ଖୋଲା ଶୁଷ୍କଭୂମିରେ ଏକାନ୍ତିଆ ବାସ-  
 କରିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଶିକାର ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଡାହାଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସେ କୌଣସି  
 ଖୋଲା ବୃଦ୍ଧା ଉପରେ ବସିଥାଏ । ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଭୂମିଆଡ଼କୁ ଝୁପଟି ଆସି ଶିକାର  
 ଉପରେ ଚଢ଼ାଇ କରେ ଓ ତାକୁ ଧରି ଫେରିଯାଏ । ବସିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଶିକାର  
 ବସ୍ତୁକୁ ଗୋଡ଼ତଳେ ଗୁପ୍ତିଧରେ ଓ ଡାହାଣ ଆକ୍ରୀଣୀ ପରି ବଜା ଅଣ୍ଟାରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି  
 ଛୁଣ୍ଟାଇ ଗିଳେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧଳା ଲତେରା ପକ୍ଷୀର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକୃତ ଶିକାର ବା  
 ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଥାଏ । ସେଠାରେ ସେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଆସି ଶିକାର କରେ ଓ  
 କେହି ଯେପରି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ ନ କରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖେ ।  
 ଲୁହ ଝୁଲିକା, ଝିଲି ଖଟ ( cricket ) ଓ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପତଙ୍ଗ, କୁକୁଲସ  
 ( Lizards ), ମୂଷା, ପକ୍ଷିଶାବକ ଓ ଦୁର୍ବଳୀୟା ପକ୍ଷୀ ଏମାନଙ୍କର ଆହାର । ବେଳେ  
 ବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧଳା ଲତେରା ଶିକାର କରେ ।  
 ଏହାର ସାଧାରଣ ଡାକ କର୍କଶ ଓ ବରତ୍ତକର; ମାତ୍ର ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଏହାର  
 ଠୁଣଠଣିଆ ସ୍ୱନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତିକର । ତାର ଏହି ସ୍ୱନ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଜାତି  
 ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱନ ମଧ୍ୟ ମିଶି ରହିଥାଏ । ଏହାର କାରଣ ଏହି ଯେ ଲତେରା ପକ୍ଷୀ ଅନ୍ୟ

ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ମନେକରି ଭାବେ ନକଲ କରିପାରେ । ମଧ୍ୟଭାଗ ଉଚ୍ଚତାରେ କଣ୍ଠାକୁଦାରେ ଏମାନେ କଣ୍ଠା, କାଠିରେ ଗଞ୍ଜୁଆ କପ୍ ଭଳି ଘନ ସ୍ୱର ବିଷ୍ଣୁ ମାଡ଼ ରଚନାକରନ୍ତି । ଭିତରେ ଛୁଣ୍ଟା କନା ଟୁକୁର, ଲେମ୍, ପକ୍ଷ କଥାଦି କୋମଳ ପଦାର୍ଥ ଦିଆଯାଏ । ଅରକେ ଚିନୋଟିରୁ ଛଅଟିଯାଏ ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । ଅଣ୍ଟାର ବର୍ଣ୍ଣରେ ବହୁତ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଅଣ୍ଟାର ବର୍ଣ୍ଣ ଫିକା ସବୁଜ ଧଳା; ତା' ଉପରେ ବାଇଗଣି-ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଛଟା ଓ ଦାଗ ଘଟିଥିବେ ଥାଏ ।

ଆମ ଭାରତରେ ଆଦୁର ଅନେକ ଜାତିର ଲତୋରା ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅତି ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ହେଲା କସ୍ତୁର ଲତୋରା । ଏହାକୁ ଇଂରାଜିରେ 'ଲଲ-ବାଦାମୀ ପିଠିଆ ଲତୋରା' ( Rufous backed shrike ) କହନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ଲାନିୟସ୍ ସାଚ୍' ( Lanius schach ) । ଏହା ଧଳା ଲତୋରାରୁ ଟିକିଏ ଘନ । ପିଠିର ନମ୍ବୁରା ଓ ପିରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଲଲ-ବାଦାମୀ । ପେଟପାଖ ସେହି ବର୍ଣ୍ଣରେ ରୁଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ପରି ମନେହୁଏ । ଏହା ଅଳ୍ପ ଶୁଷ୍କ, ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଓ ଅଧିକ ଜଳଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସକରେ ।


ହଳଦିବସନ୍ତ ଓରିଓଲିଡ଼ି ( Oriolidae ) ବର୍ଗଭୁକ୍ତ ପକ୍ଷୀ । ଆମର ଅତି ପରିଚିତ ହଳଦି ବସନ୍ତ ( Oriole ) ( ବର୍ଣ୍ଣଚିହ୍ନ 67 ) କୁ ଇଂରାଜିରେ 'କଲାମୁଣ୍ଡିଆ ହଳଦିବସନ୍ତ' ( Black headed Oriole ) ବୋଲି କହନ୍ତି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ଓରିଓଲସ୍ ଜାନ୍ଥୋରନାସ୍' ( Oriolus xanthornus ) । ହଳଦିନାମ ପାଁ(ଇ)ଲକ୍ । ଏହା ଆକାରରେ ବଣି ଚଢ଼େଇ ପରି ହେବ । ହଳଦି ବସନ୍ତ ବୃକ୍ଷବାସୀ । ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୁନା ପରି ହଳଦିଆ । ମୁଣ୍ଡ, ଡାହାଣି ବା ଗୁଡ଼ର ଉପର ଅଂଶ ହଳଦି ପଶୁ, କଳା । ପକ୍ଷ ଓ ଲମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ କଳା ଅଂଶ ଥାଏ । ଅଳ୍ପ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପାଟଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଖି ଗାଢ଼ ଲଲବର୍ଣ୍ଣ । ମାଈ ହଳଦି ବସନ୍ତର ମୁଣ୍ଡ ଫିକାସିଆ କଳା । ପକ୍ଷିଶାବକମାନଙ୍କର ଲଲଟ ହଳଦିଆ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ହଳଦିଆ ଡୋରୁଆ ଦାଗ ଥାଏ । ବନାଛନ୍ଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଳଦିବସନ୍ତ ଗୋଟିକିଆ ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲଜ୍ଜ ଓ ଅପସ୍ତ (retiring) ପ୍ରକୃତିର । ହେଲେହେଁ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଓ ଭିତରେ, ଏପରିକି ବଡ଼ ସହରର ଘୋଘା ଭିତରେ ଥିବା ଉଦ୍ୟାନର ଗହଳ ପତ୍ର ଭିତରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ପତ୍ର ଭିତରେ ଦୁଇବେଗରେ ଉଡ଼ିଗଲାବେଳେ ମନେହୁଏ ଯେପରି ହଳଦିଆ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ରେଖାଟିଏ ଭାସିଗଲା । ଏହାର ସାଧାରଣ ଡାକ ହେଲା ପ୍ରଥମେ କର୍କଶ 'ଚିଆହା' ବା 'କ୍ବାକ୍' ଓ

ତା'ପରେ ଶ୍ରୀହମଧର ସ୍ୱପ୍ନର ପରି 'ପିଲ୍ଲେ' ବା 'ପିଲ୍ଲେନ୍ନେ' । ଏହି ସ୍ଥାନ ପକ୍ଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପକ୍ଷୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମନରେ ଆହ୍ୱାନ ଆଣିଥିବ । ଫଳ ଓ ଭାଙ୍ଗିବା ଜାତୀୟ କୋଳି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଆହାର । ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବର, ଓହ୍ଲ ଓ ନାଗଫଳ ଗଛର ଫଳ ଖାଇଥାନ୍ତି । ହଳଦିବସନ୍ତ ଋତୁରେ କାଟିପତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଏ । ପାଲଧୁଆ (Erythrina) ଓ ଶିମ୍ବଲି (Salmalia) ଗଛରେ ଫଳ ଫୁଟିଲେ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ମଧୁ ଚୋଷି ଖାଆନ୍ତି । ହଳଦିବସନ୍ତର ନାଡ଼ କପ୍ ପରି ଓ ବେଶ ଗଭୀର । ଏହା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଛର ବକଳ ତଳୁରେ ଗୁଣାହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଭଲଭାବେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଜାଲର ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଇ ଥିବାରୁ ନାଡ଼ଦେଶ ନିରୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଭୂମିଠାରୁ 4ରୁ 10 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଗହଳ ପତ୍ରଥିବା ଦୁଇଶାଖା ବଣିଷ୍ଟ ବାହାରକୁ ବାହାରଥିବା ଜାଲର ଦୁଇ ଅଗରୁ ହଳଦିବସନ୍ତର ନାଡ଼ ଝୁଲୁଥାଏ । ନାବିକମାନଙ୍କର ଦୋହଲ୍ୟମାନ ଶଯ୍ୟା ଯେପରି ଝୁଲୁ ରହୁଥାଏ, ନାଡ଼ ସେହିପରି ଜାଲର ଦୁଇ ଅଗରୁ ଝୁଲୁଥାଏ । ହଳଦିବସନ୍ତ ଥରକେ ଦୁଇ ବା ତିନୋଟି ଅଣ୍ଡାଦିଏ । ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣ ପାଟଳଧଳା । ତା' ଉପରେ କଳା ବା ଲାଲ-ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନ ଥାଏ । କାଉ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୁଣୁନକାଶ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷାପାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଗଛରେ ଦାମ୍ଭିକ କଙ୍କୁଳପାତ୍ର ପକ୍ଷୀ ବସା କରୁଥାଏ ସେଇ ଗଛରେ ଯାଇ ହଳଦିବସନ୍ତ ନାଡ଼ ରଚନାକରେ । ଆଉ ଜାତୀୟ ହଳଦିବସନ୍ତ ଚଢ଼େଇ ସାଧାରଣ ହଳଦିବସନ୍ତ ସହିତ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ 'ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାତ ହଳଦି ବସନ୍ତ' (Golden Oriole) କହନ୍ତି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ଓରିଓଲସ ଓରିଓଲସ' (Oriolus oriolus) । ଆକାର ସାଧାରଣ ହଳଦିବସନ୍ତର ଆକାର ପରି ଓ ତା' ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହଳଦିବର୍ଣ୍ଣର; ମାତ୍ର ଏହାର ମୁଣ୍ଡ କଳା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହଳଦିଆ । କେବଳ ଆଖି ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ କଳା ରେଖା ଥାଏ । ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାତ ହଳଦିବସନ୍ତ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ କାଶ୍ମୀର ଓ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ନାଡ଼ ରଚନା କରିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଭାରତର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଏକ ଆଗନ୍ତୁକ ପକ୍ଷୀ ।

କଙ୍କୁଳପାତ୍ର ପକ୍ଷୀ ତାଇଡ଼ିରିଡ଼ି (Dicruridae) ପକ୍ଷୀ ବଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏମାନେ କୃଷ ଓ ବୃକ୍ଷବାସୀ । ଆକାର ଗୋବରୁ ଚଢ଼େଇ ଓ ବଣି ଆକାରର ମହାମଝି ହେବ । ବର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣତଃ ଚକ୍ଚକଣ କଳା । ଲୁଣୁ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଖୁବ୍ ବେଶି ଦିଫାଳିଆ, ନଚେତ୍ ଲୁଣୁର ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଥିବା ପରିର ଅଗ୍ରଭାଗ ଉପରଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ି



ଚିତ୍ର ନଂ 65  
ଲାଲ ନିତମ୍ବ ବାବୁଲ  
( Redrumped Swallow )  
ପୃଷ୍ଠା ନଂ 124 ଦେଖ





ଚିତ୍ର ନଂ 66  
 ଧଳା ଲଟୋରା  
 ( Grey Shrike )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 126 ଦେଖ

ଚିତ୍ର ନଂ 67  
 ହଳଦି କପଳ,  
 ( Black stet headed Oriole )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 127 ଦେଖ





ଚଢ଼ ନଂ 68

କଳକପାଳ

( Black Drongo )

ପୃଷ୍ଠା ନଂ 129 ଦେଖ



ଚିତ୍ର ନଂ 69  
ବଣି ଚଢ଼େଇ  
( Common Myna )  
ପୃଷ୍ଠା ନଂ 131 ଦେଖ






ଚିତ୍ର ନଂ 70  
ପୁକାଲିକା  
( Pied Myna )  
ପୃଷ୍ଠା ନଂ 132 ଦେଖ




ଚିତ୍ର ନଂ 71  
କାଢ଼ି  
( House Crow )  
ପୃଷ୍ଠା ନଂ 133 ଦେଖ





ଚିତ୍ର ନଂ 72  
 କରକର  
 ( Tree Pie )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 135 ଦେଖ

ଚିତ୍ର ନଂ 73  
ଜଙ୍ଗଲ ସ୍ତମ୍ଭ  
(Scarlet Minivet)  
ପୃଷ୍ଠା ନଂ 136 ଦେଖ







ଚିହ୍ନ ନଂ 74  
ପୌଷ୍ପାରି ଚଢ଼େଇ  
( Common Iora )  
ପୃଷ୍ଠା ନଂ 138 ଦେଖ



ଚିତ୍ର ନଂ 75

କନକ ତମ୍ବା

( Jerdon's Chloropsis )

ପୃଷ୍ଠା ନଂ 139 ଦେଖ



ଚିତ୍ର ନଂ 76  
 ଚୁଲିଆ ବା ଡାଲବେଳୀ  
 ( Redwhiskered Bulbul )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 141 ଦେଖ





ଚିତ୍ର ନଂ ୭୭  
 ଚମ୍ପା ବା ଗୋବରା  
 ( Redvented Bulbul )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ ୧୪୨ ଦେଖ



ଚିତ୍ର ନଂ 86  
ଶାମା  
( Shama )  
ପୃଷ୍ଠା ନଂ 155 ଦେଖ

ଚିତ୍ର ନଂ 78  
ମୁରୁଣୀ ପକ୍ଷୀ  
(Whitespotted Fantail Flycatcher )  
ପୃଷ୍ଠା ନଂ 143 ଦେଖ








ଚିତ୍ର ନଂ 79

କନକ ଚଢ଼େଇ

( Paradise Flycatcher )

ପୃଷ୍ଠା ନଂ 145 ଦେଖ



ଚିତ୍ର ନଂ 80  
 ହଳଦି-ଅଖିଆ ବୁଣ୍ଡାଆଇ  
 ( Yellow-eyed Babbler )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 147 ଦେଖ



ଚିତ୍ର ନଂ 81  
 ସାତବାସୀ ବା କୁଣ୍ଡାଶାଳ  
 ( Jungle Babbler )  
 ପ୍ରାୟ: ନଂ 1.48 ଦେଖ



ଚଢ଼ି ନଂ ୮୨  
ଇଲି ଇଲି  
( Common Babbler )  
ପୃଷ୍ଠା ନଂ ୧୪୯ ଦେଖ





ଚିତ୍ର ନଂ 83  
 ଟିକି ଚଢ଼େଇ  
 ( Ashy Wren-Warbler )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 151 ଦେଖ

ହୋଇଥାଏ । କେତେକ ଜାତି କଙ୍କୁଳପାତି ପକ୍ଷୀର ଲୁହର ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଥିବା ପର ପର ଆଡ଼କୁ ଅନାବୃତ୍ତ ଶରପରି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ତାର ଶେଷାଂଶ ବାଡ଼ମିଶ୍ରଣ ର୍ୟାଙ୍କେଟ୍ ପରି ଓହାରିଥାଏ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଆମର ସବୁଠାରୁ ପରିଚିତ କଳମପାତି (ବର୍ଣ୍ଣିତ 63)କୁ ଇଂରାଜୀରେ ‘କଳା କଳମପାତି’ (Black Drungo) କହନ୍ତି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଡାଇକ୍ଟରୁସ ଏଡ୍‌ସିମିଲିସ୍’ (Dicrurus adsimilis), ହିନ୍ଦୀ ନାମ—ଗୁଜଙ୍ଗା, କୋଡ଼଼ୁଲା । ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ କଳମପାତି କଙ୍କୁଳପାତି, ଗୁହୁଆ, କାଉଟିଆ ଓ ଠେଙ୍ଗା ନାମରେ ପରିଚିତ । ଏହା ଗୋଟିଏ କୃଶ ମାଂସ ଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରକୃତିର ପକ୍ଷୀ । ଦେହ ଚକଚକିଆ ଯିଏଣୁ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ । ଆକାର ଗୋବରା ଚଢ଼େଇ ଆକାର ହେବ । ଲୁହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦିମ୍ବାଳିଆ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଖୋଲି ଭୂମି ଓ ଗୁପ୍ତ ଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଡ଼ ଖୁଣ୍ଟି, ବୁଦା ଉପରେ ବା ଟେଲିଗ୍ରାଫ ତାର ଉପରେ ବସି ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଏ ସମୟରେ ଭୂମି ଉପରେ କୌଣସି ଅସଦ୍‌ଚର୍ଚ୍ଚ ଝିଲ୍‌କା ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲମାନେ ତଳକୁ ଉଡ଼ି ଝାମ୍ପି ମାରେ । ତଳେ ସେଇଠି ତାକୁ ଖାଏ, ନଚେତ୍ ଗୋଡ଼ରେ ଧରି ବସିବା ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଥାଏ । ସେଠାରେ ତାର ଆକୃଷ୍ଟୀ ପରି ଫାନ୍ତ ଥଣ୍ଡରେ ଭୁଣି ଗିଲେ । କଳମପାତି ମଧୁ (ପ୍ରଜାପତିମାନଙ୍କର ଛାତି) କଙ୍କି ଓ ଝଡ଼ିପୋକ ଉଡ଼ୁଥିଲାବେଳେ କନକ ଚଢ଼େଇ (Fly catcher) ପରି ତାଙ୍କ ପିଚ୍ଛା ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଧରେ । ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନେ ଲଙ୍କାସ୍ଥାନ ଦୟାବୃଦ୍ଧିଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି । କଳମପାତି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ, ଏପରିକି ସମୟ ସମୟରେ ତା’ଠାରୁ ଆକାରରେ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ପକ୍ଷୀକୁ ଶିପ୍ରବେଗରେ ଓ ନରୋଡ଼-ବନ୍ଧା ଭାବେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଘଉଡ଼ାଏ । ଫଳରେ ସେମାନେ ଆହାରକୁ ପକାଇ ଦେଇ ପଳାଇଯାନ୍ତି ଓ କଳମପାତି ଗୁଣ୍ଡାଗିରିଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତକରି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକରେ । ଅନେକ ସମୟରେ କଳମପାତି ଗୋ-ମହପାତି ଗୃହପାଳିତ ତୃଣଭୋଜୀ ପଶୁ ଚରୁଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ପିଠି ଉପରେ ବସେ । ସେମାନେ ଗୁଲିଗଲାବେଳେ ପଡ଼ିମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଡେଇଁ ବା ଉଡ଼ି ପଳାଇଯାନ୍ତି । କଳମପାତି ହଠାତ୍ ପଶୁମାନଙ୍କର ପିଠି ଉପରୁ ଉଡ଼ି-ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଥାଏ । ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଘାସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ କଳମପାତି ଚଢ଼େଇମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚୁଣ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ଓ ପ୍ରାଣବିକଳରେ ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ଖାଆନ୍ତି । ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁଗଲେ ସେମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁଳ ନିଡ଼ିକାଳି ଜାତିପରିମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯାନ୍ତି ଓ କୃଷକର ଅଳଙ୍କାର ବହୁ

ଅଟନ୍ତି । ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାରର କର୍କଶ ଉଚ୍ଚତ ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନା କଲପରି ଡାକ ଅଛି । କେତେ କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଡାକ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସିଂହ ବାଜ (Shikra Hawk)ର ଡାକପରି ଶୁଣାଯାଏ । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ କଜଳପାତିମାନେ ବେଶି କଲରବ କରନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ମଢ଼ କସ୍ ଆକାରର । ମଢ଼ର ତଳ ଅଗ୍ରଭାଗ । ଏହା ସୂକ୍ଷ୍ମ କାଠି ଓ ସାସରେ ବୁଡ଼ିଆଣୀ ଜାଲଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଗୃଷ୍ମ ଜମିରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଗଛରେ ଫିଦାକୁ ବାହାର ରହୁଥିବା ଦୁଇ ଶାଖାବିଶିଷ୍ଟ ଡାଳରେ ବସା ଦିଆର ହୋଇଥାଏ । ପୁଣି ଯେଉଁଠି ଶାଖା ଦୁଇଟି ବେଶି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ନଥାଏ, ସେପରି ଶାଖା ଦୁଇଟିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ମଢ଼ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର କାରଣ ଏହି ଯେ ସେଠାରୁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ନଜର ଦେଇହେବ । ଅରକେ କଜଳପାତି ତିନିଟିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଯାଏ ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ଅଣ୍ଟା ଧଳା ଓ ତା’ ଉପରେ ବାଦାମୀ-ଲୁଲ ରଙ୍ଗର ଛଟା ପଡ଼ିଥାଏ । ମଢ଼କୁ ଜଗିଥିବା ସମୟରେ କଜଳପାତିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି । ମଢ଼ ଥିବା ଗଛ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ କଜଳପାତି ଚିଲ ଓ କାଉ ପ୍ରଭୃତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକରି ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଏ । ଏ ପ୍ରକାରେ ଆଶ୍ରୟ ମିଳୁଥିବାରୁ କପୋତ ଓ ହଳଦୁ-ବସନ୍ତପରି ଅନେକ ନରମ ସ୍ୱରାବର ପକ୍ଷୀ ଅନେକ ସମୟରେ କଜଳପାତି ବସା କରିଥିବା ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧନ୍ତି ।

ଆଉ ଦୁଇଟି ଜାତି କଜଳପାତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ସେମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜରେ ‘ପାଇଁ ଶଆ କଜଳପାତି’ (A shy drongo) ଓ ‘ଧଳାପେଟିଆ କଜଳପାତି’ (white breasted drongo) କୁହାଯାଏ । ପ୍ରଥମଟିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଡାଇକ୍ରୁରସ୍’ ‘ଲିଉକୋଫେଇଆସ’ (Dicrurus leucophaeus) ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଡାଇକ୍ରୁରସ୍ କେରୁଲେସେନସ’ (Dicrurus caerulescens) । ପାଇଁଶିଆ କଜଳପାତିର ବର୍ଣ୍ଣ ଶିଳଟପରି ପାଇଁଶିଆ କଳା । ଏହାର ଅଖି ଯଦୁରାଗ ମଣି (Ruby) ପରି ଲୋହବର୍ଣ୍ଣ । ଖୋଲ ଜାଗା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଧଳାପେଟିଆ କଜଳପାତି ଆକାରରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ତୁତ । ଏହାର ପିଠିପାଖର ବର୍ଣ୍ଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନଳ-ଧୂସର । ପେଟର ବର୍ଣ୍ଣ ଧଳା । ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପହଞ୍ଚିତା ଦେଉଥିବା ଜଙ୍ଗଲ-ଅଳରେ ବିଶେଷ କରି ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲ ମଣି ରହୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲଅଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ଗୋଲ୍‌ପି ମଇନା (Starling) ଓ ବଣି (Myna) ଖୁରନ୍‌ଡ଼ (Sturnidae) ବଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ବଂଶର ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ହେଲେ ବଣିଚଢ଼େଇ । ଏହାକୁ ରାଜବଣି ଓ ରାଜ ମଇନା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି । ଇଂରାଜି ନାମ ‘ସାଧାରଣ ମଇନା’ (Common Myna) (ବର୍ଣ୍ଣବନ୍ଧ 69) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଏକ୍ରିଡୋଥେରସ୍ ଟ୍ରିଷ୍ଟିସ୍’ (Acridotheres tristis) । ହିନ୍ଦି ଦେଶୀ ମୈନା । ଏହାର ଆକାର ଗୋବରା ଡଢ଼େଇ ଓ ପାରା ମହାମଝି ହେବ । ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 23 ସେ. ମି. । ବଣି ଆମର ଏକ ଅତି ପରିଚିତ ପକ୍ଷୀ । ଦେଖିବାକୁ ଫଟଫଟ, ଡିଉଲ୍-ଡାଉଲ୍, ତାଜା ଚଢ଼େଇଟିଏ । ରଙ୍ଗ ବାଦାମୀ, ମୁଣ୍ଡ କଳା; ଗୋଡ଼, ଥଣ୍ଡ ଓ ଆଖି ଗୁରୁପଟେ ଥିବା ନଗ୍ନ ଚର୍ମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ । ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ପକ୍ଷରେ ଧଳା ଚିହ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ । ଘରଟିଆ, କାଉ ଓ ପାରା ପରି ବଣି ଚଢ଼େଇ ଜନବସତି ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଭୟରେ ବାସ କରେ । ଜନାଗଣଙ୍କୁ ଧୂମ୍‌ଧାମ୍ ନଗର ଅବା ପକ୍ଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଡିହବାଡ଼ି ହେଉ ସେଥରେ ତା’ର କିଛି ଯାଏଥାସେ ନାହିଁ । ଏହା ସ୍ୱଭାବତଃ ସାମାଜିକ ଓ ପୁରାପୁର ସଂଗଠନୀ । ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ବାସକରିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟି ଗୁଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ । ସାଧାରଣତଃ ଏକ ବା ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ବଣି ଗୋଟିଏ ଘର ବା ଘରଡ଼ିହକୁ ନିଜର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ ଅନ୍ୟ ଅନାହୁତ ପ୍ରବେଶକାରୀ ବଣିମାନଙ୍କ ସହିତ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି; ମାତ୍ର ବଗିଚାରେ ଯଦ୍ୟା ପାଣି ଦିଆଯାଇଥିଲେ ଜିଆଖାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷାପିନ୍ଧୁ ମାଟିରୁ ଝଡ଼ିଯୋକ ବାହାରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଥବା ବର ଓସ୍ତ ଗଛରେ ଫଳ ଧରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମେଲ ବାନ୍ଧି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି । ବଣିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପୋକଙ୍କୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚରୁଥିବା ଗୋମହୁଣ୍ଡାଦି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପିଛା ନେଇଥାନ୍ତି ଓ ଲଙ୍ଗଳରେ ଗୁସ୍ ହେଲାବେଳେ ପଛେ ପଛେ ଯାନ୍ତି । ଗୁହ୍ମପାଲିତ ପଶୁ ଚରୁ ଚରୁ ଗୁଲିଗୁଲିବେଳେ ଝିଲି ଖାଟ ଓ ଝିଣ୍ଟିକା ଏଣେତେଣେ ଡେଇଁ ପଳାନ୍ତି ଓ ବଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଖାଆନ୍ତି । ସେ ସମୟରେ ବଣି ଗାଈ, ବଳଦ କଡ଼େ କଡ଼େ ବାହାଡ଼ିମୂର ସହକାରେ ଲୁଚି ଛପି କେତେବେଳେ କଡ଼ ପଟିଆ ଡେଇଁ କେତେବେଳେ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ାଦେଇ ପଳାୟମାନ ଶିକାରକୁ ଧରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ । ସେହିପରି ଲଙ୍ଗଳ ଗୁଲିହେଲାବେଳେ ପୋକ ଜୋକ, କୋଟଳି ଶୁକ (grub) ଆଦି ବାହାର ପଡ଼ନ୍ତି ଓ ବଣି ସେ ସବୁକୁ ସଂଗ୍ରହକରି ଆହାର କରେ । ବଣିମାନେ ଦଳବାନ୍ଧ ବୃକ୍ଷଶାଖାରେ ଶୁଆ ଓ କାଉମାନଙ୍କ ସହିତ ରାନ୍ଧି ଯାପନ କରନ୍ତି । ବଣି ଉଦ୍‌ୟରେ ନାନାଦି କସମର ଡାକ୍ଷଣ କିରମିର ଶବ୍ଦ କରେ ।

ଗୋଟିଏ ପରିଚିତ ଗାଳିକରବାପର ଶବ୍ଦ ହେଲା ‘ରଡ଼ିଓ-ରଡ଼ିଓ-ରଡ଼ିଓ’ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଉତ୍ସାହ ସମୟରେ ଛାଇ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଅଣ୍ଟି ରା ବଣି ଦେହର ପରକୁ ଚୁକ୍ତିଭାବେ ଫୁଲାଇ ହାସ୍ୟକରତାରେ ମାରିବଣି ଆଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପର ତଳି କରି ‘କିକ-କିକ-କିକ, କୋକ୍-କୋକ୍-କୋକ୍-କୋକ୍, ଚୁର୍-ର୍-ଚୁର୍-ର୍’ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ-କରେ । ଗଛର ଗର୍ଭି, ବ୍ୟବହୃତ ଓ ଅବ୍ୟବହୃତ ଘର କାନ୍ଥର ଗର୍ଭି ଓ ଛାତରେ ବଣି, କୁଟା, କାଗଜ ଟୁକୁର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରା ଭର୍ତ୍ତିକରି ମାଡ଼ ରଚନାକରେ ୍ ମାରି ବଣି ଥରକେ ଟାଟି ଅଣ୍ଟା ଘିଏ । ଅଣ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଚକ୍ ଚକ୍ ମାଳ । ତା ଉପରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନଥାଏ ।

ରାଜବଣିପରି ଆଉ ଜାତିଏ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ବଣି ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖି ବଣି ବୋଲି କହନ୍ତି । ଏହାର ଇଂରାଜି ନାମ ‘କଲବଣି’ (Bank Myna) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଏକ୍ରିଡୋଥେରସ୍ ଜିଂଗିନିଆସ୍’ (Acridotheres ginginianus) । ଏହି ପକ୍ଷୀ ପାକିସ୍ଥାନ ଏବଂ ଭାରତର ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ଗୁଜରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏକ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ରେଳଷ୍ଟେସନ-ମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ବାଦାମୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଫିକା ମାଳ ଧୂସର । ଆଖି ଗୁରୁପଟେ ଥିବା ପରସ୍ତାନ ଚମଡ଼ା ଅଂଶର ବର୍ଣ୍ଣ ହଳଦିଆ ନ ହୋଇ ଇଟାପରି ଲାଲ । ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମଇନା ହେଲା ଘୁଙ୍ଗାଳିକା (ବର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର 70) । ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ । ଏହାକୁ ଇଂରାଜିରେ ‘ପିଡ଼ ବରିଡ଼ ମଇନା ପକ୍ଷୀ’ (Pied Myna) ବୋଲି କହନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଷ୍ଟର୍ନୁସ୍ କନ୍ତ୍ରା’ (Sturnus Contra) । ହିନ୍ଦି ନାମ ଅବଲକ୍ ମଇନା, ସିରୋଲ୍ ମଇନା । ଏହା ରାଜବଣିଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଛୋଟ । ଦେଖିବାକୁ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ବର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଓ କଳା । ଆଖି ଗୁରୁପଟେ ଥିବା ପରସ୍ତାନ ଅନାବୃତ ଚମଡ଼ା କମଳା ପରି ହଳଦିଆ । ଅଳ୍ପ ଗାଡ଼ ବର୍ଣ୍ଣ, କମଳା ପରି ଗାଡ଼ ହଳଦିଆ । ଏମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଗ୍ରାମ ଓ ଗୁପ୍ତ ଜମିମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ହତା ଓ ବଣିଗୁରେ ବିଶେଷ କରି ପାଣି ଦିଆ ହୋଇଥିବା ବଣି ଗୁକୁ ଆସି ଜିଆ ଖୋଳି ଓ ଝିଞ୍ଜିକା ଧରି ଖାନ୍ତି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥସିବା ଗଛତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି । ହେଲେ ହେଁ ଏମାନେ ରାଜବଣି ପରି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ସେତେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହନ୍ତି ଓ ବାସଗୃହରେ ମାଡ଼ ରଚନା କରନ୍ତିନାହିଁ । ରାଜବଣି ପରି ଘୁଙ୍ଗାଳିକା ସଂଭୁକ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ରାଜବଣିଠାରୁ ଅଧିକ ବେଶି ଶାନ୍ତ ଓ ନୀଳ ଖାଏ । ଏମାନେ ବଣି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଗହଳ ଦଳବାଳ



ସହର ଓ ନଗର ବାହାରେ ମଇଳା ଗଦାମାନଙ୍କରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି । ଗାଁ ପୋଖରୀ କଳରେ ଓଦାମାଟିରେ ହୋଇଥିବା ଘାସକୁ ଗାଈ ଚରାଏ । ସମୟରେ ଘୁକାଲିକା ତାଙ୍କ ପିଛାରେ ପଡ଼ି ଖାଇଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର କଲରୁ କରନ୍ତି । ଏହି ଶବ୍ଦରୁ କେତେଟି ଦୃଶ୍ୟ (Black bellied Finch-Lark) (ଦେଖ) ଚଢ଼େଇର ଉଡ଼ିଲାବେଳର ଗୀତରୁ ଏଠିକେ ସେଠିକେ ଅଣାଯାଇଥିବା ପରି ମନେହୁଏ । ଘୁକାଲିକାର ମଞ୍ଜୁ ଅଧିକାଂଶ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ମଞ୍ଜୁଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ । ଏହା ବେଶ୍ ବଡ଼, ଗୋଲକାର ଓ ଅସୁରୁର । କାଠି, ପଟ, ଘାସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଇଳା ଜିନିଷରେ ଏହା ଚିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଗ୍ରାମ ବା ଖେତ ନିକଟରେ ଥିବା ଆମ୍ବ, ଶିଶୁ ବା ସେହପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଛର ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବା ଡାଳରେ ବସା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଦିନ-ଭୁଲେଟି ବସା ଥାଏ । ଘୁକାଲିକା ଧରକେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ । ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ଚକଚକିଆ ମଳ, ତା' ଉପରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ପଡ଼ି ନଥାଏ ।

**ତଲେର ପକ୍ଷୀ**—ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ‘ଗୋଲ୍‌ପି ଯାଜକ’ (Rosy Pastor) ବା ‘ଗୋଲ୍‌ପି ମଇଳା’ (Rose coloured starling) ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ, ‘ଷ୍ଟରନାସ ରୋଜିଆସ’ (Sturnus roseus) । ଏହା ଗୋଟିଏ ମଇଳା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାକୁ ଘୁକାଲିକା ବୋଲି ଭ୍ରମ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ । ଶୀତ ଋତୁରେ ଏମାନେ ଭାରତକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ପରିବ୍ରଜନରେ ଆସନ୍ତି । ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ କଳା-ଗୋଲ୍‌ପି-ପାଟଳ (କଳା-ଧଳା ନୁହେଁ) । ଏହାର ଆକାର ଘୁକାଲିକାର ଆକାର ହେବ । ଏ ଦୁଇ ଜାତି ପକ୍ଷୀ ଏକ ପ୍ରଜାତି (genus) ଓ ଏକ ବଂଶ (Family)ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ତଲେର ପକ୍ଷୀ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ପାରିଥିବା ଜହ୍ନା (Jowar) ଯେତେ ଏବଂ ପାଲ୍ୟୁଆ ଓ ଶିମୁଳି ଗଛର ବଡ଼ ଲାଲ ଲାଲ ଫୁଲ ଉପରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାନ୍ତି ।

**କାଉ କରଭଡ଼ି (Corvidae)** ବଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଗ୍ରାମରେ, ସହରରେ ସର୍ବତ୍ର କାଉ ବା ପାତିକାଉର ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ । ସହଜ ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ । ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ‘ହର କାଉ’ (House crow) (ବର୍ଣ୍ଣଚିହ୍ନ 71) ବୋଲି କହନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘କରଭସ ସ୍ପେଲେନ୍‌ସ’ (Corvus Splendens) । ହିନ୍ଦି ନାମ କୋଉଁ, ଦେଖି କୋଉଁର ବେକ ପାଉଁଶିଆ । ଜାମରାକାଉ (Jungle crow) ହି ପଣ୍ଡ କଳା ଓ ପାତିକାଉଠାରୁ ଅଳ୍ପ ବଡ଼ । ଭାରତରେ ଯେତେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ

ମଧ୍ୟରେ ପାତକାଉ ସବୁଠାରୁ ବେଶି ସାଧାରଣ ଓ ପରିଚିତ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ 'ସହର-ବାସୀ', ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନୁଷ୍ୟ ସହଜ ସହକ୍ଷେମ (Commensal) ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ଅଙ୍ଗଭୂତ କହିଲେ ଚଳେ । ଏହା ଚତୁର ଓ ଦାମ୍ଭିକ । ତା' ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ତ୍ରୀଠାରେ ବିପଦ ବାରିବା ଓ ବିପଦକୁ ଆଡ଼େଇବାପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଫଳରେ ଏହା ବିଜୟୋତ୍ସାହରେ ଅପରାଧ ଓ ଦୁଷ୍ଟତା କରି ଚାଲିଥାଏ । ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ସବୁପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତା କରିପାରେ । ଭୁମି ଉପସ୍ଥିତରେ, ଭୁମି ଆଖି ଆଗରେ ସେ ପ୍ଲେଟରୁ ଅଣ୍ଟା ବା ପାଉଁରୁଟି ନେଇ ପଳାଇଯିବ, ମଲ ମୁଣାଟାଏ ବା ରୋଷାଇ ଘର ଭିତରୁ ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ଘେନି ଚାଲିଯିବ, ମାଛ ବିକାଳ ହୃଦ୍ଵାତ୍ତ ହୃଦ୍ଵାତ୍ତ ତା' ବାଉଁଶିଆରୁ ମାଛଟାଏ ନେଇ ଚାଲିଯିବ । କାଉ ମୁନସିପାଲଟିର ମଲଲା ସଫାକାର ପକ୍ଷୀରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ତା'ର ଏହି ସବୁ ଚୌରୀ-ପ୍ରବୃତ୍ତି-ଜନିତ ଅପରାଧ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ଧରାଯାଏ । ସେ ଯାହାହେଉ, କାଉ ଉଦ୍ୟାନବାସୀ ନିଶ୍ଚୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଚନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷୀ ଓ ଗାୟକ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଉପରେ ଅବିରତ ରହୁଥିବା କି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରେ । ଏଣୁ ଉଦ୍ୟାନମାନଙ୍କରେ କାଉ ଗୋଟିଏ ଅବାସ୍ଥିତ ପକ୍ଷୀ । ତା' ଛାଡ଼ି ବକପକ୍ଷୀଶାଳା (heronry) ମାନଙ୍କରେ କାଉ ବଡ଼ ଉପାତ କରନ୍ତି । ଦଳ ଦଳ ହୋଇ କାଉ ପକ୍ଷୀଶାଳା ଚାରିପଟେ ଲୁଣ୍ଠିତହୁଥାନ୍ତି । ଦରକାରମାନଙ୍କଦ୍ଵାରା ହୃଦ୍ଵାତ୍ତ ବଗ ମାଡ଼ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ କାଉ ଝାମ୍ପି ଅଣ୍ଟା ନେଇ ପଳାଇଯାନ୍ତି, ନଚେତ ଶାବକଗୁଡ଼ିକୁ ନିଦ୍ରାସ୍ଥରେ ମାରପକାନ୍ତି । ପଙ୍ଖପାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ପତଙ୍ଗ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଉଡ଼ୁଥିବାବେଳେ କାଉମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଆନ୍ତି । ହେଲେହେଁ, ସେମାନେ ପାଚିଲା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଗହମ, ମକ୍କା ଆଦି ଶସ୍ୟ ଓ ଫଳ ବଗିଚାର ବେଶି କ୍ଷତି କରନ୍ତି । ଏଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନେ ଉପକାରୀ କି ଅପକାରୀ ସେ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି । ପାତକାଉ ସାଧାରଣତଃ ଭୂମିଠାରୁ ତଳରୁ ଆଠ ମିଟାର ଉଚ୍ଚରେ ବୃକ୍ଷ ଶାଖାରେ ମାଡ଼ ରଚନାକରେ । ଏହା ଛୋଟ ମଞ୍ଚାପରି ଓ ଅସୁବୁର । ମଞ୍ଚାର ମଝି ଅଂଶ ଖାଲୁଆ ହୋଇଥାଏ । ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ କତା, ସୂତା, ଦଉଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆଥାଏ । କାଉ ଥରକେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ଅଣ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ଫିକା ମାଲ-ସବୁଜ । ତା ଉପରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଛଟା ଓ ଗାର ପଡ଼ିଥାଏ । ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଅବିକଳ କୋଇଲି ଅଣ୍ଟା ପରି ଦେଖାଯାଏ । କୋଇଲି ସାଧାରଣତଃ କାଉ ବସାରେ ଆସି ଅଣ୍ଟା ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ ।

ଡାମରା କାଉ—ଏହାକୁ ପଦ୍ମିଆ କାଉ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି । ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ଜଙ୍ଗଲିଆଁ କାଉ’ (Jungli crow), ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘କରଭସ ମାକୋରହିନ୍‌କସ’ (corvus microrhynchus) । ଏହା ପାତି କାଉଠାରୁ ଆକାରରେ ବଡ଼ । ବର୍ଣ୍ଣ ଚକଚକିଆ ହିଁସଣ୍ଟ କଳା । ଥଣ୍ଡା ପାତିକାଉର ଥଣ୍ଡାଠାରୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ୍ । ଏହାର ରାବ୍ ପାତିକାଉର ରାବଠାରୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ଓ କର୍କଶ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପତ୍ତୀ ଓ ଯହରଠାରୁ ଦୂରରେ ବାସକରେ; ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଆସି ମନୁଷ୍ୟ ବସନ୍ତ ଉପକଣ୍ଠରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକରେ । ଉପାନ୍ତ ପତ୍ତୀତ୍ରୟ ଓ ବାହାରେ ଜମା ହେଉଥିବା ଅଳ୍ପ ରାଜିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ।

କାଉର ଏକ ମାର୍ଜିତ ପ୍ରାଣିକର ଜାତି ହେଲା କରକର । (ବର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର 72) । ଏହାକୁ କେରକେରା ଚଢ଼େଇ ଓ ହାଡ଼ଚଞ୍ଚି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି । ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ଗଛ ପିଠା’ (Tree Pie) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଡେନ୍‌ଡ୍ରୋସିଟା ଭାଗାବୁଣ୍ଡା’ (Dendrocitta vagabunda) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ ମହାଲତ୍ । ଏହାର ଆକାର ପ୍ରାୟ ବଣି ଚଢ଼େଇର ଆକାର ହେବ; ମାତ୍ର ଏହାର ଲମ୍ବତା ଲମ୍ବା ଓ 30 ସେ. ମି. ଯାଏ ଲମ୍ବା । କର-କର ବର୍ଣ୍ଣ ବାଦାମୀ, ମୁଣ୍ଡ ଓ ବେକ ଧୂଆଁ ଟିଆ । ଲମ୍ବ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା, ପରର ଅତ୍ୟାଂଶ କଳା । ପକ୍ଷର ପରମୂଳ ଅଂଶ ଧୂସର । ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ଏସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ । ଅଳ୍ପ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଖୋଲା ଜଙ୍ଗଲରେ କେରକେରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ପକ୍ଷୀ । ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଏକାଠି ମିଶି ଚାଲିଚାଲି କରନ୍ତି ଓ ନିଜନିଜ ଉଡ଼ରେ ବିରକ୍ତକର ଉଡ଼ କର୍କଶ ସ୍ଵରରେ ‘କିଉ-କିଉ-କିଉ-କିଉ-କିଉ’ ଇତ୍ୟାଦି ରାବ କରି କଥାବସ୍ତା ହୁଅନ୍ତି । ‘ମୋ ନେତା ଯୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଯିଆଡ଼େ’ (Follow-my-leader) ନୀତି ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ପଛେ ପଛେ ଏକ ତାଳରୁ ଅନ୍ୟ ତାଳକୁ ଯି ପ୍ର ଚରଙ୍ଗାୟିତ ଗତିରେ ଉଡ଼ିଯିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ଏମାନେ କିଛି ସମୟ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରନ୍ତି, ତା’ପରେ ପକ୍ଷ ଓ ପୁଣି ବିସ୍ତାରକରି ଧିରେ ଧିରେ ପବନରେ ଭସିଯାନ୍ତି । କର୍କଶ କିଶର ମିଶି ସାଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଶ୍ରୁତିମୟ ରାବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ପୁନଃ ପୁନଃ ଉଚ୍ଚାରଣ କାକଲି ହେଲା ‘ବବ୍-ଓ-ଲିଙ୍ଗ’ ବା ‘କୋକଲ’ । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀ ମାରି ପକ୍ଷୀକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାପାଇଁ ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକାରୀ ଭଙ୍ଗୀରେ ଲମ୍ବକୁ ନୁଆଁଇ, ପିଠିକୁ ଧନୁପରି ବଙ୍କାଇ, ପାଉଁଶ୍ୟ ପାଣିରେ ଥଣ୍ଡା ବୁଡ଼ାଇଲ ପରି ଠାଣିରେ ମୁଣ୍ଡ ଦୋହଲାଇ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ କରିଥାଏ । କରକର

ପକ୍ଷୀ ପେଟ ଭରି ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଫଳଭୋଜୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହୃଦୟ ବର ଓ ଓହ୍ଲ ଗଛରେ ଆସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଜୀବ କାଳମାନଙ୍କ ପରି କେରକେର ସବୁଜ ଓ ସହମାଂସ ଖାଇବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଫଳ ଓ କୋଳି ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଜାଟପତଙ୍ଗ, ସିଂବାଳୁଆ, ଏଣୁଥ, ପକ୍ଷି-ଶାବକ ଏବଂ ଗ୍ରେଟ ମୁଷା । ସେମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନାଡ଼ ଚଢ଼ାଇ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷଭାବେ ଷ୍ଟ୍ରୁଟର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଓ ଶାବକମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ।

କରକର ଚଢ଼େଇର ବସା କାକର ବସାପରି କଣ୍ଟାକାଠିରେ ଢିଆରି ହୋଇଥାଏ; ମାତ୍ର କରକର ନାଡ଼ କୁଆବସାଠାରୁ ଅଧିକ ଗଭୀର । ବସା ଭିତରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଓ ଚେର ଦିଆଯାଏ । ଦିନ ପହଞ୍ଚିବା ଭାଳିବା ଶୀର୍ଷାଂଶରେ କରକରା ପକ୍ଷୀର ନାଡ଼ ଲୁକ୍କାୟିତ ଭାବେ ରହିଥାଏ । ଏମାନେ ଥରକେ ଗୁରୁ-ପାଞ୍ଚଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି । ଅଣ୍ଡାର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ତା' ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦାଗରେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଅଣ୍ଡାର ବର୍ଣ୍ଣ ଧୂସର-ଧଳା ଏବଂ ତା' ଉପରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଲାଲ-ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଛଟା ଓ ଦାଗ ପଡ଼ିଥାଏ ।

**କେମ୍ପିଫେଜିଡ଼ (Campephagidae)** ବଣ କାଶୀ ଚଢ଼େଇ-Cuckoo-shrike) ଓ ସୁନସ୍ (minivet) ପକ୍ଷୀ ଏହି ବଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ପାତଳ, ଗ୍ରେଟ ବା ମଧ୍ୟଭଳ ଆକାରର ଚୂଷବାସୀ ପକ୍ଷୀ । ଏମାନେ ଯୁଥଗୁଣ୍ଡା । ଜାଟପତଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ । ସୁନସ୍ ପକ୍ଷୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବର୍ଣ୍ଣର । 'ଜଙ୍ଗଲ ସୁନସ୍' (ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର 73) । ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ 'ଲଲ ସୁନସ୍' (Scarlet minivet) କହନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ପେରିକୋଟୋସ ଫ୍ଲାମ୍ମେୟସ'(Pericrocotus Flammeus) । ହିନ୍ଦି ନାମ ପାହାଣି ବୁଲବୁଲ ଗୁଜମ୍ । ଜଙ୍ଗଲ ସୁନସ୍ ଆକାରରେ ଗୋବରା ଚଢ଼େଇଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ସାନ । ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଅଣ୍ଡାର ପିଠିପଟର ବର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚକଚକିଆ, ଦଳକଳା, ତଳ ପାଖ କମଳାଲେମ୍ବୁପରି ଲାଲ ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଲାଲ । ମାଛ ଚଢ଼େଇ ଓ ଅପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଅଣ୍ଡାର ପିଠି ପାଖର ବର୍ଣ୍ଣ ଧୂସର ଓ ସବୁଜ ଆଭାସୁକ୍ତ ହଳଦିଆ (Olive yellow), ପେଟଫଟର ବର୍ଣ୍ଣ ହଳଦିଆ । ତା'ସାଙ୍ଗକୁ କଳା ପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପଟି ପଡ଼ିଥାଏ । ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟି କରି ଷ୍ଟ୍ରୁଟ୍ର ଷ୍ଟ୍ରୁଟ୍ର ଦଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଗଛର ଉପର ଅଂଶରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଶୀତଋତୁରେ ଏମାନେ ଯୁଥଗଠନ କରନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଥରେ ଢିରଣି ବା

ଅଧିକ ପକ୍ଷୀ ଥାନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଅଣ୍ଟିରା ପକ୍ଷୀମାନେ ଅଲଗା ଦଳ ଏବଂ ମାଛ ଓ ଅପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଅଣ୍ଟିରା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରନ୍ତି । ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ଭରୁପଲ୍ଲବର ଚନ୍ଦ୍ରାଭସ ଉପରେ ଅଶାନ୍ତ ଭାବେ ତେଣା ଫଡ଼ ଫଡ଼ କରି ନାଚକୃତ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଆରେକ ପଛରେ ଗୋଡ଼ିଆଗୋଡ଼ି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ଯାଆନ୍ତି । ତରୁଣାଶାଖେ ନାଚକୃତବେଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପୋକଜୋକ ବାହାର ଆସନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆହାର ହୁଅନ୍ତି । ଘନ ସବୁଜ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଅଣ୍ଟିରା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପକ୍ଷର ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଘନ ଲେହୃତ ରଙ୍ଗ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଯେତେବେଳେ ଝଲମଲ ହୋଇଉଠେ ସେତେବେଳେ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଏ । ଜଙ୍ଗଲ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଧାନ ଆହାର କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ସା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶୁକ (ଲୁହ) । ପତ୍ର ଓ ମୁକୁଳ ଉପରେ ଥିଲବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ଟୁଙ୍ଗିଖାନ୍ତି, ନଚେତ୍ କନକ ଚଢ଼େଇ (Flycatcher) ପରି ପତଙ୍ଗଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଶିକାର କରନ୍ତି । ଜଙ୍ଗଲ ସୁନ୍ଦର ଦଳବାନ୍ଧ ଉଡ଼ିଗଲବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗୀତମୟ ‘ହୁଇ ଟୁଇଟ୍’ ବା ‘ହୁଇଚରି, ହୁଇଚରି’ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି । ସବୁ ଜାତିର ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀଙ୍କର ମାଡ଼ ଏକ ଅଳ୍ପ ଗନ୍ଧାର କପ୍ ପରି । ଏହା ବେଶ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ । ତେର ଓ ପରି ରୁଆରେ ମାଡ଼ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ । ମାଡ଼ ବାହାର ପଟେ ହରିତା (moss), ଫରମ୍ପୁଶ (lichen) ଓ ମାଙ୍କଡ଼ସା ଅଣ୍ଡାର ଖୋଲ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ତରୁଣାଶାଖ ଆଳୁଡ଼ି ପରି ସ୍ଥାନରେ ଅଥବା ଶାଖାର ଉପର ପାଖରେ ମାଡ଼ ରହିଥାଏ । ମାଡ଼ଥିବା ତରୁଣାଶା ସାଧାରଣତଃ ତଳୁ 3ରୁ 15 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ । ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ଥରକେ ଦୁଇରୁ ଗୁରୁତି ଯାଏ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି । ଅଣ୍ଡାର ବର୍ଣ୍ଣ ଫିକା ସବୁଜ । ତା’ ଉପରେ ଘନବାଦାମୀ ଓ ଫିକା ମାଲରଙ୍ଗର ଛଟା ଓ ଛୁପ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ।

ଛୋଟ ସୁନ୍ଦରୀ କୁ ଇଂରାଜିରେ ‘ଲିଟଲ୍ ମିନିଭେଟ୍’ (little minivet) କହନ୍ତି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ପେରିକ୍ରୋଟସ ସିନାମୋମିଆସ’ (Pericrocotus cinnamomeus) । ଏହା ଜଙ୍ଗଲ ସୁନ୍ଦରତାରୁ ସାନ ଓ ପତଳା । ସାରା ଭାରତ, ବାଙ୍ଗଳା ଦେଶ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ଅଣ୍ଟିରା ପକ୍ଷୀର ବର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ କଳା, ଧୂସର ଓ ହଳଦିଆ-ଲୁଲ । ମାଛ ଓ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ଅଣ୍ଟିରା ପକ୍ଷୀର ମୁଣ୍ଡ କଳା ନୁହେଁ ଓ ପେଟ ପାଖ ଲୁଲ ନ ହୋଇ ବେଶି ଭାଗ ହଳଦିଆ । କେବଳ ଅଣ୍ଟିରା ପିରୁ ଅଂଶରେ ଯେପରି ଲୁଲବର୍ଣ୍ଣର ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ଏମାନଙ୍କର ସେହିପରି ଥାଏ । ଜଙ୍ଗଲ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ

ଅଞ୍ଚଳରେ ରହେ । ମାତ୍ର ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ପତଳା-ଶୁଷ୍କ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ଇରେନିଡ଼ (Irenidae) ବର୍ଗ—‘ପରୀ ନୀଳପକ୍ଷୀ’ (Fairy Bluebird) ଏହି ବର୍ଗର । ଏହା ପଶ୍ଚିମପାଟଣା ପର୍ବତମାଳାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଓ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ପୂର୍ବାଂଶରେ ଚିର ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହି ବର୍ଗର ସାଧାରଣ ଓ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସ୍ତୁତ ପକ୍ଷୀ ହେଲେ ସୌଭାଗୀ ଚଢ଼େଇ (Iora) ଏବଂ କନକଚର୍ମୀ ଓ ହରବା ଚଢ଼େଇ (chloropses) । ଏମାନଙ୍କୁ ‘ପତ୍ର ପକ୍ଷୀ’ (Leaf birds) ଓ ଲେକପ୍ରିୟ ଭାଷାରେ ‘ସବୁଜ ବୁଲ୍‌ବୁଲ୍’ ପକ୍ଷୀ (Green bulbuls) ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି । ଯୌଭାଗୀ ଚଢ଼େଇ (ବର୍ଣ୍ଣବିଧି 74)କୁ ଇଂରାଜୀରେ ‘ସାଧାରଣ ଆଇଓରା’ (common iora) ବୋଲି କହନ୍ତି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଏଜିଥିନା ଟିପ୍‌ଥୀ’ (Aegithina tiphia) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ ସୌବିଗି । ଏହାର ଆକାର ଘରଚଟିଆର ଆକାର ହେବ । ଅଣ୍ଟିରା ଚଢ଼େଇର ବର୍ଣ୍ଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଘନକୃଷ୍ଣ ଓ ହଳଦିଆ । ପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଧଳା ଡୋରା ଦାଗ ଥାଏ । ମାଈ ଚଢ଼େଇର ବର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ସବୁଜ ହଳଦିଆ ଓ ଅଣ୍ଟିରା ପକ୍ଷରେ ଯେମିତି ଦୁଇଟି ଧଳା ରେଖା ଥାଏ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ସେହପରି ଡୋରା ଦାଗ ରହିଥାଏ । ଉପରେ ଅଣ୍ଟିରା ଚଢ଼େଇର ବର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁତରେ ଯାହା କୁହାଗଲା ତା’ ହେଉଛି ପ୍ରଜନନ ଋତୁର ସାକ ପୋଷାକ । ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ଅଣ୍ଟିରା ବର୍ଣ୍ଣ ମାଈ ପରି । ତଥାତ୍ ଭିତରେ ଅଣ୍ଟିରା ପୁଚ୍ଛର ରଙ୍ଗ ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ କଳା । ମାଈ ଚଢ଼େଇର ପୁଚ୍ଛ ସବୁଜ । ସୌଭାଗୀ ଚଢ଼େଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚୂଷବାସୀ ଓ ଶୀତଘୋଷୀ । ଏହା ପକ୍ଷୀଗାମ ବାହାରେ ଥିବା ତରୁଣା ଓ ଅଳ୍ପ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଏମାନେ ଡାଳପତ୍ର ଭିତରେ ସିଂବାଳୁଆ ଓ କାଟିପତଙ୍ଗ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାନ୍ତି । ଏ ସମୟରେ ଏକ ଡାଳରୁ ଅନ୍ୟ ଡାଳକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାନ୍ତି ଏବଂ ଡାଳର ତଳକୁ ଓ କଡ଼କୁ ଝୁଲି ରହି ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପୋକ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି । ପରସ୍ପର ସହୃଦ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏମାନେ ମଧୁର ସ୍ୱସ୍ୱର ଓ ଛଦ୍ମ ସଙ୍ଗୀତମୟ କିରଣମିଶ୍ରିତ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏହାର ଏକ ମଧୁର ଦୀର୍ଘଚିଣା ସ୍ୱସ୍ୱର ଡାକ ଅନୁସାରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଅନୁକାରାତ୍ମକ ‘ସୌବିଗି’ ନାମ ହୋଇଅଛି । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଅଣ୍ଟିରା ପକ୍ଷୀ ମାଈ ପକ୍ଷୀର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ଚମକାର ଖେଳ ଦେଖାଏ । ସେ ପକ୍ଷକୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଝୁଲାଇ ରଖି, ପିରୁର ଧଳା ପକ୍ଷକୁ ତୁଳା ଭାଣିଲା ପରି ଫୁଲାଇ ଓ ଲୁହୁକି ଦେଖାନ୍ତି ।



ଭାବେ ତୋଳି ରଖି ମାଛ ପକ୍ଷୀକୁ ଗୋଡ଼ାଏ । ତା' ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସଙ୍ଗୀତମୟ କିର ମିଶରି, ସୁସ୍ୱର ଓ ଦୀର୍ଘଟଣା ହସକାରାନ୍ତ ଚିଲ-ଇ ଶବ୍ଦ କରୁଥାଏ । ଏକ ମିଟର ବା ଦୁଇମିଟର ଉପରକୁ ଡେଇଁ ସେ ତା'ର ଫୁଲୁଲୁଥିବା ଓ ଚକଚକ କରୁଥିବା ଧଳା ପିତ୍ତ ଅଂଶ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ବୃକ୍ଷତାଳରେ ତା'ର ବସିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଘୂରି ଘୂରି ଫେରୁଥାଏ । ଏଡେବେଳେ ଏହା ଉଚ୍ଚାର ଏକ ପେଣ୍ଡୁ ପରି ଦେଖାଯାଏ । ଯୌତୁକାର ନାଡ଼ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ନରମ ଦାସର ପତ୍ର ଓ ଚେରରେ ଘନ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଣା ହୋଇଥାଏ । ଦୋଫାଙ୍ଗିଆ ତାଳ ଅଂଶରେ ଏହି ନାଡ଼ ରହୁଥାଏ । ନାଡ଼ର ବାହାର ପାଖରେ ବୁଡ଼ିଥାଣୀ ଜାଲ ନିପୁଣ ଭାବେ ଲେପା ଯାଇଥାଏ । ଏମାନେ ଥରକେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟିରୁ ଚାରିଟି ଯାଏ ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । ଅଣ୍ଟାର ବର୍ଣ୍ଣ ଫିକା ପାଟଳ-ଧଳା । ତା' ଉପରେ ବାଇଗଣି-ବାଦାମୀ ବର୍ଣ୍ଣର ଗୁପ୍ତଗୁପ୍ତ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ।

ଅନେକଟା ଯୌତୁକୀ ପରି ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଜାଣିଏ ଯୌତୁକୀ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜରେ 'ମାର୍ସାଲ ଯୌତୁକୀ' (Marshall's Iora) କହନ୍ତି । ପକ୍ଷି-ବିଶାରଦ ମାର୍ସାଲଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଏପରି ନାମକରଣ କରାଇଛନ୍ତି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ "ଏଗିଥିନା ନାଇଗ୍ରୋଲୁଟିଆ" (*Aegithina nigrolutea*) । କୌରୁକର କଥା ଏହି ଯେ ଏଇ ପକ୍ଷୀଟି କେବଳ ବର୍ଷା ପ୍ରଥମରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ଗୁଜରାଟର କର୍ ଅଞ୍ଚଳ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ମଧ୍ୟ-ପ୍ରଦେଶ ଓ ବଙ୍ଗଳାରେ ବାସକରେ । ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଲୁହକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହାର ଲୁହର ଅଗ୍ରଭାଗ ଧଳା ।

କନକ ଚର୍ମା ( ବର୍ଣ୍ଣଚିହ୍ନ 75 )କୁ ଇଂରାଜରେ 'ଜେରଡନ୍ କନକଚର୍ମା' ( Jerdon's Chloropsis ) କହନ୍ତି । ପକ୍ଷି-ବିଶାରଦ ଜେରଡନ୍ଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଏପରି ନାମକରଣ କରାଇଅଛନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ "କ୍ଲୋରୋପ୍ସିସ୍ ଜେରଡନ୍ସି" (*Chloropsis Cochinensis jerdoni*) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ ହରେଡ୍ଡି । ଏହା ଗୋଟିଏ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଦାସ ପରି ସବୁଜ ପକ୍ଷୀ । ଆକାର ଗୋବରୁ ଚଢ଼େଇ ପରି ହେବ । ଦେହରେ ନିଶି ବା ମୁଛ ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବାଇଗଣି-ମାଲ ତୋରଣ ଦାଗ ଥାଏ । ଗାଲ, ଚିରୁକ ଓ କଣ୍ଠ କଳା । ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାମାନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଅଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କଳା । ଏହା ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀର ରଙ୍ଗ । ମାଛ ପକ୍ଷୀର ଚିରୁକ ଓ କଣ୍ଠ ଫିକା ମାଲ ସବୁଜ ଓ ଦେହରେ ମୁଛ ପରି ଚକଚକିଆ ସବୁଜ-ମାଲ ତୋରଣ ଦାଗ ପଡ଼ିଥାଏ । କନକଚର୍ମା ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଅଥବା ଝୁନ୍ତୁ ଝୁନ୍ତୁ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ

ହୋଇ ଚୂଷର ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପଶୁପକ୍ଷ ସହକାରେ କାଟପତଙ୍ଗ ଶିକାର କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏତେବେଳେ ଏମାନେ ଛୁଦ୍ର ଛୁଦ୍ର ଶାଖା ଦେହରେ ତଳଆଡ଼କୁ ଝୁଲି ରହୁ ଓ ସକ୍ଷରେ ଖେଳ ଦେଖାଇଲେ ପରି ନାନାପ୍ରକାର ଭଙ୍ଗିରେ ରହୁ ଆହାର ଜୀବ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି । ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷ ସହଜ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମିଶି ଯାଉଥିବାରୁ କନକ ଚମ୍ପାକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପା'ନ୍ତି । ତା' ସ୍ବର ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ସେହି ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣି ହୁଏନାହିଁ । କାରଣ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଯଥା—ଦଳି ଟିକି ଚଢ଼େଇ (Tailor bird), ଗୋବରା (Bul bul), କଜଳପାତି (Black drongo), ଷୌରାଗୀ (Iora), ଗଜେଇଡ଼ୁରୀ (White breasted kingfisher) ଓ ଦୟାଲ (Magpie-Robin)ର ସ୍ବରକୁ ସେ ଅବିକଳ ନକଲ କରିପାରେ । ସବୁଠାରୁ ମଜାର କଥା ଏହି ଯେ କନକଚମ୍ପା ପକ୍ଷୀ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀର ସ୍ବରକୁ ପର ପର ବିରତିହୀନ ଭାବେ ନକଲ କରିବା ଫଳରେ ମନେହୁଏ ସତେ ସେପରି ପକ୍ଷୀ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ସଭା ବସିଛି । ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଗଛର ନିକଟକୁ ଆସି ଦେଖେ, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ପକ୍ଷୀ ଜାତି ସଂଘର ସାଧାରଣ ସଭା ବସି ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କନକଚମ୍ପା ପକ୍ଷୀ ତାକୁ ଭଣ୍ଡେଇବାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଡ଼ିଫୁଲ ମନରେ ପଳାୟନରତ । ଏହାର ଖାଦ୍ୟ କାଟପତଙ୍ଗ, ମାଙ୍କଡ଼ିଆ, ଫଳ ଓ କୋଳି । ଏମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଫୁଲର ମଧୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାନ୍ତି ।

କନକଚମ୍ପାର ନାଡ଼ ଏକ ଅଗଭୀର କମ୍ ପରି । ଏହା ଲତାଗଛର ଆକର୍ଷୀ (tendrils), ହରିତା (moss) ଓ ମୂଳିକା (rootlet)ରେ ହାଲୁକା ଭାବେ ଢିଆର ହୋଇଥାଏ । ଭିତରେ ଆହୁରି ନରମ ପଦାର୍ଥ ଦିଆଥାଏ । ବାହାର ପଟକୁ ବାହାରିଥିବା ତରୁଣୀଖାର ଅଗରେ ଅଥଚ ଉତ୍ତମରୂପେ ଲୁଚିକାୟିତ ଭାବେ ନାଡ଼ ରହିଥାଏ । କନକଚମ୍ପା ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ । ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ଲଲଆସିଆ ହଳଦିଆ । ତା' ଉପରେ ଘନ ଲଲ ରଙ୍ଗର ଛଟା ଦାଗ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ହରବା ଚଢ଼େଇ କନକଚମ୍ପା ପକ୍ଷୀର ଏକ ଜାତି । ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ 'ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଲଲଚ କନକଚମ୍ପା' (Gold fronted chloropsis) କହନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'କ୍ଲୋରେପସିସ୍ ଅରୁଫ୍ରନ୍ସ' (Chloropsis aurifrons) । ସମୟ ସମୟରେ କନକଚମ୍ପା ଓ ହରବା ଉଭୟ ପକ୍ଷୀ ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକାଠି ଦେଖା-ଯାଇଥାନ୍ତି । ଅଣ୍ଟିର ହରବାର ମସ୍ତକାଗ୍ର (forehead) ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣାଭ ଏବଂ

ଚିତ୍ର ଓ ତାହା ବାଉଁଶ-କଳା । ମାଛ ପକ୍ଷୀ ସେହି ରଙ୍ଗର ମାଛ ଫିକା । ତାର ଲଳିତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ରଙ୍ଗ ସେତେ ପ୍ରତିଭାତ ନୁହେଁ ।

ପିକ୍‌ନୋଟୋଟିଡ଼ ( Pycnonotidae ) ବର୍ଗ—ଗୋବରା ଚଢ଼େଇ (Bulbul) ଏହି ବର୍ଗର । ଏମାନେ ସାରା ଭାରତରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି ଓ ବଗିଚାର ଗୋବରାଙ୍କ ନ କରନ୍ତି । ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିଦ୍ୱାରା ଅପ୍ରାକୃତିକ ବଗିଚାକୁ ସଜ୍ଜା କରନ୍ତି ତୋଳନ୍ତି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନାହିଁ । ଚୁଲିଆ ( ବର୍ଣ୍ଣିତ 76 )—ଏ ଜାତୀୟ ଗୋବରା ଚଢ଼େଇକୁ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତାଳଚମ୍ପା ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି । ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ଲଲ-ନଶ ବୁଲ୍‌ବୁଲ୍’ (Redwhiskered\*bulbul) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ପିକ୍‌ନୋଟୋଟାସ ଜୋକୋନସ’ (Pycnonotus joconus) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ ‘ପାହାରି ବୁଲ୍‌ବୁଲ୍’ । ଏହା ବଣିଠାରୁ ଛୋଟ ଓ ସାଣ ଏବଂ ବଗିଚା ଓ ବୁଢ଼ାଗୁଳୁ ମଧ୍ୟରେ ଇତିହାସ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଏହାର ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚୁଲି ଥାଏ ଓ ତାହା ସାମନା ଆଡ଼କୁ ସାମାନ୍ୟ ବନ୍ଧି । ପକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣ ବାଦାମୀ । ପେଟ ପାଖ ଧଳା । ଗୁଡ଼ରେ କଳାରଙ୍ଗର ଏକ ଭଗ୍ନ ‘ଗଳାହାର’ ଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଡ଼ ଆଡ଼କୁ ବେକରେ ଏକ କଳା ହାର ପରି ଡୋରା ରେଖା ଥାଏ, ତାହା ମଝି ଅଂଶରେ ଭଗ୍ନ । ଆଖି ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡପରି ଗାଢ଼ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନ ଥାଏ । ଯେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ଓ ବାସ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଗଛ ଓ ବୁଢ଼ାଗୁଳୁ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣ ଚୁଲିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ଏପରିକି କୋଳାହଳମୟ ନଗରର ବଗିଚାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବାସକରେ । ଗୋବରା ବା ଚମ୍ପା ( Redvented bulbul ) ମଧ୍ୟ ଚୁଲିଆ ପରି ଏକ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ । ମାତ୍ର ଚୁଲିଆ ଚମ୍ପା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସକରେ । ଚୁଲିଆମାନେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବୁଲନ୍ତି; ମାତ୍ର ଫଳ ପାଟିଥିଲବେଳେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଛ ବା ବୁଢ଼ାରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେମାନେ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ କାକଳି ଧ୍ବନି ସବୁ ସମୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ସ୍ବର ଶୁଣିବାକୁ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଖିଟିଖିଟିଆ । ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଫଳ, ବଗେଚ କର ନାଗଘିଘା (Lantana) ଗଛର ଫଳ । ସେମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ସା, କୀଟ-ପତଙ୍ଗ ଓ ସ୍ବୀକାନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ଚମ୍ପା (Redvented bulbul) ପରି କଳହପ୍ରିୟ ନୁହଁନ୍ତି । ଛୋଟ ଓହ୍ଲାଇଥିବାବେଳେ ପାଲଲେ ଚୁଲିଆ ଚମଡ଼କାର ପୋଷା ମାନେ । ମୁହଁର ପଛେ ପଛେ ଏ ଘର ସେ ଘର ବୁଲେ ଏବଂ ଦୂରରେ ଥିଲେ ତାହା ବୋଲେ ଘାଞ୍ଜକୁ ଆସେ । ଗୋବରା ଚଢ଼େଇମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଉ, ସବୁ କାଠି ଓ

ଘାସରେ କିମ୍ବ ଆକାରର ମାଡ଼ ରଚନା କରନ୍ତି । ଚୁଲିଆ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବସା କରେ । ଏମାନଙ୍କର ମାଡ଼ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ଗଛ, ବୁଦା ବା ବଗିଚାର ବାଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏସବୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଖୋଲ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଅଣ୍ଟା ଓ ଶାବିକ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହୁଏ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ଲୁଚିତ ହୁଏ । ସମୟ ସମୟରେ ଚୁଲିଆ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିବା ଛପର ଘରର କାନ୍ଥ ଓ ଛାତରେ ମାଡ଼ ରଚନାକରେ । ଆପାତତଃ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଚଳପ୍ରଚଳଦ୍ୱାରା ହରୁଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଚୁଲିଆ ଥରକେ ଦୁଇଟିରୁ ଚୁରଟି ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ଅଣ୍ଟାର ବର୍ଣ୍ଣ ପାଟଳ-ଶ୍ୱେତ । ତା' ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବାଇଗଣି ବାଦାମୀ ବା ଘନଲେହୁତ ରଙ୍ଗର ଗୁପ୍ତପିଆ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ।

ଧଳାଗାଲ ବୁଲବୁଲ—ଏହାର ଇଂରାଜି ନାମ ‘ଧଳାଗାଲ ଗୋବର୍’ (Whitecheeked bulbul) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ପିକ୍‌ନୋନୋଟାସ ଲିଉଜେନୋଟସ’ (Pycnonotus leucogenys) । ଏହି ବୁଲବୁଲ ପକ୍ଷୀଟି ଭାରତର ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ବେଶି ସାଧାରଣ ଭାବେ ଚୁଲିଆ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହାର ଗଣ୍ଡଦେଶରେ ଧଳା ଚିହ୍ନ ସୁପରିଚିତ । ଚୁଲିଆ ପରି ଏହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ । ଲୁହତଳ ଅଂଶ ଲାଲ ନ ହୋଇ ହଳଦିଆ । ବଉଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପକ୍ଷୀର ଚୁଲ ଉନ୍ନ ଆକାରର । ଉଦାହରଣରେ ଗୁଜରାଟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଧଳାଗାଲ ବୁଲବୁଲର ଚୁଲ ନେତେକ ପରିମାଣରେ ଗୋଲକାର । କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପକ୍ଷୀର ଚୁଲ ଲମ୍ବା, ଗୋଜିଆ ଓ ଆଗଆଡ଼କୁ ବାଙ୍କି ଥାଏ ।

ଚମ୍ପା (ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର 77)—ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଚମ୍ପା ଓ ଗୋବର୍ ଉଭୟ ନାମରେ ପରିଚିତ । ଇଂରାଜି ନାମ ‘ଲଲ ଲୁହ ମୁଲଥିବା ବୁଲବୁଲ’ (Redvented bulbul) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ପିକ୍‌ନୋନୋଟାସ କାଫେର’ (Pycnonotus cafer) । ହିନ୍ଦି ନାମ ବୁଲବୁଲ, ବୁଲଦୁମ୍ । ଏହା ଆମର ଏକ ପରିଚିତ ପକ୍ଷୀ । ଏହାର ପିଠି ପାଖ ଧୂଆଁ ଟିଆ-ବାଦାମୀ । ମୁଣ୍ଡ ଓ ଚୁଡ଼ା କଳା ଏବଂ ମନେହୁଏ ତା' ଉପରେ କିଏ ଝାଡ଼ୁ ମାରି ସଫା କରନ୍ତି । ପିଠି ଓ ଗୁଡ଼ରେ କାନ୍ଥପରି ଚିହ୍ନ ଥାଏ । ଲୁହ ମୁଳରେ ଗାଢ଼ ଲାଲବର୍ଣ୍ଣର ଏକ ଚିହ୍ନ ଥାଏ । ପିତ୍ତ ଅଂଶ ଧଳା ଓ ଉଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚମ୍ପା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚୁଲିଆ ଦେଖାଯାଏ । ଚମ୍ପା ଏକ ସତେଜ ଭାବପନ୍ନ ପକ୍ଷୀ ଓ ସୁଲଳିତ ଧ୍ୱନି କରେ । ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଉଦ୍ୟାନମାନଙ୍କରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରୀତିକର ପକ୍ଷୀ । ଅବଶ୍ୟ ମଟର ଓ ସେହିପରି ଗଛ ପ୍ରତି ଏହାର ଆକର୍ଷଣ ବେଶି ଏବଂ

ବେଳେବେଳେ ସେ ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରେ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଳି ଚମ୍ପାର ପ୍ରଧାନ ଆହାର । ମଥ୍ (moth) ଓ ସିଂବାଲୁଆ ମଧ୍ୟ ଖାଏ । ପ୍ରଥମ ଅସର ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଘରେ ଝିଡ଼ିଯୋକ ଗାତମାନଙ୍କରୁ ବାହାରନ୍ତି । ଏ ସମୟରେ ଗୋବରା ଚଢ଼େଇ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଖାଏ, ନଚେତ୍ ଝିଡ଼ିଯୋକ ଉଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ବୁଦା ଉପରୁ ଉଠିମ୍ବ ଭାବେ (vertically) ଉଡ଼ି ଆସି ଧରେ ।

ଗୋବରା ଚଢ଼େଇର ସାଧାରଣ ଆଚରଣ ଓ ଅଭ୍ୟାସ ଚୁଲିଆ ପକ୍ଷୀଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ । ତଥାତ୍ ଭିତରେ ଏତିକି, ଚୁଲିଆ ଉଲ୍ଲାନାରେ ଚମ୍ପା ବହୁତ ବେଶି କଳହ-ପ୍ରିୟ । ଭରତୀୟ ପକ୍ଷୀ-ରସିଆ (fanciers) ମାନେ ଚମ୍ପାକୁ ଲଢ଼ୁଆ-ପକ୍ଷୀ ରୂପେ ଶୁଦ୍ଧ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଭାରତର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ସବ ଓ ଛୁଟିଦିନମାନଙ୍କରେ ଗୋବରା ଚଢ଼େଇକୁ ଲଢ଼ାଇ ଲେକେ ବେଶ ଆମୋଦ ପାନ୍ତି । ଏ ସମୟରେ ଚମ୍ପା-ରସିଆ ଓ କୁଆରମାନେ ବାଲି ମାରି ବେଶ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ହାରନ୍ତି ଜିତନ୍ତି । ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିତି ଗୁମ୍ଫା ଅନ୍ ହୁଏ, ତାର ଦାମ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ । ଅନ୍ୟ ଗୁଲ୍‌ଗୁଲ୍ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରି ଚମ୍ପା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେର, ପତ୍ର, ଡେମ୍ଫ ଓ ଘାସରେ କପ୍ ଆକାରର ନାଡ଼ ରଚନା କରେ । ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ଗଛ ଓ ବୁଦାରେ ଏହି ନାଡ଼ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ । ବଙ୍ଗଳାମାନଙ୍କରେ ଲତାଗଛକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ାଦିର ଜାଲ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ବେଳେବେଳେ ତା ଉପରେ ମାଡ଼ିଥିବା ଲତାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଚଳପ୍ରଚଳଠାରୁ ମାତ୍ର ଏକ ମିଟର ତଥାତ୍‌ରେ ଚମ୍ପା ନାଡ଼ ରଚନା କରିବାର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି । ଏହା ଧରକେ ଦୁଇ ଦିନୋଟି ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ଏମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ବର୍ଣ୍ଣରେ ଓ ଆକାରରେ ଦେଖିବାକୁ ଚୁଲିଆ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଟା ପରି ।

ମାସିକାପିଡ଼ି (Muscicapidae) ବର୍ଗ ପାସାରିଫର୍ମିସ୍ (Passeriformes) ପକ୍ଷୀବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ବାହାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିବା ବହୁ ଉପବର୍ଗର ପକ୍ଷୀ ଏହି ବର୍ଗାଧୀନ । ସେସବୁକୁ ଉପରଠାଉଥିବା ଭାବେ ପକ୍ଷୀକାଳେ ମନେହେବ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ପକ୍ଷୀ; ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରର ଗଠନ (anatomy) ଓ ସ୍ୱଭାବ ନୀତିକା କଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ସେସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଷୟ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ବହିର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ । କନକ ଚଢ଼େଇ (Flycatcher), ଟିକି ଚଢ଼େଇ (Warbler), ସାତଭୟା (Babbler) ଓ କସ୍ତୁରୀ (Thrush) ମାସିକାପିଡ଼ି ବର୍ଗଭୁକ୍ତ । ଏହି ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତୋଟି ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀର କଥା ଆଲୋଚନାକରିବା ।

ନାକୁଣୀ ପକ୍ଷୀ (ବର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର 78)—ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ‘ଧଳା ଟିପିଟିପିଆ ପକ୍ଷୀ

ଲୁହା ମସିକା ଭଣି' (White spotted Fantail Flycatcher) କହନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ରିପିଡୁରା ଆଲବୋଗୁଲ୍‌ଗୁଲ୍‌ଗୁଲ୍‌' (Rhipidura albigularis); ହିନ୍ଦୀ ନାମ—ନାଚନ୍, ଚକଡ଼ଲ । ଏହାର ଆକାର ପ୍ରାୟ ଘରଚଞ୍ଚିଆ ଆକାର ହେବ । ବର୍ଣ୍ଣ ଧୂଆଁ ଲିଆ ବାଦାମୀ । ଏହାର ଭୂଲତା (eyebrow) ଧଳା ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ । ଗୁଡ଼ ଓ ପାଶୁଭାଗ ଧଳା ଟିପ୍ପିଟିପ୍ପିଆ । ପେଟପାଖ ଧଳା । ନାଚୁଣୀ ସଦାଚଞ୍ଚଳ ଓ ସ୍ପୃଷ୍ଟିବାଜ । ଏହାର ଲୁହ ଦେଖିବାର ଜନସ । ଏହା ଆଡ଼ିମ୍ବର ପୁଣି ଭାବେ ପଟ୍ଟାପରି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଦେହର ଦୁଇପଟେ ତେଣା ଶିଥିଳଭାବେ ଓହ୍ଲାଇ ଥାଏ । ନାଚୁଣୀ ଶିଥିଳ ଅଳ୍ପ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ, ନିକୃଷ୍ଟ ଓ ଉଦ୍ୟାନ ସବୁରେ ଦେଖାଯାଏ । କୁଞ୍ଚବନ, କୋଳାହଳମୟ ଜନାଗଣ୍ଡି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାସକରେ । ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ । ସୁନ୍ଦର ପୋଷ ମାନେ ଓ ବର୍ଣ୍ଣାସରେ ପାଖକୁ ଆସେ । ସାମାବଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଚୁଣୀ ପକ୍ଷୀ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବାସକରନ୍ତି । ସେମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ବୃକ୍ଷର ନିମ୍ନ ଶାଖାମାନଙ୍କରେ କ୍ଳାନ୍ତିହୀନଭାବେ ତେଣା ଫଡ଼ ଫଡ଼ କରି ଉଡ଼ି ଚାଲୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶାଖାରୁ ଶାଖାକୁ, ଗଛରୁ ଗଛକୁ ଏକ ଆରେକ ପଛରେ ଘୁରି ଘୁରି ଚଢ଼ାକାର ନୃତ୍ୟ କରି କରି ଯାଉଥାନ୍ତି । ତା'ଆଁ ଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପତଙ୍ଗ ଉଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ନାଚୁଣୀ ପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କ ପିଛା ନେଇ ତପ୍ତବତୀ ସହକାରେ ଲଳିତ ଛନ୍ଦରେ ଫାଣ ପକାଇଲା ପରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଅଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖଟାଖଟ ଧରି ଉଦରସ୍ଥ କରେ । ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର କର୍କଶ 'ଚୁକ୍‌ଚୁକ୍' ଶବ୍ଦକରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆଉ ପ୍ରକାରେ ଲଳିତ ମନୋହର ସ୍ବର ଅଛି । ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ବର ଶବ୍ଦ କରେ; ଠଣ ଠଣ ଝଣ ଝଣ ହେଲପରି, ବିଭିନ୍ନ ସୁରର, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼େ ଓ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛୁଡ଼େ । ଆନନ୍ଦରେ ନାଚୁଣୀ କରୁଥିଲାବେଳେ ଏହି କର୍ମିତ କୁଜନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ । ନାଚୁଣୀର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ମଶା, ତା'ଆଁ ଶ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛି । ମଞ୍ଚ ସୁନ୍ଦର, କପ୍ ପରି, ଅନେକ ପରିମାଣରେ ମଦ୍ୟ ଖାଇବା ଗ୍ରାସ ପରି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦାସ ଓ ତନ୍ତ୍ରରେ ଘିଆରି ହୋଇଥାଏ । ମଞ୍ଚର ବାହାର ପାଖ ନିୟମିତ ଭାବେ ବୁଡ଼ିଆଣୀ ଜାଲଦ୍ବାରା ଲେସା ହୋଇଥାଏ । ନାଚୁଣୀ ପକ୍ଷୀର ମଞ୍ଚ ସୌଭାଗୀ (Iora) ଚଢ଼େଇର ମଞ୍ଚ ପରି । ତଦ୍ବାରୁ ଏହିକି, ନାଚୁଣୀର ମଞ୍ଚର ତଳପାଖରୁ ଗଛର ବକଳା ଅସୁବୁରୁ ଭାବେ ଝୁଲୁଥାଏ; ମାତ୍ର ସୌଭାଗୀର ମଞ୍ଚ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୋଲକାର, ତଳପଟକୁ କିଛି ଝୁଲି ରହି ନଥାଏ । ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ଗଛ ଡାଳରେ, ବିଶେଷ କରି ଆମ୍ବ ଓ Chikoo graft ଡାଳରେ



ଭୂମିଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଚିନ୍ତାମିତର ଉଚ୍ଚରେ ଆକୃଶୀ ବା ଦୁଇଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ଗରଜ ହୋଇଥାଏ ।

ଅରକେ ନାରୁଣୀ ଚିନୋଟି ଅଣ୍ଟା ହାଏ । ଅଣ୍ଟାର ବର୍ଣ୍ଣ ପାଟଳଆସ୍ବୟୁକ୍ତ ହଳଦିଆ-ଧଳା । ଯେଉଁଆଡ଼ ଓସାରୁଆ ଯେପଟେ ଅଣ୍ଟା ଚାରିପଟେ ମୁଦ୍ରିକାପରି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦର ଚିହ୍ନ ଥାଏ ।

ଆଉ ଜାଣିବ ନାରୁଣୀ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜରେ ‘ଧଳା ଭୁସୁକ୍ତ-ପଙ୍ଖା ଲୁହ ଆ-ମକ୍ଷି ଭଣ୍ଡା’ (White browed Fantail Flycatcher) କୁହନ୍ତି । ଆମେ ତାକୁ ‘ଧଳାଭୁରୁ ନାରୁଣୀ’ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କହୁବା । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ରିପିଡୁରା ଅରଥଲ (Rhipidura Aureola) । ଏହାର ଭ୍ରୁ ସ୍ଥାନରେ ଓସାରୁଆ ଧଳା ପଟି ପରି ରେଖା ଥାଏ । ପେଟ ପାଖ ଧଳା । ଏହି ପକ୍ଷୀ ଭାରତୀୟ ଉପଦ୍ଵୀପରେ ପ୍ରାୟ ସର୍ବତ୍ର ଏକ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ।

କନକ ଚଢ଼େଇ (ବର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର 79)—ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଫିଡା ବୁଲବୁଲ ଓ ଧୋବ ଚମ୍ପା । ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ନନ୍ଦନ କାନନ ମକ୍ଷି ଭଣ୍ଡା’ (Paradise Flycatcher) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଟେରସ୍ପିଫୋନ ପାରାଡିସି’ (Terpsiphone paradisi) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ—ସାହୁ ବୁଲ ବୁଲ, ଦୁଧ୍‌ବଳ । ପକ୍ଷପରି ଏହି ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିଲେ ବାସ୍ତବିକ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ । ଏହାର ଅକାର ପ୍ରାୟ ଗୋବରୁ ଚଢ଼େଇ ପରି, ଅବଶ୍ୟ ଉଦନପରି ଲଞ୍ଜକୁ ନ ମିଶାଇ । ଲଞ୍ଜ ପ୍ରାୟ 25ରୁ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରାସ୍ତବ୍ୟୁଷ୍ଣ ଅଣ୍ଟିରୁ ଚଢ଼େଇ ରୂପାପରି ଧଳା । ତା’ର ଲଞ୍ଜରେ ଦୁଇଟି ଫିଡାପରି ପରି ପ୍ରସାରିତହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ ‘ଲମ୍ବା ଅଣ-ଓସାରୁଆ ପତାକା’ (‘streamer’) ବୋଲି କହନ୍ତି । ମୁଣ୍ଡ ଚକଚକିଆ ମାଲ କଳା ! ମୁଣ୍ଡରେ ସେହି ରଙ୍ଗର ଚୂଳ ମଧ୍ୟ ଥାଏ । ମାଈ ଓ ଅପ୍ରାସ୍ତ ବୟସ୍କ ଅଣ୍ଟିରୁ ପିଠି ପାଖ ଲଲିବାଦାମୀ । ପେଟ ପାଖ ଧୂସରଥା ଧଳା । ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କଳା । ମୁଣ୍ଡରେ ଚୂଳ ଥାଏ । ତାହା ମଧ୍ୟ କଳା । ଅପ୍ରାସ୍ତ ବୟସ୍କ ଅଣ୍ଟିରୁ ଲଞ୍ଜରେ ଲଲ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ‘ଲମ୍ବା ଅଣ ଓସାରୁଆ ପତାକା’ ଥାଏ । ମାଈର ଏହି ପତାକା ନଥାଏ ଓ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଗୋବରୁ ଚଢ଼େଇ ପରି । ଏହି ମନୋହର ପକ୍ଷୀଟି ଇଂରାଜୀରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାମରେ ପରିଚିତ । ଯଥା—‘ରକେଟ ପକ୍ଷୀ’ (Rocket bird), ‘ସ୍ତ୍ରୋଷିତଭୃଙ୍ଗା ପକ୍ଷୀ’ (Widow bird) ଓ ‘ରିବନ ପକ୍ଷୀ’ (Ribbon bird) । କନକ ଚଢ଼େଇ ପ୍ରାୟବ୍ୟକ୍ତ ଲୁହ, ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ବାଉଁଶ ଗଛ, ଶୁଖିଲା

ନାଲିଥିବା ଓ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପତ୍ରହତା ଦେଉଥିବା ପତଳା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବାସ କରନ୍ତି ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ ପତଙ୍ଗଭେଦ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଟ ଶିକାର ଦଳରେ ଯୋଗଦେଇ ଝରଣ କରନ୍ତି । ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷମୁକ୍ତ ଖାଟମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ଚଞ୍ଚଳ ଗତିରେ ନମନାୟ ଭାବେ ଘୂରି ବାଜି ଉପରତଳ ହୋଇ ଲୁପ୍ତ ତିଆରି କରି ଗତି କଲେବେଳେ, ତା'ର ଲଞ୍ଜରେ ଥିବା ଶବନ ପରି ପକ୍ଷ ଗୁରୁକର ରକ୍ତ ଦୋଳାୟିତ ହେଲେପରି ଦୋଳାୟିତ ହୁଏ । ସେ ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଥରେ ଦେଖିଛୁ, ସେ କେବେହେଲେ ତାହା ଭୁଲିପାରିବ ନାହିଁ ; ଏଭଳି ବମଡ଼କାର ପକ୍ଷୀ ଗାଈପାରୁଥିବ ବୋଲି ଆଶା କରିବା କଥା; ମାତ୍ର ଏହା ଗୀତ ଗାଇପାରେ ନାହିଁ । ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଡାକ ହେଲା ଏକ ପ୍ରକାର ଫୁ ଝିଁ ମୁକ୍ତ ମାତ୍ର କର୍କଶ ଓ ବିରକ୍ତିକର “ଟ” ବା “ଟ-ଟ୍ଟ” । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଏହି ରାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଉଭୟ ଅଣ୍ଟିର ଓ ମାରି ପକ୍ଷୀ ନାନାପ୍ରକାର ଗ୍ରୀତିକର ସୁଗ୍ରାବ୍ୟ କୁନ କରନ୍ତି । ଏହା ସଙ୍ଗୀତମୟ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ନିଜତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବୋଲିବାକୁ ହେବ । ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ମାଛି, ତାଆଁ ଶ (Gnat), ମଧୁ ଆଦି ଖାଟ । ସାଧାରଣତଃ ଏମାନେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପତଙ୍ଗ ଶିକାର କରନ୍ତି । କନକ ଚଢ଼େଇ ଭରଣାୟ ଉପଦ୍ରୀପର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଡ଼ ରଚନା କରେ; ମାତ୍ର କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ । ଏଠାକୁ ପ୍ରକୃତର ମନୋମୁଗ୍ଧତା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଭ୍ରମଣକାଶ୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ । କନକ ପକ୍ଷୀର ନାଡ଼ କପ୍ତଳି । ସୂକ୍ଷ୍ମ ଘାସ ଓ ରୁଆରେ ଘନ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଣା ହୋଇଥାଏ । ନାଡ଼ର ବାହାର ପାଖ ବୁଡ଼ିଆଣୀର ଜାଲ ଓ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳପାଦ୍ମାସ୍ତ ଲେସା ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁଠି ତାଲ ଦ୍ୱିଶାଖ ହୋଇ ଆଙ୍କୁଡ଼ି ପରି ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ନାଡ଼ ରଚିତ ହୁଏ । ଏପରି ତାଲ ସାଧାରଣତଃ ତଳୁ ଦୁଇରୁ ପାଞ୍ଚ ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥାଏ । କନକ ଚଢ଼େଇ ସାଧାରଣତଃ ତିନୋଟିରୁ ପାଞ୍ଚଟିଯାଏ ଅଣ୍ଡାଦିଏ । ଅଣ୍ଡାର ବର୍ଣ୍ଣ ମଳିନ ହଳଦିଆ ଧଳା । ତା' ଉପରେ ଲାଲ ଆସିଆ ବାଦାମି ରଙ୍ଗର ଛଟା ଓ ଗୁପ୍ତଗୁପ୍ତିଆ ଦାଗ ପଡ଼ିଥାଏ ।

କୁଣ୍ଡାଖାଇ (Babbler) ଓ ସେମାନଙ୍କର ଜାତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ-ମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ମାତ୍ର । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଗ୍ରେଟ ଓ କେତେକ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ହୁଅନ୍ତି । କେତେକ ସାଦା ବାଦାମି ବର୍ଣ୍ଣର ଓ କେତେକଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ । ଏମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ “ଟିମାଲ୍ଲା”

(Timaliinae) ଉପଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ନିମ୍ନରେ ଏହି ଉପଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କେତୋଟି ସାଧାରଣ ଓ ପରିଚିତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ ଦିଆଗଲା ।

ହଳଦିଆଖିଆ କୁଣ୍ଡାଖାଇ (Yellow-eyed Babbler) (ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର 80)  
—ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ “ହାଇସୋମା ସାଇନେନ୍ସିସ” (*Chrysoma sinensis*) । ହିନ୍ଦି ନାମ—ବୁଲ୍ଲଲ ଗୁଜମ୍ । ଏହା ଗୋବର ଚଢ଼େଇଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଛୁଦ୍ର, ଲଞ୍ଜ ଲମ୍ବା । ଏ ପକ୍ଷୀଟି ଘାସ ଓ ସାନ ସାନ ବୁଦା ଝାଟି ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଗୁଳ୍ମପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟାନରେ ବାସକରେ । ଏହାର ପିଠି ପାଖର ବର୍ଣ୍ଣ ଡାଲୁଚିନି-ବାଦାମି ରଙ୍ଗର, ପେଟ ପାଖ ଧଳା । ଆଖି ହଳଦିଆ । ଆଖି ଗୁରୁ ପାଖର ଅଂଶ ସ୍ପଷ୍ଟ କମଳାଲେମ୍ବୁ ପରି ହଳଦିଆ, ଅନ୍ୟ କୁଣ୍ଡାଖାଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରି ହଳଦିଆଖିଆ କୁଣ୍ଡାଖାଇ ସାଧାରଣତଃ ଛୁଦ୍ର ଛୁଦ୍ର ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ କଣ୍ଟାବୁଦା, ଝାଟି ଓ ଉଚ୍ଚ ଘାସ ଜଙ୍ଗଲ ବା ଗୁମ୍ଫା ଜମି ଓ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରୁଷ ବୁଦବୁଦିଆ ଭୃଗୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାନ୍ତି । ପ୍ରତି ଦଳରେ 5ରୁ 7ଟି ଯାଏ ପକ୍ଷୀ ଥାନ୍ତି । ବୁଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଜାତିପତଙ୍ଗ ଖୋଜନ୍ତି । ଏ ସମୟରେ ସେମାନେ ଘାସର ଡେମ୍ଫ ଉପରେ ଚଢ଼ିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଭାବରେ ଡେମ୍ଫ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଭାବୁ କଡ଼ିକିଆ ଜାବୁଡ଼ି ଧରନ୍ତି ଓ ଗଙ୍ଗା ଚଢ଼େଇ (Tit) ପରି ଏକେବାରେ ଓଲଟା-ବାଗିଆ ଧରି ରହୁଥାନ୍ତି । ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବା ଗୋପନରେ ପଳାଇ ଯିବାରେ ସେମାନେ ବେଶ୍ ଧୂରନ୍ତି । ଉତ୍ତର ସୂଚନା ପାଇଲେ ହଳଦିଆଖିଆ କୁଣ୍ଡାଖାଇ ଗୋଟିଏ ବୁଦାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୁଦାକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଓ ଗୁଳ୍ମମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଯାଏ । ଏତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକପ୍ରକାର ଚପା କର୍କଶ ଉଦ୍‌ବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଡାକ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଉଚ୍ଚ ଓ ଏକପ୍ରକାର ଗୋକାବହ ବା ଖେଦପୂର୍ଣ୍ଣ “ଚପ୍-ଚପ୍ ଚପ୍” । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀ କୌଣସି ଖୋଲି ଜାଗା ଯଥା ବୁଦାର ଉପର ଅଂଶ ବା ଘାସ ଡେମ୍ଫର ଉପର ଅଂଶରେ ବସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଵରରେ ସୁନ୍ଦର କିରମିକିରି ଶବ୍ଦ କରେ । ମାଙ୍କଡ଼ସା, ଝିଣ୍ଟିକା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିପତଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଆହାର । ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଜୀବନମାନଙ୍କ ପରି ହଳଦିଆଖିଆ କୁଣ୍ଡାଖାଇ ଫୁଲର ମଧୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ । ଏମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଉଡ଼ୁଳ ଫୁଲ ଯଥା ଶିମିଳ (Silk cotton tree) ଓ ପାଳଧୁଆ (coral) ଗଛର ଫୁଲରୁ ମଧୁ ଖାନ୍ତି । ହଳଦିଆଖିଆ କୁଣ୍ଡାଖାଇର ମାତ୍ର ଏକ ଗହ୍ୱରିଆ କପ୍ ପରି । ଏହା ରୁଷ ଘାସରେ ଦିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଇନ୍ଦର ପାଖରେ ସୁନ୍ଥ ଘାସ ଥାଏ ଓ ବାହାର ପାଖ

ବୃକ୍ଷାଣୀ ଜାଲରେ ଭଲ ରକମ ଲେସା ହୋଇଥାଏ । ବୃଦ୍ଧାର ଆକୃତି ପରି ଅଂଶରେ ଜାଡ଼ ରହିଥାଏ । ତା' ନହେଲେ ଦୁଇ ଘାସ ଡେମ୍ଫ ମଝିରେ ବା ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାବେଳେ ଉଠୁଥିବା ଗଛ ମଝିରେ ନାବକମାନଙ୍କର ଦୋହଲମାନ ଶଯ୍ୟାପରି ଝଲୁଥାଏ । ଏହି ସାଧାରଣତଃ ଭୂମିଠାରୁ ଦୁଇମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ନଥାଏ । ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ଥରକେ ୪ଟିରୁ ୫ଟି ଯାଏ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି, ଅଣ୍ଡାର ବର୍ଣ୍ଣ ହଳଦିଆ ଧଳା । ତା' ଉପରେ ବାଇଗଣି ରଙ୍ଗର ସୁନ୍ଥ ଛଟା ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ସାତଭୟା ବା କୁଣ୍ଡାଖାଇ (ବର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ୮୧)—ଏହାକୁ ଇଂରେଜରେ “ଜଙ୍ଗଲ କୁଣ୍ଡାଖାଇ” (Jungle babbler) କହନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ “ଟୁରଡ଼ୱାଇଡ଼େସ୍ ଟ୍ରାଏଟାସ୍” (Turdoides striatus) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ—ସାତ୍ ଭାଇ, ଦୋଘାଇ । ଏହା ମାଟି ପରି ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର, ଦେହ ଉପର ରୁକ୍ଷ ଓ ଶରୀରୀକ । ଦେଖିବାକୁ ଅସୁବୁରୁ ଓ ବଣି ଚଢ଼େଇଠାରୁ ଅଳ୍ପ ସାନ । ଲଞ୍ଜ ଲମ୍ବା ଓ ମନେହୁଏ ଯେପରିକି ଲଞ୍ଜ ପରି ଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ ପଛପଟେ ଗୁଞ୍ଜିଦେଇଛି । ଏମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଛଅ ବା ସେହିପରି ପକ୍ଷୀ ଥାନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପକ୍ଷୀର ନାମ ଇଂରେଜରେ ‘ସାତ ଭଉଣୀ’ (“Seven sisters”), ହିନ୍ଦୀରେ ସାତ ଭାଇ ଓ ଓଡ଼ିଆରେ ସାତଭୟା ହୋଇଅଛି । ସାତଭୟା ଜଙ୍ଗଲର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ସହର ଓ ଗ୍ରାମର ନିକୃଷ୍ଟ ଓ ହତା (କମ୍ପାଉଣ୍ଡ)ମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଏମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିବା ପତ୍ରତଳେ ଜାଟପଟମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର କରି ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଜଙ୍ଗଲରେ ଜାଟଭେଣ୍ଟା ପକ୍ଷୀମାନେ ମିଶି ଦଳବାର ଶିକାରରେ ବାହାରିଥିଲେ ତା' ଭିତରେ ସାତଭୟା ପକ୍ଷୀ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ନେଇଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ସାତଭୟା ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥାହେଲେ ପରି ଅବରତ କକଣ ସ୍ଵରରେ ଗାତ୍ର ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଅବଶ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନୈକ୍ୟ ହୁଏ । ଫଳରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଵରରେ ବିତଣ୍ଡା ଓ ତା'ପରେ ନଖ ଓ ଅଣ୍ଟାଦ୍ଵାରା ହାତାହାତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ । ଏ ଧ୍ରୁାଧ୍ରୁିରେ ପରି ଛୁଟି ଏଣେତେଣେ ଉଡ଼େ । ତା'ପରେ ଅବଶ୍ୟ ଶାନ୍ତ ପଡ଼େ । ଅବଶ୍ୟ ଏଭଳି କଲହ ବେଶି ହୁଏନାହିଁ, ହେଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସବୁ ମିଟମାଟ ହୋଇଯାଏ । ବହୁ ଶତ୍ରୁଦ୍ଵାରା ବିପଦ ଆସିଲେ ସାତଭୟା ଦଳ ଏକାଠି ସଂଘବଳ ହୋଇ ତାର ମୁକାବଲ କରନ୍ତି । ବିଲେଇ ବା ବାଜ-ପକ୍ଷୀ (Hawk) ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ପିଚ୍ଛ ଧାଇଁଲେ, ଦଳର ଅନ୍ୟମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ

ତା'ର ସାହା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଦାମ୍ଭିକତା ଓ ସ୍ଥିର ସଙ୍କଳ୍ପତା ସହ ଆଗଭର ହୋଇ ଉଡ଼ି ସ୍ବରରେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି । ଶେଷରେ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ପଳାଇଯାଏ । ବୁଢ଼ି ଆଣି, ଅସରପା, ମଥ (moth), ଅନ୍ୟ ଗାଈପତଙ୍ଗ ଓ ସେସବୁର ଶୁକ୍ର ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଆହାର । ବର ଓ ଓସ୍ତ ଗଛର ଫଳ, ନାଗଫଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛର ଫଳ, ମଞ୍ଜି, ବାଜ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଖାନ୍ତି । ଶିମିଳି ଓ ପାଲଧୁଆ ଗଛର ଫୁଲରୁ ମଧୁ ଖାଇବାକୁ ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲପାନ୍ତି । ଏଣୁ ଏହି ଗଛମାନଙ୍କରେ ପର-ପରାଗ ସଙ୍ଗମରେ ବିଶେଷ ସହାୟତା କରନ୍ତି । ଏମାନେ ପତ୍ରଥବା ଗଛର ଦୁଇଶାଖ ବାହାରଥବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ନାଡ଼ ରଚନା କରନ୍ତି । ଏହା କପ୍ ଭଳି ଡିଲ୍‌ଭାବେ କାଠି ଓ ତେରମୂଳରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ନାଡ଼ ସାଧାରଣତଃ ଭୂମିଠାରୁ ୩ରୁ ୫ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ରହୁଥାଏ । ଥରକେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାନ୍ଦି ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । ଅଣ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ନୀଳମଣି ପରି ସୁନ୍ଦର ନୀଳ ରଙ୍ଗର । ପିତାମାତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ 'ଭ୍ରାତୃସଙ୍ଗ'ର ଅନ୍ୟମାନେ ନାଡ଼ ରଚନା ଓ ଶାବକମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆସି ସହଯୋଗ କରିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ସାଧାରଣ ପ୍ରଥା ହୋଇଥାଇପାରେ । ସାତଭୟା ପକ୍ଷୀର ନାଡ଼ରେ ପାପିୟା ଚୂତକ (Pied crested cuckoo) ଓ ପାପିୟା (Hawk cuckoo) ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ନୀଳମଣି ପରି ନୀଳ ।

ଚଲଚଲ୍ (ବର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର 82)—ସାତଭୟା ପକ୍ଷୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ହେଲା ଚଲ୍ ଚଲ୍ । ଏହାର ଇଂରାଜି ନାମ “ସାଧାରଣ ସାତଭୟା” (Common babbler) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ “ଟୁରଡ଼ୋଇଡେସ କଡାଟାସ” (Turdoides caudatus) । ହିନ୍ଦି ନାମ—ଡୁମ୍‌ଗି, ଚଲ୍‌ଚଲ୍ । ଏହା ଆକାରରେ ଗୋବରା ଚଢ଼େଇ ପରି ହେବ, ମାତ୍ର ଏହାର ଲଞ୍ଜ ଲମ୍ବା । ସାତଭୟାଠାରୁ ଏହା କୃଶ । ସାତଭୟା ପକ୍ଷୀପରି ଚଲ୍ ଚଲ୍ ଏକାଠି ଛଅଟି ବା ସେହିପରି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ କଣ୍ଟାଲିଆ ବୁଦାମୂଳେ ଭୂମିରେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ବେଷଣ କରିବାର ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଏହାର ପିଠିର ବର୍ଣ୍ଣ ମାଟିପରି ବାଦାମୀ ଓ ତା' ଉପରେ ଦଳରେଖା ଚନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ିଥାଏ । ଲଞ୍ଜ ଲମ୍ବା ଓ ପରସ୍ପରିକ ହୃଦ୍‌ଲୀଭାବେ ଲାଗିଥିବା ପରି ମନେହୁଏ । ତା' ଉପରେ ଆଡ଼ବାଗରେ ସୁଷ୍ଟ ଗାଢ଼ ରେଖା ଚନ୍ଦ୍ରଥାଏ । ଦଳ ଦଳ ଚଲ୍ ଚଲ୍ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୁଣ୍ଡା ପରି ଭୂମି ଉପରେ ଗଲ୍‌ଲତାର ବାଡ଼, କଣ୍ଟା ଗଛର ବୁଦାଝାଟି, ବଣ ଭିତରେ ଦୁର୍ଭବଦକ୍ଷେପରେ ରହୁ ରହୁ, ଡେଇଁ ବୁଲି ଗାଈପତଙ୍ଗ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଖୋଜିବାରେ କଟାନ୍ତି । ସେମାନେ ଉଡ଼ିବାକୁ ପରାମ୍ପରା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଓ ଭୟଭୀତ

ହେଲେ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ବା ଏ ବୁଦାରୁ ସେ ବୁଦାକୁ ଯିବାପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଛିପ୍ପ ପତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଉଡ଼ୁ ଉଡ଼ୁନ ଦୁର୍ବଳ । ଗୋଲକାର ପକ୍ଷକୁ କେତେଥର ଦୁଇବେଗରେ ସଞ୍ଚାଳନକରି ତା'ପରେ ବିସ୍ଫାରିତ ପକ୍ଷ ଓ ଲଞ୍ଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ପବନରେ ଭାସି ଭାସି (ଗ୍ଲାଇଡ୍) ଗତିକରନ୍ତି । ବିଲେଇ ବା ସାପ ଦେଖି ଉଦ୍ବେଗିତ ହେଲେ ସେମାନେ ସ୍ଵାୟତ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ସହ ପକ୍ଷ ଓ ଲଞ୍ଜକୁ ଟାଣିଲିପରି ଦୋହଲାଇ ଏବୁଦାରୁ ସେବୁଦାକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗୀତମୟ ସ୍ଵସ୍ଵରପରି ହୁଇର୍-ହୁଇର୍-ହୁଇର୍ ଟ-ଟ-ଟ-ଟ-ଟ-ଟ-ଟ... ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏତେବେଳେ ଦଳର ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଵରରେ ବିଶ୍ଵାଙ୍ଗ ଭାବେ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି ଓ ବୁଦାରୁ ବୁଦାକୁ ଡେଇଁଲେବେଳେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ କେଉଁବାଟେ ଯାଉଛି, ଅନାଇ ଦେଖୁଥାନ୍ତି । ମାଙ୍କଡ଼ସା, ଜୀବତକ, ଯାନ ସାନ କୋଳି, ମଞ୍ଜି, ଶସ୍ୟ ଗଜ ଓ ଫୁଲର ମଧୁ ଚିଲ୍ ଚିଲ୍ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନଖାଦ୍ୟ । ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଟାଲିଆ ବୁଦାରେ ଏମାନେ ସଫାସୁତରା ମାଡ଼ ରଚନା କରନ୍ତି । ତାହା କମ୍ ପରି ସୁସ୍ଥ, ତେର ଓ କାଠିରେ ଘିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭୂମିଠାରୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ରହୁନଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଘନୋଟିରୁ ଗୁରୋଟି ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । ତାହା ସାତଭାସୁ ଓ ଭଇନା (Large Grey babbler) ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଟା ପରି ଚକ୍‌କଣ, ମାଳମଣି ପରି ମାଳ । ପାପିୟା ଗୁଡ଼ିକ (Pied crested Cuckoo) ଓ ପାପିୟା (Hawk Cuckoo) ପକ୍ଷୀ ଚିଲ୍ ଚିଲ୍ ବସାରେ ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । ଏହି କୋଇଲି ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ମାଳମଣି ପରି ଚକ୍‌କଣ ମାଳ ।

ଭଇନା—ଏହି ପକ୍ଷୀଟି ଚିଲ୍ ଚିଲ୍ ପକ୍ଷୀର ଜ୍ଞାତ । ଏହାର ଇଂରେଜୀ ନାମ ‘ବୃହତ୍ ଧୂସର ସାତଭାସୁ’ (Large Grey babbler) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଟୁରଡେଇଡେସ ମାଲକାଲମି’ (Turdeides malcalmi) । ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ଚିଲ୍ ଚିଲ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ଧୂସର ବାଦାମି । ଲଲଟ ପ୍ରଦେଶ ଧୂସର । ବାହାରଆଡ଼କୁ ଥିବା ଲଞ୍ଜ ଧଳା । ଉଡ଼ୁ ଥିବା ସମୟରେ ଲଞ୍ଜ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହୁଥିବାରୁ ପରର ଧଳା ଅଂଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ । ଭାରତୀୟ ଉପଦ୍ଵୀପର ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଇନା ଏକ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ । ବିଶେଷକରି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଉପତ୍ୟକା (Deccan plateau)ରେ ଏହି ପକ୍ଷୀ ବେଶି ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାଏ ।

ଟିକି ଚଢ଼େଇ (Warbler) ମାନେ ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀ । ଏମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ସେତେ ଚକଚକିଆ ନୁହେଁ । ଏମାନେ ଆକାରରେ ଘରଚଟିଆଠାରୁ ସାନ ହୁଅନ୍ତି । ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ସମଷ୍ଟିଠାରୁ କେଉଁ କେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଯୋଗୁ ଭିନ୍ନ ତାହା



ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କଷ୍ଟକର । ଅନେକ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆବାସିକ; ପୁଣି ଅନେକ ପ୍ରବାସୀ । ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସିଲଭିନିଡ଼ (Sylviniidae) ପକ୍ଷୀବଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ନିମ୍ନଲିଖିତ ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବଂଶର ସାଧାରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରେ ।

ଟିକି ଚଢ଼େଇ (ବର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ୫୩)—ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ପାଇଁଶିଆ ରେନ୍-ଓର୍ବର’ (Ashy wren-warbler) । ଏହାର ହୃଦ ନାମ ଫୁଟକି (ହୃଦରେ ଅଧିକାଂଶ ଓର୍ବରବର୍ଗର ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଫୁଟକି ବୋଲି କହନ୍ତି) । ଏହାର ପିଠି ପାଖ ପାଇଁଶିଆ ଶିଳଟ ରଙ୍ଗର, ପେଟ ପାଖ ଫିକା ହଳଦିଆ ଧଳା । ଲଞ୍ଜ ଡିଲ୍, ଲମ୍ବା, ଅଂଶଜାତି (ବିମରଣିତ—graduated) ଏବଂ ଅଗ୍ରଭାଗ କଳା ଧଳା ଚନ୍ଦ୍ରିତ । ଲଞ୍ଜ ଉପରଆଡ଼କୁ ଡେଇଁ ଡୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ମୁହଁମୁହାଁ ଉପର ତଳ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥାଏ । ଶୀତଋତୁରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ପରର ବର୍ଣ୍ଣ ବାଦାମିଆସିଆ ହୋଇଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍ ପାଇଁଶିଆ ଅଂଶ କମିଯାଏ । ବୁଦା, ଲତା ଗୁଲୁଥିବା ଓ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜଳସେଚିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟାନମାନଙ୍କରେ ଏମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । ଏହା ଲଜକୁଳା ସ୍ୱଭାବର ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଲଞ୍ଜକୁ ଡେଇଁ କର ଟେକି ବୁଦା ଲତା-ଗୁଲୁତଳେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯୋକ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଶୁକ ଖୋଜି ଚାଲୁଥାଏ । ଏତେ ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ “ଟିକି-ଟିକି-ଟିକି” ଡାକ ଦିଏ । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଅଣ୍ଡା ଚଢ଼େଇ ବାରମ୍ବାର କୌଣସି ବୁଦାର ଉପର ଅଂଶ ବା ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିବା ଶାଖା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଉଜସ୍ୱରରେ ଚୁହାକୁ ଚୁହା ଡାକଦିଏ । ସେ ଉତ୍ତେଜିତ ଭାବେ ଏପଟ ସେପଟ ଡାଆଁ ମାରେ, ଲଞ୍ଜକୁ ଉପର ତଳ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ ଓ ପକ୍ଷ ଝାଡ଼େ । ଲଞ୍ଜର ଧକେଇ ତକେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ମନେହୁଏ ଯେପରିକି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟ ଓ ସେ ତାକୁ ବୋହୁ ପାରୁନି । ମାତ୍ରରେ ବସିଥିଲାବେଳେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ହଠାତ୍ ବିପଦର ସୂଚନା ପାଇଲେ ବାହାରି ଆସି ଗୁରୁପଟେ ଉତ୍ତେଜିତ ଭାବେ ଜାଗାକୁ ଜାଗା ଉଡ଼ି ଏକ ପ୍ରକାର “କିଟ୍-କିଟ୍-କିଟ୍” ଶବ୍ଦକରେ । ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକପରି ଶବ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି; ମାତ୍ର ଏ ଶବ୍ଦ କିପରି ଜାତ ହୁଏ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ । ବୁଦୁଆ ଝୁଲୁଙ୍ଗପରି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ଷଣ ଶବ୍ଦ ହୁଏ । ଲଞ୍ଜର ପରକୁ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଫଳରେ ଏପରି ଶବ୍ଦ ହେଉଥିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ଟିକି ଚଢ଼େଇର ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ (Tailor bird)ର ମାତ୍ର ପରି । ପତ୍ରକୁ ମୋଡ଼ି ସିଲାଇ କରି ଚୁଙ୍ଗୀ (funnel) ପରି ଏହି ମାତ୍ର ରଚିତ ହୋଇଥାଏ; ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ବଡ଼ ଓ ନମନାୟ ପତ୍ର ମାତ୍ର

ରଚନାକରିବା ପାଇଁ ମିଲେନାହିଁ, ସେ ଛୁଲରେ ନାଡ଼ ପଇସାରଖା ମୁଣିପରି ଆୟତାକାର (Oblong) ହୋଇଥାଏ ଓ ଜଳଦ୍ୱାରା ବୁଣା ହୋଇଥାଏ; ‘ଆଉ ତା’ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଆଣୀ ଜାଲଦ୍ୱାରା ମୋଡ଼ାହୋଇ ସାନ ସାନ ପତ୍ର ଦିଆଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଭୂମିଠାରୁ 1½ ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ନାଡ଼ ରହିଥାଏ । ଅରକେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଡିନୋଟିରୁ ଚାରିଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ । ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ଚିକ୍‌କଣ ଓ ବାଦାମି-ଲୁଲ । ତାର ଓସାରଆପଟର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଏକ କଳା ମୁଦିପରି ଚିହ୍ନ ଥାଏ ।

ଫୁଟ୍‌କ—ଏହାର ଇଂରାଜି ନାମ “ଭରଗ୍‌ସ୍‌ ରେନ୍-ଓ’ରବଲର” (Indian wren-warbler) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ “ପ୍ରିନିଆ ସବ୍‌ଫ୍ଲାଭା” (Prinia subflava) । ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ମାଟିଆ ବାଦାମି ଆସିଥା, ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଶାଢ଼କାଳୀନ ବର୍ଣ୍ଣପରି । ଅବଶ୍ୟ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଲଞ୍ଜର ଅଗରେ କଳା-ଧଳା-ହଳା ଥାଏ, ମାତ୍ର ଫୁଟ୍‌କର ସେପରି ଚିହ୍ନ ନଥାଏ । ତା’ ଗୁଡ଼ି ଫୁଟ୍‌କ ଅଧିକ ଶୁଷ୍କ ଓ ଅଳ୍ପ ଜଳସ୍ୱାଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସକରେ ।

ଦକ୍ଷି ଟିକି ଚଢ଼େଇ (ବର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର 84)—ଆମ ଦେଶରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବାସକରନ୍ତି ତା’ ଭିତରେ ଦକ୍ଷି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସବୁଠାରୁ ବେଶି ଖ୍ୟାତ ଲାଭ କରନ୍ତି । ଏହାର ଇଂରାଜି ନାମ “ଦକ୍ଷି ଚଢ଼େଇ” (Tailor bird) ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ “ଓର୍ଥୋଟୋମସ୍ ସୁଟୋରିୟସ୍” (Orthotomus sutorius) । ସୁନାମ-ଧନ୍ୟ ଇଂରେଜ ସାହାଯ୍ୟକ କିପ୍ଲିଙ୍ଗ (Kipling) ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣାତ “ଜଙ୍ଗଲ୍ ବବରଣୀ” (“Jungle Book”) ବହିରେ “ଦକ୍ଷି” ପକ୍ଷୀର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ହିନ୍ଦରେ ଏହି ପକ୍ଷୀକୁ ‘ଦକ୍ଷି’ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି । ଏହା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଫୁଲ୍‌ବାଳ ଧରଣୀ । ଏହାର ପିଠିପାଖ ଗାଡ଼ ଝରୁକ, ପେଟ ପାଖ ଧଳା, ମସ୍ତକ କଳଙ୍କ-ବାଦାମି । ଲଞ୍ଜ ଆଡ଼ମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଡେଇଁଥିବା ହୋଇ ଉଠି ରହିଥାଏ । ଲଞ୍ଜର ମଧ୍ୟମ ପକ୍ଷ ଲମ୍ବା ଓ ପିନ୍ କଣ୍ଟାପରି ଗୋଜିଥା । ଏହା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଓ ଉଦ୍ୟାନମାନଙ୍କରେ ଏକାକୀ ବା ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସହର ଓ ମଫସଲ ସବୁଠି ଦକ୍ଷି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହା ଶାନ୍ତ ଓ ସରଳ ଏବଂ ନିର୍ଭୟରେ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିବା ବଙ୍ଗାଳା ଘରର ବାରଣ୍ଡାକୁ ଆସି ଲୋକ ବସିଥିବା ସ୍ଥାନଠାରୁ ଅଳ୍ପ କେଇ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ସୁତା ଟିକେ ବା ତୁଳା ଟିକେ ଅଣ୍ଟରେ ଧରି ନାଡ଼ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ନେଇଯାଏ । ନଚେତ୍ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ଜାଲରେ ମାଡ଼ିଥିବା ଲତା ଏବଂ ଫୁଲକୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ଗଛରୁ କାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ । ଏହା ଉଦ୍ୟାନରେ

ମନ ଥାନାରେ “ଟୋଉଇଟ୍-ଟୋଉଇଟ୍-ଟୋଉଇଟ୍” ବା “ପ୍ରେଟି-ପ୍ରେଟି-ପ୍ରେଟି”  
 ବାବଦରେ । ଉପନଗର (Suburban) ଅଞ୍ଚଳର ଉଦ୍ୟାନମାନଙ୍କରେ ଏହାର ସ୍ବର  
 ସହଜ ଅନେକେ ପରିଚିତ ଥିବେ । ଅନ୍ୟ ଟିକି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପରି ଏହାର ପ୍ରଧାନ  
 ଆହାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖାଦ୍ୟ ପତଙ୍ଗ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଓ ଶୁକ । ଉନ୍ମୁଳବର୍ଣ୍ଣ  
 ଫୁଲରୁ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲପାନ୍ତି । ଏଣୁ ପାଲଧୁଆ ଓ ଶିମିଳି  
 ଗଛର ଫୁଲରୁ ଏମାନେ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଦର୍ଜି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତାର  
 ଅସାଧାରଣ ମାତ୍ର ରଚନା କୌଶଳପାଇଁ ଖ୍ୟାତ ଲୋକଜଣିତ । ପକ୍ଷୀମାନେ କପରି  
 ନିୟୁତ ଭାବେ ମାତ୍ର ରଚନାକରନ୍ତି, ତା’ର ଉଦାହରଣ ଦର୍ଜି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବସାରେ  
 ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହାର ମାତ୍ର କେତେକଟା କପ୍ ପରି । ଏହା ନରମ ତନ୍ତୁ, କେଶ,  
 ତୁଳା ଓ ଅତି ସ୍ବଦୁ ଉର୍ଜିତ ରୁଆରେ ଘିଆର ହୁଏ । ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଯେ, ଗୋଟିଏ  
 ଓସାରଥା ସବୁଜ ପତ୍ରକୁ କାହାଳି ପରି ମୋଡ଼ି ତା’ କଡ଼ ସିଲେଇ ହୋଇଥାଏ ଓ ତା’  
 ଭିତରେ ମାତ୍ର ରହୁଥାଏ । ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ପତ୍ର ନମିଳିବା ପୁଲେ ଦୁଇଦିନୋଟି ପତ୍ରକୁ  
 ମୋଡ଼ି ସିଲାଇ କରାଯାଇଥାଏ । କଡ଼ ସିଲାଇ କରିବା ପାଇଁ ତୁଳା ବା ସୁସ୍ଥ ଉର୍ଜିତ  
 ରୁଆକୁ ମୋଡ଼ି ସୂତାରୁପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ,  
 ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଗୁ ପତ୍ର କାଳେ ଫିଟିଯିବ ଏଥିପାଇଁ ଶେଷ ଅଂଶରେ ଚତୁରଭାବେ  
 ସୂତାକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଯାଇଥାଏ । ଦ୍ରବେଣ ଦ୍ବାର ଗୁଢ଼ମ (ପୋର୍ଟ) ଓ ବାରଣ୍ଡାରେ ଫୁଲ  
 କୁଣ୍ଡ ବା ଅନ୍ୟ ଭାବେ ରହୁଥିବା ଲମ୍ବା ପତ୍ରବାଲି ଗଛ ଯଥା : ଟୋଟନ, ଡିମିରି ବା  
 ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଗଛରେ ଦର୍ଜି ଟିକିଚଢ଼େଇ ମାତ୍ର ରଚନାକରେ । ସାଧାରଣତଃ ମାତ୍ର  
 ଭୂମିଠାରୁ ଏକ ବା ଦୁଇ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ରହୁ ନ ଥାଏ । ଥରକେ ଏହା ଛନ୍ଦି  
 ଚାରିଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ । ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ଲାଲଆସିଆ ବା ମାଲଆସିଆ ଧଳା । ତା’ ଉପରେ  
 ସାଧାରଣତଃ ବାଦାମି ଲାଲରଙ୍ଗର ଛଟା ଦାଗ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ମକ୍ଷିଧାରକ (flycatcher) ଚଢ଼େଇ “ଟୁରଡିନି” (Turdinai) ପକ୍ଷୀ  
 ଉପବିଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ, କସ୍ତୁରୀ (Thrush), ସୁଇ (Rubin) ଓ ଚାଟ୍ (chat) ପକ୍ଷୀ  
 ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପବିଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ।

ଦୟାଲ (ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର 85)—ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ‘ଦହଗିଲା’ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ।  
 ଇଂରାଜି ନାମ “ମେଗପାଇ ରବିନ” (Magpie Robin) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ  
 “କପ୍ସାଇସ ସାଉଲାରୀ” (Cupsychus saularis) । ହିନ୍ଦୀନାମ ଦକୟାର,  
 ଦକୟା । ଏହା ଅମର ଏକ ସାଧାରଣ ପରିଚିତ ପକ୍ଷୀ । ଅଣ୍ଡା ପକ୍ଷୀ ବେଶ୍ ପରିଷ୍କାର

ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କଳା-ଧଳା ପକ୍ଷୀଟିଏ । ଲଞ୍ଜ ସାଧାରଣତଃ ତେରନ୍ତୁ ହୋଇ ଉପକ୍ଷୀଆଡ଼କୁ ରହୁଥାଏ । ମାଛ ପକ୍ଷୀର କଳା ଅଂଶ ବାଦାମି ଓ ଶିଳିଟ ପରି ଧୂସର । ଦୟାଲ ପକ୍ଷୀ ଏକାଠି ବା ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ପତଳା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସକରନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟ ବାସ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ । ପ୍ରଜନନ ରତ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ରତ୍ନରେ ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀ ଧୀର, ଅଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧାବ୍ୟକ୍ତି ଲତାତଳେ ଗୋପନରେ ବୁଲୁଥାଏ ଓ ମଝିରେ ମଝିରେ ଶୋକାବହ “ସୁଇ-ଇ” ବା କର୍କଶ “ତ୍ର-ର ତ୍ର-ର” ଶବ୍ଦକରେ; ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଷ୍ଟରତ୍ନ ଆଗମନରେ ତା’ର କଣ୍ଠ ଫିଟିଯାଏ ଓ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାୟକ ପକ୍ଷୀରୂପେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରେ । ତା’ର ଫିଟିଫାଟ୍ ଚକ୍ଷୁକ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସାଙ୍ଗକୁ, ସେ ତା’ ଇଲ୍ଲକା ଭିତରେ କୌଣସି ପତ୍ରସ୍ଥାନ ଗଛର ଉପର ଡାଳ ଅଥବା ଉଦ୍ୟାନ ବା ଘରର ଫାଟକ ଉପରେ ବସି ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଚୁହାକୁ ଚୁହା ସୁଉଚ ସଙ୍ଗୀତ-ଲହରୀଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଆଡ଼ି ପ୍ରକାଶିତ କରେ । ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଶାମା ପକ୍ଷୀ (Shama)ର ସଙ୍ଗୀତ ପରି ସବୁଠାରୁ ମନମତାଣିଆ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଦୂରକୁ ଝଙ୍କିତ ହୁଏ । ଗୀତ ଗାଇଲାବେଳେ ଲଞ୍ଜ ଅଳ୍ପ ଖୋଲି ରହେ ଓ ତଳକୁ ଦିବ ରହେ; ମାତ୍ର ସ୍ୱର-ଲହରୀ ସହଜ ତାଳ ଦେଲପରି ମୁହଁମୁଁହୁଁ ଦୋଳାୟନ ଭଙ୍ଗୀରେ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଧକେଇ ଚଢ଼େଇ ହୁଏ ଓ ଫିଟିଯାଏ ଧୂଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ସବିଶ୍ୱସ ସାରାଦିନ ଓ ବେଶ୍ ଅନ୍ଧାର ହେଲାଯାଏ ସଙ୍ଗୀତ ଚାଲିଥାଏ । ନିଜ ଇଲ୍ଲକାରେ ଦଖଲସ୍ୱର ଜାହର କଲାବେଳେ ଓ ପ୍ରଜନନ ରତ୍ନରେ ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବାଦପ୍ରିୟ । ମାଛ ପକ୍ଷୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ଇଲ୍ଲକା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପକ୍ଷୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇ-ଦେବା ଲାଗି ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ । ସେ ଲଞ୍ଜର ପକ୍ଷକୁ ମେଲ କରି ପିଠି ଉପରକୁ ବଙ୍କାଇ ଦିଏ, ଗୁଡ଼ି ଅଂଶକୁ ହାସ୍ୟକର ରୂପେ ଫୁଲୁଏ, ଅଣ୍ଟାକୁ ଆକାଶଆଡ଼କୁ ତୋଳିରଖେ ଏବଂ ଦେହକୁ କଠିନ କରି ସଙ୍ଗରେ ପଦଚରଣା କରି ମୁଣ୍ଡ ନାଡ଼େ । ଦୟାଲ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାଟଭେଜା । ଅବଶ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କୋଳି ଜାତୀୟ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖାନ୍ତି । ଗାଡ଼ବର୍ଣ୍ଣର ଫୁଲ, ଯଥା : ଶିମିଳି ଓ ପାଳଧୁଆ ଗଛର ଫୁଲ ପ୍ରତି ସଦାବେଳେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେମାନେ ସେଥିରୁ ମଧୁ ପାନ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଘାସ, ଚେରମୂଳ, କେଶ ପ୍ରଭୃତିରେ ଗହପରି ନାଡ଼ି ରଚନା କରନ୍ତି । ଏହା ଗଛ ଓ କାନ୍ଥର ଖୋଲ, ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଇପର ଉପର ଅଂଶ ବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବଡ଼ଖୁଣ୍ଟର ଉପର ଅଂଶରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ । ଗଛ ଉପରେ ବାକ୍ୟ କରି ଥୋଇ ଦେଲେ, ସେମାନେ ସେଥିରେ ଆସି ବସା ଦିଆନ୍ତି କରନ୍ତି । ଥରକେ ଦିନୋଟିରୁ ପାଞ୍ଚଟି

ଅଣ୍ଡା ଯିଅନ୍ତି । ଏହା ଫିକା ନଳ ସବୁଜ । ତା’ ଉପରେ ଲାଲ-ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗରେ ଛଟା ଓ ଗୁପ୍ତଗୁପ୍ତ ଦାଗ ପଡ଼ିଥାଏ ।

**ଶାମା** (ବର୍ଣ୍ଣପତ୍ର 86)—ଇଂରାଜୀରେ ଏହାର ନାମ ମଧ୍ୟ “ଶାମା” (Shama) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ “କୋପ୍‌ସାଇକାସ ମାଲବାରିକାସ” (*Copsychus malabaricus*) । ଶାମା ଦୟାଲପକ୍ଷୀର ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରଦାନିୟ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନାହିଁ । ସହରବାସୀମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଜାତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗାୟକ ପକ୍ଷୀ ଭାବେ ଆଦରର ସହୃଦ ପାଳିଥାନ୍ତି । ଏହାର ପିଠି ପାଖ କଳା । ଲୁହ ଲମ୍ବା ଓ କଳା ଧଳା ରଙ୍ଗ ମିଶା । ପିଠି ପାଖର ପଛ ଆଡ଼କୁ ଲୁହର ଠିକ୍ ମୂଳ ଅଂଶରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧଳା ଅଂଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ପେଟ ପାଖର ରଙ୍ଗ କଳଙ୍କି-ବାଦାମୀ । ଶାମାପକ୍ଷୀ ବେଳେବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳ ନିକଟସ୍ଥ ଗୁଚ୍ଛଗୁଚ୍ଛ ଆସି ବେଶ୍ ଜଙ୍ଗଲିଆ-ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥାଏ । ବମ୍ବେ ସହରର ମାଧେଗନ୍ଦ ଅଞ୍ଚଳ ଏହିପରି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ । ସେଠାକୁ ଶାମା ଚଢ଼େଇ ଆସି ଗ୍ରୀଷ୍ମ କଟାଇବା ଲାଗି ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତାର ସୁନ୍ଦର ଗାନଦ୍ୱାରା ମୋହକରେ ।

**କଳାଗୁଟ** (ବର୍ଣ୍ଣପତ୍ର 87)—ଏହାର ଇଂରାଜୀ ନାମ “ପିଡ଼ ବୁଶ୍‌ଚାଲ ବୁଟ୍ ପକ୍ଷୀ” (Pied Bushchal) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ “ସାକ୍ସିକୋଲା କାପ୍ରାଟା” (*Saxicola caprata*) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ କାଲ ପିଡ଼ା । ଏହାର ଆକାର ପ୍ରାୟ ଘରଟିଆ ପରି । ଅଣ୍ଟିର କଳାଗୁଟ ଯିପଣ୍ଡ କଳା । ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପିରୁ, ତଳ ପେଟ ଓ ପକ୍ଷରେ ଚକଚକିଆ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଅଂଶ ଅଛି । ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ପକ୍ଷର ଧଳା ଅଂଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ । ମାଛ କଳାଗୁଟର ବର୍ଣ୍ଣ ମାଟିପରି ବାଦାମୀ ଓ ପିରୁ ଅଂଶ କଳଙ୍କିବାଦାମୀ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଠାଏ ଠାଏ ନିବାସୀ ପକ୍ଷୀ ବା ଶୀତକାଳରେ ଆଗନ୍ତୁକ ପକ୍ଷୀ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଅଲଗା ଭାବେ ଯୋଡ଼ିହୋଇ ରହୁଥିବାରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ଯୋଡ଼ିଏ କଳାଗୁଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । ଖୋଲା ବଞ୍ଚିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଗୁଚ୍ଛନି ନିକଟରେ ବୁଦ୍ଧା ଉପରେ ବା ଶର ବା ନଳ ଗଛ ଉପରେ ଏମାନେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ତଳକୁ ଭୂମିକୁ ଉଡ଼ିଯାଇ କଳାଗୁଟ ଝିଣ୍ଟିକା ବା ମଡ଼କୁଣ (bug)ଟିଏ ଥଣ୍ଡରେ ଧରି ଚାଲିଥାନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ ଆକାଶକୁ ଭୁଲମ୍ଭ ଭାବେ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ସେ ଉଡ଼ନ୍ତି । ପତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଶିକାରକରେ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବାହାରି ମଣିଧାରକ କନକ ଚଢ଼େଇ (flycatcher) ପରି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିଯିବାମାନ ଜାଣି ଧରେ । ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ପ୍ରକାର କର୍କଶ “ଚେକ୍-ଚେକ୍” ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି ଓ

ଶବ୍ଦ ଶେଷକୁ ଏକପ୍ରକାର ଚୂପା “ଟ୍ରିଉଇଟ୍” ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି । ପ୍ରଜନନ, ରତ୍ନରେ ଅଣ୍ଡିର ପକ୍ଷୀ ଏକ ପ୍ରକାର ସୁମଧୁର ସ୍ୱସ୍ତର ପରି ଦୋସ୍ତର “ଚିକ୍-ଚିକ୍” ଶବ୍ଦକରେ । ଏହି କୁଜନ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଯୁଇ (Indian Robin) ପକ୍ଷୀର ସ୍ବନ ପରି । ତା’ ଇଲକା ଭିତରେ, ପ୍ରଜନନ ରତ୍ନରେ ଓ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଅନୁପ୍ରେବେଶକାରୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ ଯୁଇ-ଦେହ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେବେଳେ ସେ ଏପରି କୁଜନ କରେ । ସ୍ବନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ନାନାପ୍ରକାର ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରେ । ମାଟି ବନ୍ଧ ବା କାନ୍ଥର ଗହ୍ୱରରେ ହେ-ମେହାଏ ଘାସ, ତା’ଉପରେ ଲେମ୍ବ ଓ କେଶ ରଖି ସେଥିରେ ତିନୋଟିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଯାଏ ଅଣ୍ଡାଦିଏ । ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ମାଲଆସିଆ ଧଳା । ତା’ ଉପରେ ଲାଲ୍‌ସିଆ ବାଦାମି ରଙ୍ଗର ଛଟା ଓ ଛୁପ ଦାଗ ଥାଏ ।

ବାଦାମ ଚୂକ—ଏହାର ଇଂରାଜି ନାମ “ଗଲା ଫିଟା ଯୁକ୍ତ ଝାଟି ଚୂକ” (Collared Bushchat) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ “ସାକ୍ସିକୋଲା ଟର୍କୁଆଟା” (Saxicola torquata) । ଏ ପକ୍ଷୀଟି ମଧ୍ୟ ଶୀତକାଳରେ ଚାନ୍ଦିଆମି ନିକଟରେ ଓ ଉଚ୍ଚ ଘାସ ଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଏ । ଅଣ୍ଡିର ବାଦାମି ଚୂକ ପକ୍ଷୀର ମୁଣ୍ଡ କଳା, ଛୁତ ଅଂଶ କମଳାଲେମ୍ବୁ ପରି ବାଦାମି ଏବଂ ବେକର ଦୁଇକଡ଼ରେ ଗଲାବନ୍ଧ (କଲର) ପରି ସୁଷ୍ପ ଧଳା ଚିହ୍ନ ଥାଏ । ପକ୍ଷ ଓ ଲୁହ ମୂଳର ଉପର ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଧଳାଚିହ୍ନ ଥାଏ । ମାଲ ବାଦାମି ଚୂକ ଦେଖିବାକୁ ମାଲ କଳା ଚୂକ ପରି; ମାତ୍ର ମାଲ ବାଦାମି ଚୂକର ପିଠି ପଟେ ପଡ଼ିଥିବା ରେଖା ଅଧିକ ଘନ ।

ଯୁଇ (ବର୍ଣ୍ଣଚିହ୍ନ ୫୫)—ଏହାର ଇଂରାଜି ନାମ “ଭାରତୀୟ ରବିନ୍” (Indian Robin) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ “ସାକ୍ସିକୋଲୋଇଡ ଫୁଲ୍‌କାଟା” (Saxicoloides fulicata) । ହିନ୍ଦି ନାମ କାଲରୁର । ଏହା କମ୍ବୁର (Thrush) ପକ୍ଷିଗୋଷ୍ଠୀ (group) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏକ ଚଢ଼େଇ । ପକ୍ଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଇ ଏକ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଘର ଗୁଲ ଉପରେ, ଗ୍ରାସୀ କଡ଼ର ବାଡ଼ ବା ପଥର ଉପରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଲୁହକୁ ଉପର ଆଡ଼କୁ ତେରନ୍ତୁ ଭାବେ ଉଠାଇ ପକାଇ ଏପଟ ସେପଟ ଚାଲି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଧ୍ବନି କରୁଥାନ୍ତି । ଅଣ୍ଡିର ଯୁଇ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଦାମି ଓ ଚକଚକିଆ କଳାରଙ୍ଗର ଛୁରିବାନ ପକ୍ଷୀ । ଏହାର ଲୁହ ସବଦା ଉପର ଆଡ଼କୁ ଗ୍ରାସୀ ଭାବେ ତେରନ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ଲୁହ ତଳ ଅଂଶରେ ବାଦାମି ଚିହ୍ନ ଥାଏ । ତା’ର ପକ୍ଷରେ ଧଳା ଚିହ୍ନ ଥାଏ । ପକ୍ଷ ମୁହଁ ବସିଥିଲାବେଳେ ଏହି ଚିହ୍ନ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର



ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ । ମାଛ ସୁଇର ବର୍ଣ୍ଣ ପାଉଁଶିଆ ବାଦାମି । ତା'ର ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଉପରଆଡ଼କୁ ଡେଇଁ ରହିଥାଏ । ଲୁହ ତଳର ବର୍ଣ୍ଣ ଫିକା ବାଦାମି । ସୁଇ ପକ୍ଷୀମାନେ ସବେବେଳେ ଏଠୁ ସେଠିକି ସେଠୁ ଏଠିକି ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରି ସମୟ କଟାନ୍ତି । କେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧା ଉପରକୁ ଉଠିଯାନ୍ତି ତ, କେତେବେଳେ ଉଇ ଫୁଙ୍କା ଉପରକୁ ଉଠିଯାନ୍ତି; ପୁଣି କେତେବେଳେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଖାଟ ଆହାରଟିଏ ଟୁଙ୍ଗି ପକାନ୍ତି । ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ କାମଧନ୍ଦାରତ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନ କରି ନିର୍ଭୟରେ କୁଟୀର ଓ ବଙ୍ଗଳାର ବାରଣ୍ଡା ଉପରେ ଦୌଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି । ଖାଟ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସଂବାଦୁଆ ସଜମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟାନ ଖାଦ୍ୟ । ଉଇ ଏମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ, ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଫୁଙ୍କା ନିକଟରେ ଉଇ ଟୁଙ୍ଗିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ମାଛ ପକ୍ଷୀକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାପାଇଁ ଓ ଗୋଟିକର ଇଲକା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଟିର ସୁଇ ପଶିଲେ ତା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଗଲାବେଳେ, ଏମାନେ ଏକପ୍ରକାର ସ୍ପୁର୍ତ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉଲ୍ଲାସ ଧ୍ବନି କରନ୍ତି । ଏତେବେଳେ ସେ ତା' ଗୁଡ଼ି ଅଂଶକୁ ଫୁଲାଇ ଦିଏ, ଉତ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଯେତେ ଉଇକୁ ଉଠି ପାରିବ, ସେତେ ଉଇକୁ ନିଜକୁ ସଂପ୍ରସାରିତ କରେ ଓ ଲୁହକୁ ପିଠି ଉପରକୁ ମୁହଁ-ମୁହଁ ବଙ୍କାଉ ଥାଏ । ସୁଇ ପକ୍ଷୀର ମାଡ଼ ଦାସ ଓ ସାନ ସାନ ଚେରରେ କପ୍ ପରି ଘଣ୍ଟାରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଥିରେ ସାପର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଚମ (ସାପକାଢ଼) ରଖାଯାଇଥାଏ । ମାଟିବନ୍ଧର ଗାତ, ସତ୍ତା ଗଛତାଳର ଗାତ, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଟିଣ ବା ମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ମାଡ଼ ରହିଥାଏ । ଏମାନେ ଥରକେ ଦୁଇ ଘନୋଟି ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । ଅଣ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ହଳଦିଆସିଆ ବା ସବୁଜିଆସିଆ ଧଳା । ତା' ଉପରେ ଢେଙ୍କା ଲାଲ ବାଦାମି ରଙ୍ଗର ଛଟା ଓ ଗୁପ୍ତଗୁପ୍ତ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ।

**କସ୍ତୁରୀ (ବର୍ଣ୍ଣିତ ୪୭)**—ଏହା କସ୍ତୁରୀ ପକ୍ଷିଗୋଷ୍ଠୀର ସବୁଠାରୁ ବିଖ୍ୟାତ ଗାୟକ ପକ୍ଷୀ । ଇଂରାଜି ନାମ “ମାଲବାର କସ୍ତୁରୀ ଗାୟକ” (Malabar whistling Thrush) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ “ମାଲିଓଫୋନିଅସ ହର୍ସଫିଲ୍ଡି” (Myiophonus horsfieldi) । ହିନ୍ଦି ନାମ କସ୍ତୁରୀ । ଏହା ଗୋଟିଏ ମନୋରମ ମାଳ-କଳା ପକ୍ଷୀ । ଆକାରରେ ବଣି ଓ ପାଉଁ ମଝାମଝି ହେବ । ଲଲାଟ ଓ କାନ ଚକଚକିଆ ଧାତବ ମାଳ ବର୍ଣ୍ଣର; ଥଣ୍ଡ ଓ ଗୋଡ଼ କଳା । ମନୁଷ୍ୟ ବସନ୍ତଠାରୁ ନିକଟରେ ଓ ଦୂରରେ ଘନ ପଥୁଆ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା ନାଲି ଓ ପ୍ରକଟ, ପ୍ରବହମାନ ପାହାଡ଼ିଆ ନଦୀ କୂଳରେ କସ୍ତୁରୀ ବାସକରେ । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଅତି

ପ୍ରଭୃତିରେ ଏମାନଙ୍କର ସୁଉକ ସୁସୁରି ସ୍ବନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ । ପ୍ରଦୋଷକୁ ସ୍ବଗତ କରି ଗାନ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କସ୍ତୁରୀ ଅନ୍ୟତମ । ମନୁଷ୍ୟର 'ସୁସୁରି' ଶବ୍ଦର ତାଳ ଲଘୁ ସହୃଦ ଏହି ପକ୍ଷୀ ସ୍ବରର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମେଳ ଥିବାରୁ ଏହା ଶ୍ରମ-କାତର ସ୍କୁଲ ଛୁଅ ଓ ସୁସୁରି ମଞ୍ଚ ସ୍କୁଲ ଛୁଅ (Idle or whistling school boy) ଆଖ୍ୟା ପାଇଅଛି । ଏ ଜାତୀୟ (Thrush) ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରି କସ୍ତୁରୀ ପ୍ରଜନନ ରତ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ରତ୍ନରେ ମାର୍ବିତ । ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଏହି ବର୍ଗର 'ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରି ସେ କେବଳ ଖରାପ ସ୍ବରରେ "ଫି-ଇ-ଇ" ଶବ୍ଦକରେ । କସ୍ତୁରୀ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଜଳବାସୀ ଖାଟ, ଗେଣ୍ଡା ଓ କଙ୍କଡ଼ା । ଗେଣ୍ଡା ଓ କଙ୍କଡ଼ାର କଠିନ ଖୋଳକୁ ଫଟାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ କଞ୍ଚାକର ସେମାନଙ୍କୁ ପଥର ଉପରେ ବାଡ଼ାନ୍ତି । ନଦୀ ନାଳରେ ଜଳ ଆବର୍ତ୍ତ ଖାଇ ଗଡ଼ିଯାଉଥିଲାବେଳେ ତା' ଭିତରେ କସ୍ତୁରୀ ପଥରରୁ ପଥରକୁ ଡେଇଁ ପାଣିରୁ ଗେଣ୍ଡା ଓ କଙ୍କଡ଼ା ଧରେ । ଏ ସମୟରେ ଲୁହ ସଫଦା ପଞ୍ଜାପରି ଫିଟିଯାଏ ଏବଂ ଉପର ତଳ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୁଏ । ଲୁହ ଏତେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୁଏ ଯେ ତାହା ପ୍ରାୟ ବସିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବାଜେ । ପଥର ସନ୍ଧିରେ ଲୁହୁଥିବା ଖାଦ୍ୟଜୀବକୁ ଘଡ଼ିଢାଳି ପଦାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଲୁହର ପକ୍ଷକୁ ମୁହଁମୁହଁ ଖୋଲେ ଓ ମୁଦେବୋଲି ଅନୁମାନ । ପକ୍ଷିପୋଷାଳୀମାନଙ୍କଠାରେ ଗାୟକ ପକ୍ଷୀ କସ୍ତୁରୀ ଆଦର ବହୁତ ବେଶି । ଶାବକ ଅବସ୍ଥାରୁ ପାଳିଲେ ଏମାନେ ଭଲ ପୋଷା ମାନନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ମାତ୍ର ବଡ଼, ଘନଭାବେ ତେର, ହରିତା (ମସ୍), ଘାସ ଓ ମାଟିଦ୍ବାରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ପଥରର ଖୋପ ବା ସିଧା ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପଥରର ଖୋପରେ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପାଣି ପଥରେ ଥିବା ପଥର ଖୋଲରେ ମାଡ଼ ରହୁଥାଏ । ଥରକେ କସ୍ତୁରୀ ତିନି ଚାରିଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ । ଅଣ୍ଡାର ବର୍ଣ୍ଣ ଫିକା ବାଦାମି ବା ଧୂସର ପଥରର ରଙ୍ଗ ପରି । ତା' ଉପରେ ଲଲସିଆ ବାଦାମି ବା ଫିକା ମାଲବର୍ଣ୍ଣର ଛଟା ଓ ଗୁପ୍ତପିଆ ଚନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ୁଥାଏ ।

**ହିମାଳୟ କସ୍ତୁରୀ**—ହିମାଳୟ କସ୍ତୁରୀ ସାଧାରଣ କସ୍ତୁରୀର ଏକ ନିକଟ ଜାତି । ଏହାକୁ ଇଂରାଜିରେ "ହିମାଳୟ କସ୍ତୁରୀ ଗାୟକ" (Himalayan whistling Thrush) କହନ୍ତି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ "ମାଇଓ ଫୋନିଫୋନି" (Myiophonus temminckii) । ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ପାଦଦେଶରୁ ଆସାମ ଓ ବର୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ବାସକରେ । ଏହାର ଅଣ୍ଡା କଳା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ । ଏହାର ଲଲିଟ ଓ କାନ୍ଦରେ ଚକଚକିଆ ଧାତବ ମାଲବର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ ।

ଗଞ୍ଜା ଚଢ଼େଇ (Tits) ପାରିଡ଼ (Paridae) ପକ୍ଷୀ ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆକାର ସାନ, ସାଧାରଣତଃ ଘରଚଟିଆ ପରି ବା ତା'ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର । ଏମାନେ ସଦା ଖୁସିପୁରୁଷ ବୃକ୍ଷବାସୀ ପକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନ୍ଦ ମଜବୁତ । କେତେକ ଗଞ୍ଜା ଚଢ଼େଇଙ୍କର ବାହ୍ୟାଂଶମୟ ଉପରଆଡ଼କୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରୁଡ଼ା ଥାଏ । ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଉପଦ୍ଵୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ତିନି ଜାତି ଗଞ୍ଜା ଚଢ଼େଇ ମିଳନ୍ତି । ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚଢ଼େଇଟି ହେଲା ରାମଗଞ୍ଜା ଚଢ଼େଇ (ବର୍ଣ୍ଣବିଧି 90) — ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଧୂସର ଗଞ୍ଜା ଚଢ଼େଇ (Grey Tit) କୁହାଯାଏ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ “ପେରସ ମେଜର” (Parus major) । ହିନ୍ଦି ନାମ ରାମ ଗଞ୍ଜା । ଏହା ଗୋଟିଏ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଘରଚଟିଆ ପରି ପକ୍ଷୀ । ମୁଣ୍ଡ ଚିକ୍‌କଣ, କଳା ରଙ୍ଗର ଓ ରୁଡ଼ା ନାହିଁ । ଗଣ୍ଡଦେଶ (Cheek) ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଧଳା, ପିଠି ପାଖ ଧୂସର, ପେଟ ପାଖ ଧଳା । ପେଟର ମଝି ଅଂଶରେ ଏକ ଓସାରା କଳାରଙ୍ଗର ପଟିପରି ରେଖା ଥାଏ । ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛରେ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ; ମାତ୍ର ସନ୍ତସନ୍ତୁଆ ଚିର ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟରେ ରହେନାହିଁ । ରାମଗଞ୍ଜା ପକ୍ଷୀ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ, ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳବାନ୍ଧ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷିଭିନ୍ନୀ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସହ ଏକତ୍ର ମିଶି ଚୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିନ୍ତି; ମାତ୍ର ଆନନ୍ଦମୟ କିଛି ମିଶି କଳଧ୍ୱନିଦ୍ୱାରା ପରିସର ସହଜ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି । ପୋକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଓ ଲୁର୍ଭା ରାମଗଞ୍ଜା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଆହାର । ସେମାନେ ଆହାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶାଖା, ଫୁଲର ଡେମ୍ଫ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଚଢ଼ିଥିଲାବେଳେ ଦେହର ଭିତରେ ତାହା ନଇଁ ପଡ଼େ ଓ ସେମାନେ ତାକୁ ଜାଗୁଡ଼ିଧରି ରହିଥାନ୍ତି । ଦଉଡ଼ି ଉପରେ କେଲା ବା ସର୍କିସବାଲାଙ୍କ ଖେଳ ପରି ଏହା ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ୍ୟ । ଗଛର ଛଲି ବା ଫାଟ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ପୋକ ଖୋଜି ତାଙ୍କୁ ଆହାର କରନ୍ତି । କେତେବେଳେ କେମିତି ଫଳ ବଗିଚାରେ ପଶି ଫଳ ଓ କଢ଼ର କ୍ଷତି କଲେ ମଧ୍ୟ ରାମଗଞ୍ଜା ପକ୍ଷୀ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ୟଜାତୀୟ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବାରୁ ତାହା ଆମର ଏକ ଉପକାରୀ ପକ୍ଷୀ । କଠିନ ଆବରଣଯୁକ୍ତ ମଞ୍ଜି ଓ ଫଳକୁ (Nut) ପାଦତଳେ ଗୁପ୍ତି ଧରି ସବଳ ଅଶ୍ୱ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ହାତୁଡ଼ି ପାହାର ପରି ପାହାର ବସାଇ ଫଟାଇ ଶସ ଖାନ୍ତି । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଅଣ୍ଡା ପକ୍ଷୀ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ତବ୍ଧ “ହୁଇଇଚି, ହୁଇଚି, ହୁଇଚି...” ସ୍ୱରର ଶବ୍ଦ କରେ । ଏମାନେ

ଗଛର ଗଣ୍ଡି ବା ଶାଖାର ଖୋଲରେ ଅଥବା ଯଥାର ପାଚେରୀ କାନ୍ଥ ଖୋଲରେ କେଶ, ହରିତା (ମସ) ଓ ଯରରେ ନାଡ଼ ରଚନା କରନ୍ତି । ଅରକେ ଗୁରୁରୁ ଛଅଟି ଯାଏଁ ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । ଅଣ୍ଟାର ବର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ବା ପାଟଳାଅସିଆ ଧଳା । ତା ଉପରେ ଲୁଲୁଆସିଆ ବାଦାମି ରଙ୍ଗର ଛଟା ଦାଗ ଓ ଗୁପ୍ତପିଆ ଚନ୍ଦ୍ର ଥାଏ ।

ଭରଣାୟ ଉପଦ୍ରୀପରେ ଆଉ କାନ୍ଦୁ ଗଜ୍ଜାପକ୍ଷୀ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହାକୁ ଇଂରାଜିରେ “ହଲଦିଆ ଗାଲ ରାମଗଜ୍ଜା ପକ୍ଷୀ” (Yellowcheeked Tit) କୁହାଯାଏ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ “ଫେରାସ ଜାନଥୋ ଜେନସ” (Parus xanthogenys) । ଏହା ଗୋଟିଏ ଲାଲିତ କଳା-ହଲଦିଆ ଗଜ୍ଜାପକ୍ଷୀ । ଏହାର ମୁଣ୍ଡରେ ଉପରଆଡ଼କୁ ଗୋଜିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କଳା ରୁଡ଼ା ଥାଏ । ପେଟପାଖର ବର୍ଣ୍ଣ ହଲଦିଆ । ପେଟର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଏକ ଓସାରୀଆ କଳା ପଟି ପରି ରେଖା ଥାଏ । ରାମଗଜ୍ଜା ଚଢ଼େଇ ଯେଉଁପରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସକରେ, ଏହି ହଲଦିଆ ଗାଲ ଗଜ୍ଜା ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସକରେ । ଏହା ଅଧିକ ଆଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇ ପାରେ ।

କାଠଫୋଡ଼ା (Nut hatch) ପକ୍ଷୀମାନେ ସିଟିଡ଼ି (Sittidae) ପକ୍ଷିବିଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏମାନେ ଷ୍ଟ୍ରୁପ୍, ବୃକ୍ଷବାସୀ ବା ଗିରିରୁଡ଼ାଗୁଣ୍ଠ । ଏମାନେ ଗଛର ଗଣ୍ଡି, ଶାଖା ବା ଯଥର ଉପରେ ଉପର ତଳ ଧକେଇ ଚକେଇ ସବେଗରେ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଦୌଡ଼ିଯାଇ ଦୁଣି ଅଟକି ଫାଟମାନଙ୍କରେ ମାଙ୍କଡ଼ସା ଓ ଗାଟପତଙ୍ଗ ଖୋଜି ବୁଲିବାର ଦେଖାଯାଏ । ସେମାନଙ୍କ ଲୁହ ଷ୍ଟ୍ରୁପ୍ ଓ ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର । ଅଣ୍ଟା କାଠଫୋଡ଼ା (Wood packer) ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଟା ପରି ଲମ୍ବା । ଏକଜାତି କାଠଫୋଡ଼ା ସାରା ଭାରତ ଓ ବାଙ୍ଗଲ ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହାକୁ ଇଂରାଜିରେ “ବାଦାମି ପେଟ କାଠଫୋଡ଼ା” (Chest-nut bellied Nuthatch) କହନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ “ସିଟା କାସ୍ତୁନିଆ” (Sitta castanea) । ହିନ୍ଦି ନାମ କାଠଫୋଡ଼ିଆ, ଶୀର୍ଷ । ଓଡ଼ିଆ ଶୀର୍ଷ, କାଠଫୋଡ଼ା (ବର୍ଣ୍ଣର 91)—ଏହା ଆକାରରେ ଘରଚଟିଆଠାରୁ ଷ୍ଟ୍ରୁପ୍ । ପିଠି ପାଖର ବର୍ଣ୍ଣ ଶିଳିଟିଆ-ନୀଳ । ପେଟ ପାଖ ଘନ-କହଳ । ଅଣ୍ଟା ଲମ୍ବା ଓ ମୁନଥା । ମାଛ ପକ୍ଷୀର ପେଟ ପାଖ ଫିକା । ଏମାନେ ପତଳା ନିଜାଲରେ ଗଛର ଗଣ୍ଡି ବା ଶାଖା ଗୁରୁପଟେ ଉପର ଆଡ଼କୁ, ଗୋଟିକିଆ ଭାବେ ବା ମାଛ ଅଣ୍ଟିର ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ପରି ଛପି ଛପି ଉଠୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଶୀର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗାଁ ପାଖ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ବା ଉଚ୍ଚ ଗଛର ଉପବନମାନଙ୍କରେ ବାସକରେ । ଏହାର



ଚେ ନଂ 84  
 ଦଳି ଟିଲଟଡେଇ  
 ( Tailor Bird )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 152 ଦେଖ




ଟ୍ରେ ନଂ 85  
 ଦୟାଲ  
 ( Magpie Robin )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 153 ଦେଖ



ଚିତ୍ର ନଂ 87  
 କୋରୁଟ  
 ( Pied Bushchat )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 155 ଦେଖ





ଚିତ୍ର ନଂ ୮୮  
 ଶୁଭ  
 ( Indian Robin )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ ୧୫୬ ଦେଖ

ଚିତ୍ର ନଂ 89  
 କସ୍ତୁରୀ  
 ( Malabar whistling Thrush )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 157 ଦେଖ





ଚିତ୍ର ନଂ ୨୦  
 ଗ୍ରୀ ଗ୍ରୀ, ଚଢ଼େଇ  
 (Grey Tit)  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ ୧୫୯ ଦେଖ






ଚିତ୍ର ନଂ 91  
 କାଠଦୋଡ଼ା ବା ଶୀଘ୍ର  
 ( Chestnutbellied Nuthatch )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 160 ଦେଖ





ଚିତ୍ର ନଂ 92  
 ଗ୍ରେ ( Grey Wagtail ) ଓ  
 ବଡ଼ଗଣ୍ଡନ ( Large Pied Wagtail )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 162 ଦେଖ

ଚିତ୍ର ନଂ 93  
 ଛୁଆଁବାସୀ ଚଢ଼ଚଢ଼  
 ( Tree Pipit )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 164 ଦେଖ





ଚିତ୍ର ନଂ ୨୪  
 ଟିକେଲ୍ ଫ୍ଲୋରୀଫେସ୍  
 ( Tickell's Flowerpecker )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ ୧୬୬ ଦେଖ



ଚିତ୍ର ନଂ ୨୫  
 ବାଲଗଣି ଫୁଲବୁଲ୍  
 ( Purple Sunbird )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ ୧୬୭ ଟୋପା





ଚିତ୍ର ନଂ 96  
 ବାବୁନା ପକ୍ଷୀ  
 ( White-Eye )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 169 ଦେଖ



ଚିତ୍ର ନଂ 97  
 ଘର ଚଢ଼ିଆ  
 ( House Sparrow )  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 170 ଦେଖ



ଚିତ୍ର ନଂ ୨୮  
 ବାୟା ଚଢ଼େଇ  
 ( Baya Weaver Bird )  
 ପୃଷ୍ଠ ୧୭୨ ନଂ ଦେଖ





ଚିତ୍ର ନଂ ୨୨

(4) ଲଲ ବାରମାସୀ ( Red Munia )

(3) ଡେଲିଆ ବାରମାସୀ  
( Spotted Munia )

ପୃଷ୍ଠା ନଂ 174 ଦେଖ



ଚିତ୍ର ନଂ 100  
 ରୂଢ଼ ବା ଲଲ୍ ରୂଢ଼  
 (Common Indian or Hodgson's Rosefinch)  
 ପୃଷ୍ଠା ନଂ 175 ଦେଖ

ଖାଦ୍ୟାହାର ଉଭୟ ଗଛ । (Tit) ଓ କାଠହଣା (Woodpecker) ପକ୍ଷୀ ପରି ।  
 ରାମଗଛ । ଚଢ଼େଇ ପରି କାଠଫୋଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ଗଣ୍ଡି ଓ ଶାଖାରେ ଉପର ଭଳି ଓ  
 କଡ଼ରେ ଦୋଳାୟିତ ଭାବେ ଗତିକରି ଫାଟମାନଙ୍କରେ କୌତୂହଳ ସହକାରେ  
 ଉଣିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ପୁଣି କାଠହଣା ପକ୍ଷୀପରି ଗଛ ଚଢ଼ି ଛୁଲି ଉପରେ ଅଣ୍ଟକୁ  
 ଠକ ଠକ କରି ଲୁଚିଥିବା ଆହାର କାଟମାନଙ୍କୁ ପଦାକୁ ବାହାର କରାଏ । ଏଭଳି ଭାବେ  
 ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲାବେଳେ ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତପ୍ତରତା ସହକାରେ  
 ତରୁଣାଖାର ତଳେ ତଳେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରେ । ମାଙ୍କଡ଼ସା କାଟ ଏବଂ  
 ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଓ ଶୁକ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ; ମାଝି ରାମଗଛ । ଚଢ଼େଇ-  
 ପରି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଖୋଳପାୟୁକ୍ତ ମଞ୍ଜି ଓ ଫଳ ଖାନ୍ତି । ଏ ସବୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି  
 ଫାଟରେ କିଲା ବାଢ଼େଇ ପରି ଭର୍ତ୍ତି କରି ବାରମ୍ବାର ହାତୁଡ଼ିରେ ପାହାର ପକାଇଲା  
 ପରି ମଜକୁରୁ ଗୋଜିଆ ଅଣ୍ଟରେ ବାଡ଼ାନ୍ତି ଓ ଫଳ ବା ମଞ୍ଜି ଫାଟିଗଲେ ଭିତର  
 ଶସକୁ ଖାନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ସ୍ବର ମୂଷା ପରି କ୍ଷୀଣ ଓ ଚିଁ ଚିଁଆ; ମାଝି ଏହା  
 ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ପୁନଃ ପୁନଃ ଉଚ୍ଚାରିତ, ଦୁଇ ପୁସୁରିଆ ‘ଚପ୍ ଚପ୍’ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ  
 କରିଥାଏ । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଏମାନେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଅନ୍ୟ  
 ସମୟରେ ଏମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃକ୍ଷସ୍ଥ ଦଳରେ ବୁଲନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ରାମଗଛ ।  
 ଚଢ଼େଇ ସହୃଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଟଭୋଜୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହୃଦ ଦଳବାନ୍ଧ ଜଙ୍ଗଲରେ  
 ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇ ଗଛରେ ଆସେ ଆସେ ହୋଇଥିବା  
 ଗହୁର ବା ସିନ୍ଧୁରମୁଣ୍ଡି (Barbet) ଚଢ଼େଇଦ୍ବାରା କରାହୋଇଥିବା ଖୋଳରେ  
 ପସ, ହରିତା (ମସ୍) ଓ ଲେମ୍ବରେ ନାଡ଼ ରଚନାକରେ । ନାଡ଼ର ମୁଖ ଓଦାମାଟିରେ  
 ଲେସା ହୋଇଥାଏ । ତାହା ଶୁଣିଗଲେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର  
 କଣାଟିଏରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଏମାନେ ଥରକେ ଦୁଇଟିରୁ ଛଅଟି ଯାଏ ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି ।  
 ଅଣ୍ଟା ଧଳା ଓ ତା’ ଉପରେ ଲାଲରଙ୍ଗର ଛଟା ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଖଞ୍ଜନ (wagtail) ଓ ଚରଚର (Pipit) ମୋଟାସିଲିଡ଼ି (Motacillidae)  
 ପକ୍ଷୀବିଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏମାନେ କୃଷ; ମାଝି ଲାଳତ୍ୟପୁର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷୀ । ଏମାନଙ୍କର ଲଞ୍ଜ  
 ଲମ୍ବା । ସେମାନେ ଦାସପଡ଼ିଆ ବା ସନ୍ତସନ୍ତା ମାଟି ଉପରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଛୋଟ  
 ଛୋଟ କାଟପତକ ଟୁଙ୍ଗୁଥିବାବେଳେ ଲଞ୍ଜ ଅବରାମ ଇତଦ୍ରୁତ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥାଏ ।  
 ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଖଞ୍ଜନ ଓ ଚରଚର ପକ୍ଷୀ ଶୀତଋତୁରେ  
 ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ଥମେ ରୁ ଅଞ୍ଚଳ (Palearctic region)ରୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ

ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଶୀତକାଳୀନ ଆଗନ୍ତୁକ ପକ୍ଷୀ ହେଲା ଖଞ୍ଜନ ବା ଧଳା ଖଞ୍ଜନ । ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ‘ଧଳା ଲୁହୁହଲ ପକ୍ଷୀ’ (White Wagtail) କହନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ମୋଟାସିଲ ଆଲ୍‌ବା’ (Motacilla alba) । ହିନ୍ଦୀ—ଡୋବନ୍, ଖଞ୍ଜନ । ଏହାର ଆକାର ଘରଟିଆ ପରି ହେବ; ମାତ୍ର ଘରଟିଆଠାରୁ କୃଷ ଓ ଲଞ୍ଜ ଅଧିକ ଲମ୍ବା । ଏହାର ପିଠି ପାଖର ବର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧୂସର ଓ ପେଟ ପାଖର ବର୍ଣ୍ଣ ଧଳା । ପିଲଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲାବେଳେ ବେକ ତଳକୁ ଏକ ଛୋଟ କନା ଦିଆଯାଏ । ଏହି ପକ୍ଷୀର ବେକ ତଳକୁ ସେଇପରି ଏକ ଲଳାସିଆ-ଧୂସର ଚନ୍ଦ୍ର ଥାଏ; ମାତ୍ର ଶୀତ ଋତୁରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବା ଏକାବେଳକେ ଉଠେଇଯାଏ ଏବଂ ଚତୁକ ଓ ତଣ୍ଡି ପେଟ-ପାଖ ପରି ଧଳା ହୋଇଯାଏ । ଖଞ୍ଜନ ପକ୍ଷୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟି-ଗୋଟିକିଆ, ଦୁଇଟି ବା ତିନୋଟି କରି ବା କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦଳରେ ବର୍ଷିତ୍ରଭାବେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦକ୍ଷେପରେ ଭ୍ରମି ଉପରେ ଦୌଡ଼ିବୁଲୁଥାନ୍ତି ଓ ଲଞ୍ଜ ମୁହଁମୁହଁ ଅନ୍ତୋଳିତ ହେଉଥାଏ । ସହସ୍ରା ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ୟମ ସହକାରେ ଡେଇଁ, ଏପଟ ବୁଲି ସେପଟେ ଯାଇ କାଟପତଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗନ୍ତି ଓ ବେଳେ ବେଳେ କାଟ ଧରିବାପାଇଁ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ଫ ଦିଅନ୍ତି । ସେମାନେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ବୁଲନ୍ତି । କିଛି ଭ୍ରମି, ପଡ଼ତ ଭ୍ରମି, ଗଲ୍‌ଫ ଖେଳପଡ଼ିଆ, ମଇଦାନ ଆଦିରେ ଏମାନେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଏପରିକି ଜନାକାଣ୍ଡ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଖେଳାଳିମାନେ ଖେଳରତ ଥିଲାବେଳେ ଅନୁଦବଗ୍ନ ଭାବେ ଖଞ୍ଜନ ପକ୍ଷୀ ଖେଳପଡ଼ିଆରେ କାଟପତଙ୍ଗ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ଶିପ୍ରବେଗରେ ପକ୍ଷ ଝାଡ଼ିବା ଓ ବନ୍ଦ କରିବା ଫଳରେ ଆନ୍ତୋଳିତ କୁଟିଳ ଛନ୍ଦରେ ଉଡ଼ନ୍ତି । ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ‘ଚପ୍‌, ଚପ୍‌, ଚପ୍‌’ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି । ପହାଞ୍ଛାଦିତ ଗଛ, ନଳବନ ଓ ଆଖୁ କିଆରିରେ ଏମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକାଠି ରାତି ଯାପନ କରନ୍ତି । ଶୀତକାଳରେ ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଖଞ୍ଜନ ପକ୍ଷୀ ଭାରତବର୍ଷ ବାହାରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ରେସ (race)ର ଧଳା ଖଞ୍ଜନ କାଶ୍ମୀରରେ ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ଏମାନଙ୍କର ନାଡ଼ କପ୍ ପରି; ଘାସ, ଚେରମୂଳ ଓ କେଶରେ ଦିଆରି ହୋଇଥାଏ । ପଥର ତଳେ ବା ଗୁଦା ଭିତରେ ବା ଝରଣାକୂଳରେ ଉତୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଗଛର ଚେରମୂଳରେ ଅଥବା ଝରଣା ମଝିରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଟାମ୍ବୁର ପଥର ତଳେ ନାଡ଼ ରହୁଥାଏ । ଅଳଙ୍କେ ଗୁରୁଟିରୁ ଛଅଟି ଯାଏ ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । ଅଣ୍ଟା ଧଳା । ଡା’ ଉପରେ ଲଳାସିଆ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଛଟା ଦାଗ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ବୃଷ୍ଟି (ବର୍ଣ୍ଣଚିହ୍ନ 92 ଉପର ଛବି)—ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୁଣ୍ଡିଖାଇ । ଇଂରାଜୀରେ

ଏହି ପକ୍ଷୀକୁ ‘ଧୂସର ଖଞ୍ଜନ’ (Grey Wagtail) ବୋଲୁଥାଏ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ମୋଟାସିଲ୍ଲା କାସ୍ପିକା’ (Motacilla caspica) । ଆମ ଉପ-ମହାଦେଶର ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତଦିନେ ଏହି ଖଞ୍ଜନ ପକ୍ଷୀଟି ପାହାଡ଼ିଆ ଝର ବା ଝରଣା କୂଳରେ, ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ତଳେ ବର୍ଷାଜଳ ବହୁଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ ହୋଇଥିବା ନାଳୀ ନିକଟରେ ଗୋଟିକିଆ ଦୌଡ଼ିବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଆମ ଦେଶରେ ଥିଲାବେଳେ ମାଛ ଅଣ୍ଟିର ଦେଖିବାକୁ ଏକାପରି । ମାଛ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ପ୍ରଜନନ ରତ୍ନରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ମତେ ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଚରୁକ, ତଣ୍ଡ ଓ ଛୁଇଁ କଳା ହୋଇଥାଏ । ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ମୋଟାମୋଟିଭାବେ ଧଳା ଖଞ୍ଜନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଞ୍ଜନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରି । ପ୍ରଜନନ ରତ୍ନରେ ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀ ସୁନ୍ଦର ରାବ କରେ । ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନୀଳ ରଚନା କରି ଅଣ୍ଟା ଦେବାର ନିକଟତମ ସ୍ଥାନ ହେଲା କାଶ୍ମୀର ଓ ହିମାଚାଳପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟ । ଏମାନଙ୍କର ନୀଳ ଓ ନୀଳରଚନା କରିବା ସ୍ଥାନ ଧଳା ଖଞ୍ଜନ ପକ୍ଷୀ ପରି । ଅରକେ ଗୁରୁତ୍ୱରୁ ଛଅଟି ଯାଏ ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । ଅଣ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ହଳଦିଆସିଆ ଧୂସର; ନ ହେଲେ ସବୁଜ ଆସିଆ । ତା’ଉପରେ ଲୁଲୁସିଆ ବାଦାମୀ ଛଟା-ଚନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଆହୁରି ଅନେକ ଜାତିର ଧୂସର ଓ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଖଞ୍ଜନ ପକ୍ଷୀ ଆମ ଦେଶକୁ ଶୀତକାଳରେ ଆସନ୍ତି । ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଜାତି ହଳଦିଆ ଖଞ୍ଜନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ମୋଟାସିଲ୍ଲା ଫ୍ଲାଭା’ (Motacilla flava) । ଶୀତରତ୍ନରେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖି ଏକ ଜାତିର ଖଞ୍ଜନକୁ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଖଞ୍ଜନଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରିବା କଷ୍ଟକର । ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳର ସ୍ମୃତି ବର୍ଣ୍ଣବୈଭବ ଫୁଟିଉଠେ ଓ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ବୋଲି ଜାଣିହୁଏ । ଭାରତୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପର ଏକମାତ୍ର ଆବାସୀ ଖଞ୍ଜନ ପକ୍ଷୀ ହେଲା ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡି ବା ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡିଖାଇ ବା ବଡ଼ ଖଞ୍ଜନ (ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର 92 ତଳ ଛବି) । ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ‘ବଡ଼ ଚିତ୍ତ ଖଞ୍ଜନ’ (Large Pied Wagtail) କହନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ମୋଟାସିଲ୍ଲା ମାଡେରାସ୍ପାଟେନସିସ’ (Motacilla Moderaspatensis) । ଏହା ସବୁ ଜାତି ଖଞ୍ଜନ ପକ୍ଷୀଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ଏହାର ଆକାର ପ୍ରାୟ ଗୋବରା ଚଢ଼େଇ ପରି ହେବ । ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ କଳା-ଧଳା ଓ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଦୟାଲ (Magpie Robin) ପକ୍ଷୀର ପାଟଣ୍ଟି ପରି; ମାତ୍ର ବଡ଼ ଖଞ୍ଜନର ଆଖି ଉପରେ ଏକ ସ୍ମୃତି ଧଳା ଭ୍ରୂଲତା ଥାଏ, ଆଉ ଏହା ଲୁହକୁ ଉପରଆଡ଼କୁ ଡେଇଁଛୁ କରି ତୋଳି ଚାଲି-

ନାହିଁ । ଏହି ଖଞ୍ଜନପକ୍ଷୀ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଦହ ବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଏମାନେ ବିଶେଷ କରି ସ୍ବଚ୍ଛ କଙ୍କରମୟ ପ୍ରବହମାନ, ଝରଣା-କୁଳ ଭଳିପାନ୍ତି । ଏମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିଲେ ତରଳି ପଳାଇଯାନ୍ତି ନାହିଁ; ବରଂ ଘର ଉପରେ ବସନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଧୋବା ଲୁଗା କାଟୁଥିବା ପୋଖରୀ କୁଳରେ ବା ସେଇପରି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଭୟରେ ଆହାର ଖୋଜି ଚାଲୁଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଅନେକ ରକମର ଉଚ୍ଚ ସ୍ବସ୍ବର ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଅଣ୍ଡିର ପକ୍ଷୀ ଘର ଉପରେ ବା ପଥର ଉପରେ ବସି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସ୍ବର କରେ । ସାଧାରଣ ଭାବେ ବିଚାର କଲେ ଦୟାଳୁ ପକ୍ଷୀର ସ୍ବରର କିଛି କିଛି ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡିଖାଇ ପକ୍ଷୀର ସଙ୍ଗୀତରେ ପ୍ରତିଧ୍ବନିତ ହୋଇଥାଏ । ଏମାନେ କାନ୍ଥର ଗର୍ତ୍ତି, ବାହାର ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡର ଖୋଲ, ବାସ୍ତବ୍ୟର ବରଗା ତଳେ ବା ପୋଲ ତଳେ ଥିବା କଞ୍ଚି ବା ଖମ୍ବ ଖୋଲରେ ନୀଡ଼ି ରଜନା କରନ୍ତି । ନୀଡ଼ି କପ୍ ଆକାରର । ଏହା ଚେରମୂଳ, କେଶ, ଲେମ୍ବ ଓ ଶୁଖିଲା ଗୌବାଳ (algae)ରେ ଘିଆରି ହୋଇଥାଏ । ନୀଡ଼ି ଯେଉଁଠି ରଚିତ ହେଇଥାଉନା କାହିଁକି, ତାହା ଜଳ ନିକଟରେ ରହିଥାଏ । ଅରକେ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡି ତନୋଟିରୁ ଗୁଣ୍ଡିଟି ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ତାହା ଧୂସରୀଆ ଧଳା, ବାଦାମୀ-ଆସିଆ ଧଳା ବା ସବୁଜିଆ ଧଳା । ତା' ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଭାସପୁରୁଷ୍ଟ (shade) ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ରେଖା ଓ ଗୁପ୍ତପୁପିଆ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ।

ଚରଚର (Pipit) ଓ ଖଞ୍ଜନ (Wagtail) ଏକ ପକ୍ଷୀଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଏକା ଆକାରର ଓ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ବଭାବ ମଧ୍ୟ ଏକାପ୍ରକାରର । ସେ ଯାହା ହେଉ, ଚରଚର ପକ୍ଷୀ ଭରତ ପକ୍ଷୀ (Lark) ପରି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର । ଏହି ବାଦାମୀ ବର୍ଣ୍ଣ କୋମଳ ଓ ଅଖିଲୁ ଲାଗେ ନାହିଁ । ଚରଚର ଖଞ୍ଜନ ପକ୍ଷୀ ଚୁଲନାରେ ନହକା, ଲମ୍ବାଲିଆ ଓ ଲଞ୍ଜ ଅଧିକ ଲମ୍ବା । କେତେକ ଚରଚର ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆକାର, ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବାସ ଅନୁସାରେ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ । ଆଉ କେତେକ ଚରଚର ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟରେ ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣରେ ଏତେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରି ହୁଏ ନାହିଁ । ଅଧିକାଂଶ ଚରଚର ପକ୍ଷୀ ଶୀତକାଳରେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସନ୍ତି । ଆମ ଦେଶରେ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରବାସୀ ଚରଚର ପକ୍ଷୀ ହେଲା ଛାୟାବାସୀ ଚରଚର (ବର୍ଣ୍ଣଚିହ୍ନ 93)—ଏହାର ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ଟ୍ରିପିଟ ଚରଚର’ (Tree Pipit); ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଏନଥସ ଟ୍ରାଇଭାଲିସ୍’ (Anthus trivialis) । ହିନ୍ଦୀରେ ସବୁ ଜାତିର ଚରଚରଙ୍କୁ



ରୁଗେଲ୍ ଓ ଚରଚର କହନ୍ତି । ଏହା ବର୍ଣ୍ଣରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ମାଈ ଘରଚଟିଆ ପରି; ମାତ୍ର ତା'ଠାରୁ କୃଷି, ଅଳ୍ପ ସରୁଆ ଓ ଲୁହ ଲମ୍ବା । ଲୁହର ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଥିବା ପର ଧଳା । ଉଡ଼ି ଆସି ବସିଲବେଳେ ଏହି ଧଳା ପକ୍ଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ । ଏହାର ଉପର ପାଖ କଳାଡ଼ୋରିଆ ଦାଗପୁକ୍ତ ବାଲି-ବାଦାମୀ । ଭ୍ରୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଫିକା ରଙ୍ଗର । ପେଟ ପାଖ ଫିକା ହଳଦିଆ-ବାଦାମୀ ଧଳା । ଛାତି ଅଂଶରେ କଳା ଡୋରିଆ ରେଖା ଚିହ୍ନି ଘନ ଭାବେ ରହିଥାଏ । ସମସ୍ତ ଭରଣାୟ ଉପଦ୍ରୀପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ଜଙ୍ଗଲୀୟ, ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଓ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ନିକୃଷ୍ଟମାନଙ୍କରେ ଏମାନେ ଶୀତକାଳରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାତି ଚରଚର ଖୋଲରେ ଚରୁଥିଲବେଳେ, ଛାୟାବାସୀ ଚରଚର ସ୍ବଭାବତଃ ଛାଇ ଜାଗାରେ ଆହାର ଖୋଜି ଚାଲୁଥାଏ । ଏହି ସ୍ବଭାବ ଦ୍ବାରା ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଚରଚରମାନଙ୍କଠାରୁ ଚିହ୍ନି ହେବ । ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ଏପରି ଯେ ଚୁପ୍‌ଚୁପ୍ ରହିଥିଲବେଳେ ଝଡ଼ା ପତ୍ର ସହଜ ତାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମିଳିଥାଏ; ଫଳରେ ଚରଚରଟାଏ ଅଳ୍ପ ବୋଲି ଆଦୌ ଜଣା ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଏହା ଭୂମିରେ ନିହତ୍ରୟରେ ଚଳିଯିବା କରେ ଓ ଉଇଭଲ (Weevil) ପତଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟ ଚଢ଼ୁଥାଏ । ଶାନ୍ତିରଙ୍ଗ ହେଲେ ଏହା ନିକଟସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ଉଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଉପଦ୍ରବ ବନ୍ଦ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଆହାର ଖୋଜେ । ଉଡ଼ିଲବେଳେ ଏହା କ୍ଷୀଣ ସ୍ବରରେ ‘(ଟି)ସିପ୍—(ଟି)ସିପ୍’ ଶବ୍ଦ କରେ । ଆମ ଦେଶର ଦୂରରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ମଞ୍ଜି ରଚନା କରି ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । ସେଠାରେ ମାଈପକ୍ଷୀକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମଧୁର ସ୍ବଦ କରିଥାଏ ।

ଆମ ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ନିବାସୀ ଚରଚର ହେଲା ଭାରତୀୟ ଚରଚର—ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ‘ଭରଣାୟ ଚରଚର’ (Indian Pipit) କହନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଏନ୍ଥସ ନୋଭାଏସୁଲାନଡ଼ିଆ’ (Anthus Novaesulandiae) । ଏହା ଆମ ଉପମହାଦେଶର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସକରେ ଓ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଞ୍ଜି ରଚନା କରି ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ଏହି ଚରଚର ପକ୍ଷୀ ଏକାକୀ ଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିତ ଭୂମି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୋରୁରଣ ଭୂମିରେ ଲୁହକୁ ଉପର ତଳ ଆଦୋଳିତ କରି ଚଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଡ଼ିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀ ମାତ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ଏକାକୀ ଚାଲିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଉଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଏମାନେ କ୍ଷୀଣ ସ୍ବରରେ ‘ପିପିଟ୍-ପିପିଟ୍’ ଧ୍ବନି କରନ୍ତି । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଅଣ୍ଟିରା ପକ୍ଷୀ ଆକାଶରେ କେତେ ମିଟର ଉଚ୍ଚକୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ଫଡ଼ଫଡ଼ ଶବ୍ଦ କରି ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚାଳନ

କରେ ଓ ଏକପ୍ରକାର କ୍ଷୀଣ କରମିର୍ ଶବ୍ଦ କରି ମିନଟ ଦୁଇପରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେ । ଏମାନଙ୍କର ନାଡ଼ ଅଗଭୀର କପ୍ ଭଳି ଏବଂ ଦାସ, ଚେର ଓ 'କେଶରେ' ଢିଆରି ହୋଇଥାଏ । ବେଳେ ବେଳେ ଏହା ଆଂଶିକ ଭାବେ ଗମ୍ଭୀର ପରି ହୋଇଥାଏ । ଏମାନେ ନାଡ଼କୁ ଭୂମିରେ ଢିଆରି କରନ୍ତି । ଗାଈ ମଝିଷି ଖୋଜ ଦ୍ଵାରା ମାଟିରେ ହୋଇଥିବା ଗର୍ଭି ବା ଡେଲୁଏ ମାଟି ତଳେ ବା ଛୋଟ ଗୁଦାରେ ନାଡ଼ ରହିଥାଏ । ଏମାନେ ଥରକେ ଚିନି ଗୁରୁଟି ଅଣ୍ଟା ଢିଆନ୍ତି । ଅଣ୍ଟାର ବର୍ଣ୍ଣ ହଳଦିଆସିଆ ଧଳା ବା ଧୂସରଥା ଧଳା । ତା' ଉପରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଟିପ୍ ଟିପିଆ ଓ ଛାପଛାପିଆ ଚିହ୍ନ ଥାଏ । ଏହି ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଅଣ୍ଟାର ଓହ୍ଲାଇଆ ଅଂଶରେ ଅଧିକ ଦିନ ।

ଫୁଲଗୁଣି (Flower pecker) ଡିକେଇଡ଼ି (Dicæidae) ପକ୍ଷୀବଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ଚଢ଼େଇଗୁଡ଼ିକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ଚଞ୍ଚଳ ଓ ବୃକ୍ଷବାସୀ । ଏମାନଙ୍କର ଲଞ୍ଜ କ୍ଷୁଦ୍ର, ପାତଳ ଓ ସାମାନ୍ୟ ବକ । ଏମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଗୋଜିଆ ଓ ଫୁଲ ଭିତରକୁ ପୁରାଇବା ଉପଯୋଗୀ । ଗୋଟିଏ ଜାତି ଫୁଲଗୁଣି ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତ ଭାରତ ଓ ବାଙ୍ଗଳା ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ଟିକେଲ ଫୁଲଗୁଣି (Tickell's Flower Pecker) (ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର 94) କହନ୍ତି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ଡିକେଇୟମ୍ ଏରିଥ୍ରୋରାଇନ୍‌ସ' (Dicæum erythrorhynchos) । ହିନ୍ଦୀରେ ସବୁ ଜାତିର ଫୁଲଗୁଣିକୁ 'ଫୁଲଗୁଣି' କହନ୍ତି । ଏହା ଏକ ସଦାଚଞ୍ଚଳ ସରୁଳ-ବାଦାମୀ ଓ ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣର କ୍ଷୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀ । ଏହା ଦରଚଟିଆଠାରୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଓ ସମ୍ଭବତଃ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପକ୍ଷୀ । ଏହା କେତେକ ପରିମାଣରେ ମାଈ ଫୁଲଚି (Sunbird) ପରି ; ମାତ୍ର ଏହାର ଥଣ୍ଡା ଛୋଟ ଓ ଥଣ୍ଡର ବର୍ଣ୍ଣ ମାଂସ ପରି ଲଲବାଦାମୀ । ଏମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫୁଲର ମଧୁ ଓ ଭର୍ଜିନ ଜାତୀୟ କୋଳି (berry) । ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ପରଜୀବା ସେହିପରି ଉଦ୍ଭିଦର ଫୁଲରୁ ମଧୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାନ୍ତି । ସେଭଳି ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲେ ମିଳକ୍‌ଟୋ ଉଦ୍ଭିଦ ଶ୍ରେଣୀ (Mistletoe Family); ଉଦାହରଣ—ମଲ୍‌ଜ (Loranthus) ମିଳକ୍‌ଟୋ (Viscum) । ମଲ୍‌ଜ ଫୁଲରୁ ମଧୁ ଶ୍ରେଣି ଲବେଳେ ଫୁଲଗୁଣି ପକ୍ଷୀ ସେହି ଉଦ୍ଭିଦର ପର-ପରାଗସଙ୍ଗମ ଘଟାଇଥାଏ । ମଲ୍‌ଜ ଓ ମିଳକ୍‌ଟୋର ପାତଳ ଫଳକୁ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗୋଟା ଗୋଟା ଗିଳି ଖାଏ । ଫୁଲଗୁଣି ଏହା ପରେ ଅନ୍ୟ ଗଛରେ ବସି ମଳତ୍ୟାଗ କରେ । ମଳରେ ପରଜୀବା ଉଦ୍ଭିଦର ଲକ୍ଷଣ ଓ ଅଠାଳିଆ ମଞ୍ଜି ବାହାରି ଗଛରେ ଲାଗିଯାଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ନୂଆ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଙ୍କୁରଣ ହୁଏ । ଏହିପରି

ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ଏହି ପରଜାତି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ବଣ-ବିସ୍ତାର ଦିଅଥାଏ । ଫୁଲଗୁଣି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସବୁହ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ଯାଇ ଫୁଲରୁ ମଧୁ ସେବନ କରନ୍ତି । ଉଡ଼ିଲାବେଳେ ଓ ପରଜାତି ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତରେ ଚଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଡେଇଁଗୁଲିଲାବେଳେ ଏହା ପ୍ରାୟ ଅବିରାମ ଏକପ୍ରକାର ‘ଚକ-ଚକ-ଚକ’ ଶବ୍ଦ କରେ । ବେଳେ-ବେଳେ ଏହି ଶବ୍ଦ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏକପ୍ରକାର ଶାଣ କଟିର-ମିଟିର ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ । ଟିକେଲ ଫୁଲଗୁଣିର ନାଡ଼ ଝୁଲୁଥିବା ଏକ ଅଶ୍ରୁକାର ଥଳୀ ପରି । ଏହା କେତେକ ପରିମାଣରେ ଫୁଲ୍‌ଚି (Sunbird) ପକ୍ଷୀର ନାଡ଼ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ । ଫୁଲଚି ନାଡ଼ର ବାହାର ଅସ୍ତର ଦ୍ଵାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଟିକେଲ ଫୁଲଗୁଣି ଚଢ଼େଇର ନାଡ଼ର ବାହାର ସଫା । ଏହା କୋମଳ ତନ୍ତୁ ଓ ଫଳ ଉପରର କୋମଳ ରୁଆ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ । ନାଡ଼ ପଶ୍ୟ ପରି କୋମଳ । ଏହାର ରଙ୍ଗ ସାଧାରଣତଃ ପାଟଳ-ଆସିଆ ବାଦାମୀ । ନାଡ଼ ଭୂମିଠାରୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଦଶ ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଡାଳରୁ ଝୁଲୁଥାଏ । ଧରକେ ଟିକେଲ ଫୁଲଗୁଣି ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ । ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ଧଳା । ତା’ ଉପରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନଥାଏ ।

ଆଉ ଜାତିଏ ଫୁଲଗୁଣି ଅଛି । ଏହା ଟିକେଲ ଫୁଲଗୁଣି ପରି ସାଧାରଣ; ଦେଖିବାକୁ ଅନେକଟା ତା’ର ପରି ଓ ସ୍ଵାଦି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ତା’ର ପରିକା । ଏହାକୁ ଇଂରେଜରେ ‘ମୋଟା-ଅଣ୍ଟିଆ ଫୁଲଗୁଣି’ (Thick-billed Flowerpecker) କହନ୍ତି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଡାଇସିଅମ୍ ଏଜାଇଲ୍’ (Dicaeum agile) । ଏହାକୁ ଟିକେଲ ଫୁଲଗୁଣିଠାରୁ ଚହ୍ନିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା—ଏହାର ପେଟ ପାଖରେ ଫିକା ବାଦାମୀ ରେଖା ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଅଣ୍ଟା ମୋଟା ଓ ନୀଳ-ଆସିଆ । ଏହାର ଅଣ୍ଟା ଅନେକଟା ଫିନର୍ (Finch) ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଟା ପରି ।

ଫୁଲଚି, ଫୁଲରୁଝି ବା ଫୁଲରୁଝି (Sunbirds or Honey suckers) ନେକ୍ଟାରିନିଡ଼ି (Nectariniidae) ପକ୍ଷୀ-ବଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲଗୁଣିମାନଙ୍କ ପରି ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଧାରୁ ପରି; ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ପାତଳ, ଲମ୍ବା ଓ ଫୁଲରୁ ମଧୁ ଶୁଷିବା ଉପଯୋଗୀ । ସେମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ନଳାକୃତ କିର ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଫୁଲଚିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀକୁ ଇଂରେଜରେ ‘ବାଇଗଣି ଫୁଲରୁଝି’ (Purple Sunbird) (ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର 95) କହନ୍ତି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ନେକ୍ଟାରିନିଆ ଏସିଆଟିକା’ (Nectarinia

asiatica) । ଓଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଫୁଲଚୁଇଁକୁ ଯେପରି ଫୁଲଚୁଇଁ, ଫୁଲଚି ବା ଫୁଲଚୁଇଁ କହନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀରେ ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଜାତିର ଫୁଲଚୁଇଁକୁ ‘ସକରଖୋରା’ କହନ୍ତି । ବାଇଗଣି ଫୁଲଚୁଇଁ ଘରଚଟିଆଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରେଟ । ପ୍ରଜନନ ରତ୍ନରେ ଫଣୀର ବର୍ଣ୍ଣ ଏହିପରି—ପିଠି ପାଖ ଚକଚକିଆ ଧାତବ ସବୁଜ ଓ ନୀଳଲେହନମିଶ୍ରା କଳା । ‘ବାହୁମୁଳ’ ସ୍ଥାନରେ ଗୋସ୍ତ୍ର ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ କମଳାଲେମ୍ବୁ ପରି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପରି ଥାଏ । ପ୍ରଜନନ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ରତ୍ନରେ ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀ ମାରି ପକ୍ଷୀ ପରି । ମାରି ପକ୍ଷୀର ବର୍ଣ୍ଣ ଏହିପରି—ଉପର ପାଖ ସବୁଜ-ବାଦାମୀ, ପେଟ ପାଖ ଫିକା ମସିଆ (ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୁହେଁ) ହଳଦିଆ । ପକ୍ଷ କଳା । ବକ୍ଷର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏକ ଓସାରିଆ କଳା ରେଖା ଆଗରୁ ପଛକୁ (ଉପରୁ ତଳକୁ) ବିସ୍ତୃତ । ଫୁଲଚୁଇଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଫୁଲର ମଧୁ । ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଅନେକସଂଖ୍ୟରେ ଚଞ୍ଚଳଭାବେ ପକ୍ଷ ସଂଜ୍ଞାଳନ କରି ଏ ଫୁଲରୁ ସେ ଫୁଲକୁ ଉଡ଼ି ଉପରୁ ତଳକୁ ବା ଅନ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ଭାବେ ଫୁଲକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଜଳମଣ୍ଡଳ (corolla) ଭିତରେ ପାତଳ ବନ୍ଦ ଅଣ୍ଟା ପୁରାଇ ମଧୁ ଖାଆନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ ଫୁଲଚୁଇଁ ପକ୍ଷୀ ଫୁଲ ଉପରେ ପକ୍ଷୀବତ୍ ମଧୁ (Hawk moth) ପରି ଉଡ଼ି, ଦ୍ରୁତବେଗରେ ପକ୍ଷ ସଂଜ୍ଞାଳିତ କରୁଥିଲା ବେଳେ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଭରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ବା ଛୁଦ୍ର ଜାତିର ଟୁଙ୍ଗି ନିଏ । ଅବଶ୍ୟ ଏଭଳି ଶୁଦ୍ଧରେ ମଧୁ ଖାଇବା ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ । ନବ ଗୋଲ୍ଡ (New World)ର ଗୁଞ୍ଜନ ପକ୍ଷୀ (Humming birds) ଆମର ଫୁଲଚୁଇଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାତ ନୁହଁନ୍ତି । ଫୁଲ ଉପରେ ଉଡ଼ି ଭରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ମଧୁ ଖାଇବା ଗୁଞ୍ଜନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଶୁଦ୍ଧ । ବାଇଗଣି ଫୁଲଚୁଇଁ ପୁଷ୍ପଭର ଶାଖାମାନଙ୍କରେ ଉଡ଼ିବୁଲୁଥିଲାବେଳେ ଛୁଦ୍ର ଏକପଦବିଶିଷ୍ଟ ‘ଉଇଇର୍, ଉଇଇର୍’ ଶବ୍ଦ କରେ । ପ୍ରଜନନ ରତ୍ନରେ ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀ ଖୋଲି ଜାଗାରେ ପସନ୍ଦନ ଗଛର ଉପର ଶାଖାରେ ବା ଟେଲିଗ୍ରାଫ୍ ତାର ଉପରେ ବସି ଉତ୍ତେଜିତ ଭାବେ ଗୀତ ଗାଏ । ଏ ସମୟରେ ସେ ଦୁଇକଡ଼କୁ ଦୋହଲେ, ଉତ୍ତେଜିତ ଭାବେ ଡେଣାକୁ ଉପରକୁ ଡୋଳି ଓ ତଳକୁ ନୁଆଁଇ ‘ବଗଲ’ (armpit)ରେ ଥିବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହଳଦିଆ ଓ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପକ୍ଷ ପୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ଲଞ୍ଜର ପକ୍ଷକୁ ଟେଣାଲୁଥାଏ ବୁଲୁଥାଏ, ଖୋଲୁଥାଏ ବୁଲୁଥାଏ । ତା’ର ଏ ସମୟର ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ପୁର୍ତ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ; ମାତ୍ର ଦ୍ରୁତ ଉଚ୍ଚାରିତ ‘ଚିଉଇଟ୍, ଚିଉଇଟ୍, ଚିଉଇଟ୍’ ଚିତ୍କାର ପରି । ଅନ୍ୟ ଫୁଲଚୁଇଁ ପରି, ବାଇଗଣି ଫୁଲଚୁଇଁର ନାଡ଼ ଅଶ୍ରାକାର, ଗଛରୁ ଝୁଲୁଥାଏ ଏବଂ କୋମଳ ଘାସ, ଅସ୍ମର ଓ

ଚିତ୍ର ନଂ 101

କଳାମୁଣ୍ଡି ଗାଦାମ ପକ୍ଷୀ (Blackheaded Bunting) ଓ

ଲାଲମୁଣ୍ଡି ଗାଦାମ ( Redheaded Bunting )

ପୃଷ୍ଠା ନଂ 176 ଦେଖ







ବୁଡ଼ି ଆଣି ଜାଲରେ ଘିଆରି ହୋଇଥାଏ । ମାଡ଼ର ବାହାର ପଟେ କାଗଜ ପରି ପତଳା ଗଛଛଲି ଓ ସମ୍ଭାଳୁଆ ମଳ ଲେସା ହୋଇଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ବସାକରୁଥିବା ବଙ୍ଗଳା ଘରର ଲତା ଗଛ ବା ମାଟୁ ବୁଢ଼ାରେ ଏମାନେ ମାଡ଼ ଘିଆରି କରନ୍ତି । ମାଡ଼ ଭୂମି ଉପରୁ ଘନ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ନଥାଏ । ବାଇଗଣି ଫୁଲରୁଁ ଥରକେ ଦୁଇ ଘନୋଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ । ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଧୂସରୀଆ ବା ସବୁଜ-ଆସିଆ ଧଳା । ତା' ଉପରେ ବାଦାମୀ ଓ ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣର ଚିହ୍ନ ଥାଏ ।

ବାଇଗଣି ପିତ ଫୁଲରୁଇଁ—ଏହାକୁ କଂଗ୍ଗାରେ ‘ବାଇଗଣି ପିଗୁବଣିଷ୍ଟ ଫୁଲରୁଇଁ’ (Purple rumped sunbird) ବୋଲି କହନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ନେକ୍ଟାରିନିଆ ଜିଲେନିକା’ (Nectarinia zeylonica) । ଭାରତୀୟ ଉପଦ୍ଵୀପରେ ସମତଳ ଭୂମିରେ ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାତି ଫୁଲରୁଇଁ ପକ୍ଷୀ । ଅଣ୍ଡିର ପକ୍ଷୀର ମସ୍ତକ, ପିଠି ପାଖ ଓ ଗୁଡ଼ି ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାତବ ସବୁଜ, ଗାଡ଼ ଲାଲ ଓ ବାଇଗଣି । ନିତମ୍ବ ଅଂଶ ଧାତବ ମାଲ-ଆସିଆ ବାଇଗଣି । ପେଟ ପାଖ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ । ମାଛ ପକ୍ଷୀ ମାଛ ବାଇଗଣି ଫୁଲରୁଇଁ ପକ୍ଷୀ ପରି; ମାତ୍ର ତା'ର ଚରୁକ ଓ ତଣ୍ଡି ଅଂଶ ଧୂସରୀଆ ଧଳା ଏବଂ ପେଟ ପାଖ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହଳଦୀବର୍ଣ୍ଣ ।

ଫୁଲପିକ୍ସ (Flower pecker) ଓ ଫୁଲରୁଇଁ (sunbird) ପକ୍ଷୀ-ଶ୍ରେଣୀର ନିକଟ ଶାବ୍ଦ ହେଲା ଜୋଷ୍ଟେରେପିଡ଼ି (Zosteropidae) ଶ୍ରେଣୀର ପକ୍ଷୀ । କ୍ଷତ୍ର ଲଳିତା ବାବୁନା ପକ୍ଷୀ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର (ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର ୨୬) । ଏହାର କଂଗ୍ଗା ନାମ ‘ଶ୍ୱେତ-ଚକ୍ଷୁ ପକ୍ଷୀ’ (White-eye) । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଜେସ୍ଟୋରପସ ପାଲପିବ୍ରୋସା’ (Zosterops palpebrosa) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ—ବାବୁନା । ଏହା ଗୋଟିଏ ସବୁଜିଆ-ହଳଦିଆ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣର ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀ । ଲଞ୍ଜ ଚାରିକୋଣିଆ । ଆଖି ଚାରିପଟେ ‘ଚପମା’ ଏକ ପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଧଳା ମୁଦ୍ରା କା ଥାଏ । ଅଣ୍ଡ ପାତଳ, ଗୋଜିଆ ଓ ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼ । ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ରହୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ପାଞ୍ଚରୁ ୧୦ଟି ଯାଏ ପକ୍ଷୀ ଥାନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପକ୍ଷୀ ଥିବା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ବାବୁନା ପକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ପକ୍ଷୀ । ବୃକ୍ଷ ଓ ବୁଢ଼ାରେ ଲୁଚିଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଓ କୀଟକୁ ଟଙ୍କିବା ପାଇଁ ପକ୍ଷ ଓ କଡ଼କୁ ତନ୍ମତନ୍ମ କରି ତଳି କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ବିତେ । ସକାଳରେ ଖେଳ ଦେଖାଇଲ ପରି ଏତେବେଳେ ଏମାନେ ନାନାପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ ଓ ଭଙ୍ଗୀରେ ଡାଳପତ୍ରକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ସେସବୁକୁ

ପକ୍ଷୀ-ନିରୀକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି । ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଓ କାଟପତଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ପାତଳ ଫଳ ଓ କୋଲର ଶସ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଜାତି ଗଛର ଫୁଲରୁ ମଧୁ ଖାଇବା ଫଳରେ ସେମାନେ ପର-ପରାଗ-ସଙ୍ଗମରେ ସହାୟତା କରନ୍ତି । ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ଜାଗାକୁ ଜାଗା ଡେଇଁଲେ ଓ ଉଡ଼ିଲେ ବେଳେ ବାବୁନା ପକ୍ଷୀ ଅବିରତ ଏକ-ପ୍ରକାର କ୍ଷୀଣ ଝୁଣଝୁଣିଆ ବା କିଚିର-ମିଚିର ଶବ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତି । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଦଳ ଗଢ଼ିଯାଏ । ଅଣ୍ଡା ଚଢ଼େଇମାନେ ଏକପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଛୁଦ୍ର ଠୁଣଠୁଣିଆ ସ୍ତନ କରନ୍ତି । ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳର ‘ଫିକାମଳ ମକ୍ଷିଧାରକ ପକ୍ଷୀ’ (Verditer Flycatcher) ପକ୍ଷୀସ୍ତନର ଏକ ସଂସ୍କରଣ ପରି ମନେହୁଏ । ଏହି ଗାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାବେଳେ ଅତି କ୍ଷୀଣ, ପ୍ରାୟ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ; ତା’ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ହୁଏ, ପୁଣି ତିନି ଗୁଣ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କ୍ଷୀଣରୁ କ୍ଷୀଣତର ହୋଇ ମିଳାଇଯାଏ । ବାବୁନା ପକ୍ଷୀ ଚମତ୍କାର ପୋଷା ମାନନ୍ତି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋଷା ମାନି ବର୍ଣ୍ଣାସରେ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଓ ଏକାବେଳକେ ପୋଷ୍ୟ ହୋଇଯାନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ମାଡ଼ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ପରି, ଦକ୍ଷତାର ସହଜ ତନ୍ତ୍ରରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରେ ଭଲ କରି ଲିପା ହୋଇଥାଏ । ଏହି ମାଡ଼ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ହଳଦୀବସନ୍ତ (Oriole) ଚଢ଼େଇ ମାଡ଼ର ଏକ ଛୁଦ୍ର ସଂସ୍କରଣ ପରି । ହଳଦୀବସନ୍ତର ମାଡ଼ ପରି ଏହା ବୃକ୍ଷଜାଲ ଆଗରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଜାଗାରେ ନାବିକମାନଙ୍କର ଦୋହଲ୍ୟାମାନ ଶଯ୍ୟା ପରି ଝୁଲୁଥାଏ । ବୁଦା ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଛରେ ତଳୁ 2/3 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ମାଡ଼ ରହୁଥାଏ । ବାବୁନା ପକ୍ଷୀ ଥରକେ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ । ଏହା ଫିକାମଳ ଓ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର । ତା’ ଉପରେ କୌଣସି ଛଟା ବା ଦାଗ ଚିହ୍ନ ନଥାଏ । ବେଳେ ବେଳେ ଅଣ୍ଡାର ଓସାରୀଆ ପାଖର ଅଗ୍ରଭାଗ ଦନମଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଟୋପି ପରି ଦେଖାଯାଏ ।

ଚଟକ (Sparrow) ଓ ବାୟା (Weaver) ଚଢ଼େଇ ପ୍ଲୋସେଇଡ଼ି (Ploceidae) ପକ୍ଷୀ-ବଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଯେଉଁମାନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବଂଶର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି । ଏମାନେ ଅତି ପରିଚିତ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ହେଲା ଘରଚଟିଆ (ଫିଣ୍ଟିଚ 97)—ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ଘରଚଟିଆ’ (House sparrow); ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ପାସେର ଡୋମେଷ୍ଟିକାସ’ (Passer domesticus) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ ଗୌରିୟୁୟା । ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁଠି ମନୁଷ୍ୟ ବାସ ପାଇବେ ସେଠି ଘରଚଟିଆ ଦେଖିହେବ ।

ବର୍ଣ୍ଣର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିହ୍ନ ଯଥାଯଥ । ମାଛ ଘରଟିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ମାଟିଆ ବାଦାମୀ, ପିଠି ପାଖରେ କଳାପିଆ ଓ ଫିକା ବାଦାମୀ ଡୋରୀଆ ରେଖା ପଡ଼ିଥାଏ । ପେଟ ପାଖ ଧଳା । ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଜନାକ୍ଷୀ ନଗର ଅଥବା ଶୁଦ୍ଧ ପଲ୍ଲୀ ଅବା ବଗିଚା ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସବୁଠାରେ ଘରଟିଆ ମନୁଷ୍ୟ ସାଥରେ ସହଭୋଜୀ ରୂପେ ବାସକରେ । ଦୂରଦୂରନ୍ତରେ ମନୁଷ୍ୟ ବସବାସ କରିବାମାତ୍ରେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ । କ୍ରମେ ସେ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଆଦରଯାନ୍ତି । ଶାନ୍ତରୂପେ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଶ୍ୟାମ୍ବେତରେ ଓ ତା' ନିକଟରେ ଚରନ୍ତି । ଭୂମିରେ ବିଶ୍ରାମ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଶ୍ୟାମ୍ବେତ ଓ ଗଜ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଆହାର । ସେମାନେ ପାଚିଥିବା ଗହମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଲି ଜାତୀୟ ଶ୍ୟାମ୍ବେତ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି । ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ଘରଟିଆ ଏପରି ଶ୍ୟାମ୍ବେତ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ବିସ୍ତର କରନ୍ତି । ଗ୍ରାମ ଓ ସହରମାନଙ୍କରେ ଘରଟିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ଗାଈମଝିପିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣି ନ ହୋଇ ବାହାରିଥିବା ଶ୍ୟାମ୍ବେତ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଘରଟିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଫୁଲର କଢ଼କୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତି । ଏଣୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ପନିପରିବା ଗୁଣ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଘରଟିଆକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନର ପ୍ରତିଭୁଲନ (Counter balance) କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୃତ ଉପକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି । କାରଣ ସେମାନେ ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ଜୀବଜଗତ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଘରଟିଆ ଶାବକମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦେବାପାଇଁ ପ୍ରାୟ କେବଳ ସି ବାଳୁଆ ଓ ନରମ ଦେହ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଅସଲ ଗଛରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଥାଏ । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପକ୍ଷୀର ରବ ଉଚ୍ଚ, ଏକ ଭାବାପନ୍ନ ଏବଂ ବିରକ୍ତକର 'ସି, ସି, ସି' ବା 'ଚେର, ଚେର' । ଏତେବେଳେ ସେ ତା'ର ନରମ ପରିକୁ ଫୁଲାଇ ଦିଏ, ପିତ୍ତ ଅଂଶକୁ ଧନୁ ପରି ଅର୍ଦ୍ଧ-ବୃତ୍ତାକାର କରେ, ପକ୍ଷକୁ ଦୁଇ କଢ଼କୁ ଝୁଲାଇଦିଏ । ଅଳ୍ପ ଉପରକୁ ଟେକି ରହିଥିବା ପୁରୁକୁ ଝୁଙ୍କାଇ ସଂଗ୍ରହରେ ଗୁଲେ । ପକ୍ଷର ଗଛ ବା ବୃକ୍ଷରେ ରହି ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଘରଟିଆମାନେ ଏକଦିଗ ଦୃଷ୍ଟିନ୍ତି । ଏତେବେଳେ ଶୋଇଲୁଆଏ ସେମାନେ ଶୁଷ୍କ କଲହ ଓ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏମାନେ କୁଟା ଓ ଫେପଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରି ଘରର କଣା ଓ ବରଗାତଳେ ମାଡ଼ ରଚନା

କରନ୍ତି । ଘରେ ମନୁଷ୍ୟ ବାସ କରୁଥାନ୍ତୁ ବା ନକରୁଥାନ୍ତୁ କହୁ ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ।  
 ଘରଚଟିଆ ଅରକେ ତିନୋଟିରୁ ପାଞ୍ଚଟିଯାଏ ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ଅଣ୍ଟାର ବର୍ଣ୍ଣ ଫିକା  
 ସବୁଜ-ଆସିଆ ଧଳା । ତା' ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନ ଥାଏ ।

ବାୟା ଚଢ଼େଇ ( ବର୍ଣ୍ଣବିନ୍ଦ ୨୫ ) କୁ ଇଂରାଜୀରେ 'ବାୟା ବୁଣାଳି ପକ୍ଷୀ'  
 (Baya Weaver bird) ବୋଲି କହନ୍ତି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ 'ପ୍ଲୋସିଆସ  
 ଫିଲିପାଇନାସ' (Ploceus philippinus) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ ବାୟା । ଏମାନେ  
 ତିଆରି କରୁଥିବା ଅସାଧାରଣ ବକଯନ୍ତ୍ର ଆକାରର (Retort-shaped) ନାଡ଼  
 ଯୋଗୁ ବଖାଏ । ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ନିକଟରେ ଗଛଡାଳରୁ ଏହି ନାଡ଼ମାନ ଝୁଲି ରହୁଥାଏ ।  
 ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀର ସାଜପୋଷାକ ବର୍ଣ୍ଣବିନ୍ଦରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ।  
 ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଅଣ୍ଟିର ଓ ମାରି ବାୟା ଚଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ  
 ଏକାପରି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ୍ କରି ହୁଏ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ  
 ଅନେକ ପରିମାଣରେ ମାରି ଘରଚଟିଆ ପକ୍ଷୀ ପରି; ତଥାତ୍ ଭିତରେ ବାୟା  
 ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଟା ଅଧିକ ମୋଟ ଓ ଲଞ୍ଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ । ଏମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଖୋଲ  
 ସ୍ଥାନରେ, ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଗୁଣ୍ଠପାଖରେ ବାସ କରନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ ଅତି ଅଧିକ  
 ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଳ ବାନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ସେମାନେ ପାତ୍ରଧରା ତାଳିକାପାୟ  
 ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ତର କ୍ଷତି କରନ୍ତି । ସେମାନେ  
 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଗମନ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର  
 ଏହି ଅଭିଗମନ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଓ ଗୁଣ୍ଠକାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଧାନଗୁଣ୍ଠ ଉପରେ  
 ନିର୍ଭର କରେ । ଗୁଣ୍ଠିଆପନ କରିବା ପାଇଁ ବାୟା ଚଢ଼େଇ ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ନଳ  
 ବଣ ଓ ଅଣ୍ଟା କିଆରିରେ ଏକାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଘରଚଟିଆ ଓ ବଣି ଚଢ଼େଇଙ୍କ  
 ସହ ମିଶି ରାତି କଟାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଡାକ ଘରଚଟିଆର ଡାକ ପରି  
 'ଚିଟ୍-ଚିଟ୍-ଚିଟ୍' । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଅଣ୍ଟିର ବାୟା ପକ୍ଷୀ 'ଚିଟ୍-ଚିଟ୍-ଚିଟ୍' ପଛକୁ  
 ଆନନ୍ଦଜନକ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଟଣା 'ଚି-ଇ' ସ୍ବର କରେ । ନାଡ଼କୁ ଜାଗୁଡ଼ି ରହୁ ନାଡ଼  
 ବୁଣୁଥିଲା ବେଳେ ମାରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀମାନେ  
 ଉପରୋକ୍ତମତେ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବେ କୋରସ ଗାଇଲା ଧର ଧନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶିକ  
 ଭାବେ ଡେଣା ଫଡ଼ଫଡ଼ କରନ୍ତି । ଏହି ବାୟା ଚଢ଼େଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିର  
 ବାୟାମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ବେଳର ଆଚରଣ ଅନନ୍ୟ । ସେଇ ଏକ କଲେମାରେ,  
 ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ନାଡ଼ ଅଧା କରି ରଚନା କରେ; ଅର୍ଥାତ୍

ଗୋଟାଏ ନାଡ଼ ଅଥା ରଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରେ । ସେଇଟି ଅଥା ହୋଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଡ଼ ବୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରେ । 'ମାଛ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଆସି ତା'ର ସାଥୀ ହେଲେ, ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀ ଅଥା କରିଥିବା ନାଡ଼ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ । ଏହୁରୂପେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଟିର ବାୟା ପାଞ୍ଚଟି ଯାଏ ନାଡ଼ ରଚନା କରେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଏକ ସମୟରେ ଦୁଇଟିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଘରେ ମାଛ ପକ୍ଷୀ ସହଜ ସଂସାର କରି ଛୁଆପିଲା କରେ । ନାଡ଼ ବକଯନ୍ତ୍ର ପରି (retort-shaped) । ଏହା ଝୁଲୁଥାଏ ଓ ଏଥିରେ ଲମ୍ବା ନଳୀ ପରି ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାର ରହିଥାଏ । ନାଡ଼ ଧାନଗଛ ପତ୍ରକୁ ଚିରି କରାଯାଇଥିବା ରୁଆ ଓ ରୂଷ ଧାରଯୁକ୍ତ ଘାସର ପତ୍ରରେ ବୁଣା ହୋଇଥାଏ । ବାବୁଲ ଗଛର ଶାଖା, ତାଳ ଗଛର ଚୂଳୁପୁକ୍ତ ପତ୍ର ବା ସେହିପରି ଗଛରୁ ନାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଗୋରୁ ଗୋରୁ ହୋଇ ଝୁଲୁଥାଏ । ପାଣି ପାଖ ଗଛରେ ବାୟା ଚଢ଼େଇ ସାଧାରଣତଃ ନାଡ଼ ରଚନା କରୁଥିବାରୁ ବସାଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଉପରେ ଝୁଲୁଥାଏ । ମାଟି ଓଦା ଥିଲାବେଳେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଆଣି ବାୟା ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଟା କୋଠର ଗୁମ୍ଫାରେ ଲଗାଇଥାଏ । ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଜଣାନାହିଁ । ମାଛ ବାୟା ଥରକେ ଦୁଇରୁ ଚାରିଟି ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ଅଣ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ।

ଆଉ ଦୁଇଟି ଜାତି ବାୟା ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱେଦ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସୀମାବଦ୍ଧ । ଗୋଟିକର ନାମ ଖୁଦ୍‌ଦିଆ ଓ ଅନ୍ୟଟିର ନାମ ସୋରବାୟା । ଏମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ ଯଥାକ୍ରମେ 'ରେଣିତ ବୁଣାଳ ପକ୍ଷୀ' (Striated Weaver Bird) ଓ 'କଳାକଣ୍ଠ ବୁଣାଳୀ ପକ୍ଷୀ' (Blackthroated Weaver Bird) କହନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଯଥାକ୍ରମେ 'ପ୍ଲୋସିଆସ ମାନୟାର' (Ploceus manyar) ଓ 'ପ୍ଲୋସିଆସ ବେଙ୍ଗାଲେନସିସ' (Ploceus benghalensis) । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପରର ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ହୁଏ । ସେତେବେଳେ ଅଣ୍ଟିର ଖୁଦ୍‌ଦିଆର ଗୁଡ଼ି ହଳଦିଆ ବାଦାମୀ, ତା' ଉପରେ କଳାରଙ୍ଗର ରେଖା ଦାଗ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ମସ୍ତକର ଚୂଡ଼ା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହଳଦିଆ । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଅଣ୍ଟିର ସୋର ବାୟାର ମସ୍ତକର ଶିଖର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ହଳଦିଆ, କଣ୍ଠ ଧଳା ଓ ପେଟ ପାଖ ଧଳା । ପେଟ ପାଖର ଧଳା ଅଂଶ ଢେଙ୍କିର ଧଳା ଅଂଶଠାରୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ କଳା ଗୁଡ଼ି ପଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଥମିକ ରହିଥାଏ । ପାଣି ବା ଜଳାଭୂମିରେ ଉଡ଼ି ଘାସ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଯିବା ଜାତିର ବାୟା ପକ୍ଷୀ ନାଡ଼ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି ।

ଲଲ ବାରମାସୀ (ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର 99-4) । ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ‘ଲଲ ମୁନିଆ’ (Red Munia) ଓ ହିନ୍ଦୀରେ ଲଲ, ଲଲ ମୁନିଆ କହନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଏସ୍ଟ୍ରିଲ୍ଡା ଆମାନଡାଭା’ (Estrilda amandava) । ଏହା ଘରଚିପିଆଠାରୁ ସାନ । ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଜନନ ଋତୁର ସାଜପୋଷାକରେ ପୁରୁଷ ପକ୍ଷୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷୀ ଏକାପରି । ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା—ପିଠି ପାଖ ବାଦାମୀ, ଡା’ ଉପରେ ବନ୍ଧିତ୍ର ଭାବେ ଧଳା ଚିପିଚିପିଆ ଚିହ୍ନ ଥାଏ । ଥଣ୍ଡ ଓ ନିକମ୍ବ ଅଂଶ ଗାଢ଼ ଲାଲ । ଲଞ୍ଜ ଗୋଲ୍‌ଲାର; ତେଲିଆ ବାରମାସୀ (Spotted Munia) ପରି ଗୋଜିଆ ନୁହେଁ । ବୃତ୍ତି ଓ ଆଚରଣରେ ଏହି ବାରମାସୀ ଚଢ଼େଇଟି ବାରମାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ସନ୍ତ୍ରସନ୍ତ୍ରାସୀ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ କରି ଜୋର ନିକଟରେ ଶରବଣ ବା ଫୁଲ ଧରୁଥିବା ଉଚ୍ଚ ଘାସବଟରେ ଲଲ ବାରମାସୀ ପକ୍ଷୀ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ରହନ୍ତି । ଘାସର ଖଜ ଓ ଲାଟପଟକ ଏମାନଙ୍କର ଆହାର । ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ପୁରୁଷ ପକ୍ଷୀମାନେ କ୍ଷୀଣ ସ୍ତରରେ ବହୁକ୍ଷଣ ଧରି କିଚିରି-ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି । ଲଲ ବାରମାସୀକୁ ଲେନେ ପିଞ୍ଜରରେ ପୁରାଇ ପାଳନ୍ତି । ଏଣୁ ଅନେକ ଯମୟରେ ଏହା ପିଞ୍ଜର-ପକ୍ଷୀ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ପ୍ରକୃତ-ରାଜ୍ୟରେ ଲଲ ବାରମାସୀ କେଉଁଠି ଥାଏ ଲେନେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ । ଏମାନଙ୍କର ନାଡ଼ ଘାସରେ ଢିଆର ହୋଇଥାଏ, ଗୋଲ୍‌କାର ଓ ତା’ର ଦ୍ଵାର କଡ଼କୁ ରହିଥାଏ । ନାଡ଼ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଘାସ ଓ ପର ଦିଆଯାଇଥାଏ । ବୁଦାମ ନଙ୍କରେ ନାଡ଼ ଭୂମିଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥାଏ । ଏମାନେ ଧରଣେ ସାଧାରଣତଃ ଗୁରୁତ୍ଵରୁ ସାତଟି ଯାଏ ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । ଅଣ୍ଟାର ବର୍ଣ୍ଣନିର୍ମଳ ଧଳା ।

ତେଲିଆ ବାରମାସୀ (ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର 99-3)—ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ଚିପିଚିପିଆ ବାରମାସୀ (Spotted Munia) କୁହାଯାଏ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘ଲଞ୍ଚୁରା ପାଙ୍କ୍ଟୁଲାଟା’ (Lonchura punctulata) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ—ତେଲିଆ ମୁନିଆ, ସିନେଓଡ଼ା । ଏହା ଆକାରରେ ଲଲ ବାରମାସୀ ପକ୍ଷୀ ପରି; ମାତ୍ର ଲଞ୍ଜ ଗୋଜିଆ । ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ମାରି ଓ ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଅଗ୍ରାପ୍ରବୟସ୍କ ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀର ବର୍ଣ୍ଣ ଉଣା ଅଧିକେ, ସାଧାରଣତଃ ବାଦାମୀ । ଗୁପ୍ତ-ଜମି ନିକଟରେ ତେଲିଆ ବାରମାସୀ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଦୁଇଗହ ଯାଏ ପକ୍ଷୀ ଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଭୂମି ଉପରେ ବନ୍ଧିତ୍ରଭାବେ ପଡ଼ୁଥିବା ଘାସମଞ୍ଜିକୁ ଟୁଙ୍ଗି ଖାନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ ବର୍ଷା ପରେ ଉଚ୍ଚ-



ହୁଙ୍କାରୁ ଝଡ଼ିଯୋକ ବାହାରୁଥିଲାବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ଖାନ୍ତି । ଶାନ୍ତିଭଙ୍ଗ ହେଲେ ଚଢ଼େଇଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୀଣ କିଛି-ମିଛି ଶବ୍ଦ କରି ନିକଟସ୍ଥ ଗଛକୁ ଉଡ଼ିଯାନ୍ତି । ତେଲିଆ ବାରମାସୀ ପକ୍ଷୀ ଦଳ ଉଡ଼ିଗଲାବେଳେ ଘନଭାବେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ରେଖାରେ ଯାଯା କରନ୍ତି । ଏଭଳି ଉଡ଼ିତ୍ ସ୍ଥାନ ବାରମାସୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ । ଲଲ ବାରମାସୀ ପକ୍ଷୀର ମାଡ଼ ପରି ଏମାନଙ୍କର ମାଡ଼ ଗୋଲକାର । ମାଡ଼ର ଦ୍ୱାର କଡ଼କୁ ଥାଏ ଓ ତାହା ଟିକେ ଲମ୍ବି ଯାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନଳ ପରି ହୋଇଥାଏ । ବୁଢ଼ାରେ ଭୂମିଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚରେ ମାଡ଼ ରହୁଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ 10।15 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ତାଳଗଛ ଜାତୀୟ (Palmyra palm) ଗଛର ଡାଳ ବା ମଥାରେ ତେଲିଆ ବାରମାସୀର ମାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଅରବିକ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଚାରିଟିରୁ ଆଠଟି ଯାଏ ନିର୍ମଳ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣର ଅଣ୍ଟା ଦେଇଥାଏ ।

ଫିନଚ୍ (Finch) ପକ୍ଷୀମାନେ ଫିଙ୍ଗିଲିଡ଼ି (Fringillidae) ପକ୍ଷୀଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏମାନେ ଘରଟିଆମାନଙ୍କର ନିକଟ ଛାଡ଼ି । ଏମାନେ ଘରଟିଆ ପରି ଦେଖିବାକୁ; ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବର୍ଣ୍ଣର । ଭାରତୀୟ ଫିନଚ୍ ପକ୍ଷୀର ଏକ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ହେଲା ତୁଡ୍ ବା ଲଲତୁଡ୍ (ବର୍ଣ୍ଣସୂଚକ 100) । ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ‘ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ଗୋଲପି ଫିନଚ୍’ (Common Indian Rosefinch) ଓ ‘ହଗସନ୍ ଗୋଲପି ଫିନଚ୍’ (Hogson's Rosefinch) କହନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ‘କାରପୋଡ଼ୋକାସ୍ ଏରିଥ୍ରିନସ୍’ (Carpodacus erythrinus) । ହିନ୍ଦୀ ନାମ—ତୁଡ୍, ଲଲତୁଡ୍ । ଏହା ଭାରତୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପକୁ ଶୀତ କାଳରେ ଆଗନ୍ତୁକ ପକ୍ଷୀଭାବେ ଆସିଥାଏ । ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀର ମସ୍ତକ, ଗୁଡ଼ ଓ କାନ ଅଂଶ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲପି ରଙ୍ଗ । ମାରି ପକ୍ଷୀର ବର୍ଣ୍ଣ ସରୁକ ଆଭ୍ୟୁକ୍ତ ବାଦାମୀ । ଅଣ୍ଟିର ଓ ମାରି ପକ୍ଷୀ ଉଭୟର ଅଣ୍ଟା ଶଙ୍ଖାକାର (Conical), ଲଞ୍ଜ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ଦ୍ୱିଶାଖ ଓ ପକ୍ଷରେ ଫିକା ଯୋଡ଼ା ଶଳାକା ରେଖା ଥାଏ । ଶଙ୍ଖାକାର ଅଣ୍ଟା ଫିନଚ୍ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ । ଲଲତୁଡ୍ ଶରତ୍ କାଳରେ ଆସି ଆମ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି । ଶୀତକାଳଟି ଏଠାରେ କଟାଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱଦେଶକୁ ବାହାରିଯାନ୍ତି । ଶରତ୍ କାଳରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବାବେଳେ ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପକ୍ଷଧାରର ବର୍ଣ୍ଣ ଫିକା ଥାଏ । ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ପର ଉଠେ ବା ପକ୍ଷର କ୍ଷୟ ଯୋଗୁ ଘନ ଲଲ ଦେଖାଯାଏ । ଲଲ ତୁଡ୍ ପକ୍ଷୀ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଚାରିପ୍ରାନ୍ତ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଦଶଟିରୁ କୋଡ଼ିଏଟି ଯାଏ ପକ୍ଷୀ ଥାନ୍ତି ।

ଏମାନେ ଗୁଲ୍ମୋଦ୍ୟାନ ଓ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥାନ୍ତି । ଫୁଲର ଚାନ୍ଦି, ନାଗଦାଣ୍ଡ ଫଳ, ଭାଙ୍ଗିତ ଜାତୀୟ କୋଳି, ବର ଓ ଓଷ୍ଠ ଗଛର ଫଳ, ମିଳିଲେ ବାଉଁଶ ଗଛର ମଞ୍ଜି, ପାଚିଲା ଜହ୍ନା (jowar), ଲିନସିଡ (linseed) ଓ ବାଲଗ ଆଦି ଶସ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ । ଶିମିଳି (Salmaia), ପାଲଧୁଆ (Erythrina) ଆଦି ଗଛର ଫୁଲରୁ ଏମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦମିତ ମଧୁ ଆହରଣ କରନ୍ତି । ଫୁଲ ଭିତରେ ମୁହଁ ପୁରାଇ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କଲବେଳେ ଏମାନଙ୍କର କପାଳ ଓ ଗଳାର ପରିରେ ପରାଗ ଲାଗିଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଫୁଲକୁ ଯାଇ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କଲବେଳେ ସେଠାରେ ପୂର୍ବ ଗଛର ପରାଗ ପଡ଼େ । ଏହିପରିଭାବେ ଲାଲଗୁଡ଼ିଏ ଏହି ଗଛମାନଙ୍କରେ ପର-ପରାଗ-ସଫଳରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏହି ପକ୍ଷୀର ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ଏକପ୍ରକାର ସଙ୍ଗୀତମୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସୁସ୍ବର ଶବ୍ଦ ‘ଟୁଇ ?’ ବା ‘ଚୁଇଇ ?’ ପରି ଶୁଣାଯାଏ । ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲବେଳେ ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ଅବରାମ ଭାବେ କରୁଥାନ୍ତି । ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ସ୍ବଦେଶକୁ ବାହୁଡ଼ିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ସମୟରେ ଅଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦେଶିକ ଉଚ୍ଚ ସଙ୍ଗୀତ-ଧ୍ବନି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ । ଲାଲଗୁଡ଼ିଏ କାଶ୍ମୀର ଓ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଉଚ୍ଚ ଭୂମିରେ ମାତ୍ର ରଚନା କରୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର କିପି ପରି ଦାସରେ ଚିଆର ହୋଇଥାଏ । ସେଥିରେ ତେର ଓ କେଶ ମଧ୍ୟ ଚିଆଯାଇଥାଏ । ଭୂମିଠାରୁ ଏକ ବା ଦୁଇମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ବଞ୍ଚୁଆ ଗୋଲପ ବା ସେହିପରି କଣ୍ଟାମୁକ୍ତ ଗଛରେ ମାତ୍ର ରଚିତ ହୋଇଥାଏ । ଥରକେ ଚିନି ଗୁରୁଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି । ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ମାଳ । ତା’ ଉପରେ କଳାସିଆ ଫିକା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଓ ଛଟା-ଚନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ିଥାଏ ।

ପାସାରଫର୍ମିସ (Passeriformes) ପକ୍ଷୀବର୍ଗର ଶେଷ ପକ୍ଷୀ-ବଂଶ ହେଲା ଏମ୍ବେରିଜିଡ଼ି (Emberizidae) । ଗାନ୍ଧୀମ ପକ୍ଷୀ (Bunting) ଏହି ବଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗାନ୍ଧୀମ ପକ୍ଷୀ ଫିନ୍ଚ ପକ୍ଷୀ ପରି; ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପାତଳା, ଦେହ ଓ ଲଞ୍ଜ ଅଧିକ ଲମ୍ବା । ପିପିଟ (Pipit) ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଗାନ୍ଧୀମ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଲଞ୍ଜର ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଥିବା ପରିରେ ଧଳା ଅଂଶ ଥାଏ ଓ ଉଡ଼ୁଥିଲବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ । ଗାନ୍ଧୀମ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଜାତି ପକ୍ଷୀ ବେଶ୍ ପରିଚିତ । ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା କଳାମୁଣ୍ଡି ଗାନ୍ଧୀମ ପକ୍ଷୀ (Blackheaded Bunting) ଓ ଅନ୍ୟଟି ଲାଲମୁଣ୍ଡି ଗାନ୍ଧୀମ ପକ୍ଷୀ (Redheaded Bunting) (ବର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର 101) । ଏମାନଙ୍କର

ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଯଥାକ୍ରମେ ‘ଏମ୍ବେରିଜା ମେଲାନୋସେଫାଲ’ (*Emberiza melanocephala*) ଓ ‘ଏମ୍ବେରିଜା ଟ୍ରୁନିସେପ୍ସ’ (*Emberiza truniceps*) । ହିନ୍ଦୀରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ପକ୍ଷୀକୁ ଗାନ୍ଧାମ ବୋଲି କହନ୍ତି । ବର୍ଣ୍ଣ-  
 ଚକ୍ରରେ ଦୁଇ ଜାତି ଅଣ୍ଟିର ପକ୍ଷୀର ଚକ୍ର ଦିଆଯାଇଛି । ଏ ଦୁଇ ଜାତି ପକ୍ଷୀ  
 ଘରଟିଆଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼ ଏବଂ ଆମ ଦେଶକୁ ଶୀତକାଳରେ ଆଗନ୍ତୁକ ପକ୍ଷୀ-  
 ଭାବେ ଆସିଥାନ୍ତି । ମାଛ କଳାମୁଣ୍ଡି ଗାନ୍ଧାମର ପିଠି ପାଖ ହଳଦିଆ-ବାଦାମୀ; ମାଛ  
 ମାଛ ଲଳମୁଣ୍ଡି ଗାନ୍ଧାମର ପିଠି ପାଖ ଧୂସର-ବାଦାମୀ । ଉଭୟର ବେନ ପାଖର ବର୍ଣ୍ଣ  
 ଫିକା ହଳଦିଆ-ବାଦାମୀ ଓ ଘନ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରି  
 ମନେହୁଏ । ଶୀତ ଋତୁରେ ସେମାନେ ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାନ୍ତି ।  
 ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଦୁଇ ଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଥାନ୍ତି । ମଝିରେ ମଝିରେ  
 ବୁଢ଼ା ଓ ବାବୁଲ ଗଛର ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା ଶୁଷ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।  
 ପାଚିଲ ଜହ୍ନା (*Jowar*), ଗହମ, ବାଜରା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ  
 କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ‘ବାଦଲ’ (*cloud*) ପରି ଆସି ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ  
 ଅନେକ ସମୟରେ ଏସବୁ ଫସଲର ବେଣ୍ଟ କିଛି କ୍ଷତି କରନ୍ତି । ଫସଲକୁ କାଟି  
 ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେନାହିଁ । ସେସବୁ କଟା ହୋଇ ଜମା  
 ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ସେମାନେ ଟୁଙ୍କ ଲଗନ୍ତି । ଫସଲକୁ ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇ  
 ଉଠାଇ ନେଲେ ଯାଇ ରକ୍ଷାମିଳେ । ବାବୁଲ ଗଛର ଘନ ସବୁଜ ପତ୍ରର ପଟ୍ଟୁମିରେ  
 ମେସା ମେସା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହଳଦିଆ ଗାନ୍ଧାମ ପକ୍ଷୀ ଦୂରରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଫୁଲ ପରି  
 ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବାସ୍ତବିକ ଚମତ୍କାର । ଶୀତଋତୁରେ ଆମ  
 ଏଠାରେ ଥିଲାବେଳେ ଗାନ୍ଧାମ ପକ୍ଷୀମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରପ କରନ୍ତି ।  
 ତାହା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥିଲାବେଳେ ଘରଟିଆମାନଙ୍କ ପରି ଏକପ୍ରକାର ସଙ୍ଗୀତମୟ, ବର୍ଷ  
 କେତେକ ପରିମାଣରେ ଶୋକାବହ ‘ହୁଇହୁ’ ଶବ୍ଦ । କଳାମୁଣ୍ଡି ଗାନ୍ଧାମ ପକ୍ଷୀ ଆମ  
 ଦେଶ ବାହାରେ, ପଶ୍ଚିମ-ଏସିଆ ଓ ପୂର୍ବ-ସୁଭୋପରେ ମାଡ଼ ରଚନା କରିଥାଏ ।  
 ଲଳମୁଣ୍ଡି ଗାନ୍ଧାମର ନିକଟତମ ମାଡ଼ ରଚନା କରିବା ସ୍ଥାନ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନର  
 ବେଲୁଚିସ୍ତାନ । ଏହାର ମାଡ଼ କପ୍ ପରି । ଏହା ଅନାବନା ଗଛର ଡେମ୍ଫ ଓ ତଳୁରେ  
 ଢିଆର ହୋଇଥାଏ ଓ ସେଥିରେ ଛେଲିର ଲେମ୍ପ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଥିରକେ ସାଧାରଣତଃ  
 ପାଞ୍ଚଟି ଅଣ୍ଡା ହୁଏ । ଅଣ୍ଡାର ବର୍ଣ୍ଣ ଫିକା ସବୁଜ-ଆସିଆ ଧଳା । ତା’ ଉପରେ  
 ଘନ ବାଦାମୀ, ଫିକା ମାଲ ଓ ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣର ଛଟା ଓ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଦାଗ ପଡ଼ିଥାଏ ।

## ଶବ୍ଦ ସୂଚୀ

ଅ	ଏପୋପିଡ଼ି
ଅଙ୍କ	ଏମ୍ବେରିଜଡ଼ି
ଅବାବଲ	ଏର
ଆ	ଏଲଡ଼ିଡ଼ି
ଆନସେରଫରମିସ୍	କ
ଆଫ୍ଟିକା	କଜଳପାତ
ଆରଡେଇଡ଼ି	କକ୍ଷୁକପାତା
ଆରବ	କଣ୍ଡାଲ
ଆରଷ୍ଟଟଲ	କନକ ଚଢ଼େଇ
ଆଲସିଡ଼ିନଡ଼ି	କନକ ଚମ୍ପା
ଆଲି, ସାଲିମ	କପୋତ
ଇ	କରକର ଚଢ଼େଇ
ଇଗଲ	କରଭିଡ଼ି
ଇରେନଡ଼ି	କର୍ମୋରାଣ୍ଟ
ଉ	କଳାଗୁଟ୍
ଉପୁପିଡ଼ି	କଳାଡ଼ିଉର
ଉଲ୍ଲୁକ	କଳାଡ଼ିଉର
ଓ	କଳାମୁଣ୍ଡି ଗାଦାମ
ଓଟିଡ଼ିଡ଼ି	କଳାମୁଣ୍ଡି ମାଛଖିଆ
ଓଟପକ୍ଷୀ	କଲ୍ଲୁମ୍ବି ଫରମିସ୍
ଓଟ୍ସ	କଲ୍ଲୁମ୍ବିଡ଼ି
ଏ	କପର ଲଟୋର
ଏକ୍ସପିଟିଡ଼ି	କମ୍ବର
ଏପୋଡ଼ିଫରମିସ୍	କା'ଆମ

କାଆଁ ଶ	କେମି ଫେଜଡ଼	
କାଉ	କେରକେରା	
କାଉଡ଼ିଆ	କେଶର-ପାଣ୍ଡିଆ	
କାଉ, ଡାମରା	କେଶର	
କାଉ, ପବଢ଼ିଆ	କୋଇଲି	
କାଉଆ ହରଡ଼	କୋକିଳ	
କାଜ	କୋଡ଼ଲୁଖାଇ	
କାଠଫୋଡ଼ା	କୋଠପାରା	
କାଠହଣା	କୋରୁସିଡ଼ି	
କାଠହଣା, ମରହଟ୍ଟା	କୋରୁଟିଆ ବାଜ	
କାଠହଣା, ସୁନାପିଠିଆ	କୋଷ	
କାପିଟୋନଡ଼ି	କୁଂବା	
କାପ୍ତା	କ୍ପାନ	
କାପ୍ତିମୁଲଗିଡ଼ି		ଖ
କାପ୍ତିମୁଲଗିଫରମିସ	ଖରହଂସ	
କାରୁଡ଼ି ଫରମିସ	ଖଞ୍ଜନ	
କାଲପେରୁ	ଖୁଦ୍‌ଦିଆ	
କାଲି ଝାଲେଇ		ଗ
କାଶ୍ମୀର ଭରଦ୍ବାଜ	ଗଦ	
କାଶ୍ୟ ଚଢ଼େଇ	ଗଙ୍ଗେଇଡ଼ୁବି	
କିଳକିଳା	ଗଙ୍ଗା ଚଢ଼େଇ	
କୁଆ	ଗାଈ ଗୁଡ଼ି ବଙ୍କ	
କୁଓଁ	ଗାନ୍ଧାମ ପକ୍ଷୀ	
କୁକୁଲିଫରମିସ	ଗାଲିଫରମିସ	
କୁଣ୍ଡାଖାଇ	ଗିନି କୁକୁଡ଼ା	
କୁମୁଟି	ଗିଧ	
କୁମୁଟିଆ	ଗିର୍ୟ	
କୁଲୁଙ୍ଗ	ଗୁଞ୍ଜନ ପକ୍ଷୀ	

ଗୁଣ୍ଡୁରି  
ଗୁଣ୍ଡାଲ ବଣି  
ଗୁଣ୍ଡିଆ  
ଗେଣ୍ଡାଲିଆ  
ଗୋଠ କୁକୁଡ଼ା  
ଗୋବର  
ଗୋଲ ପାବ  
ଗୋଲପି ମଇନା  
ଗୃହ ଗୁଡକ  
ଗୁଇଡ଼ି  
ଗୁଇଫରମିସ

ଘ

ଘରଚଟିଆ  
ଘାଗୁସ ପୁଣ୍ଡୁକି  
ଘୁକାଲିକା

ଚ

ଚକା ଚଢ଼େଇ  
ଚକୁଆ  
ଚକୁଆ-ଚକୋଇ  
ଚଟକ  
ଚଟିଆ ପକ୍ଷୀ  
ଚଟିଆ-ବାବୁଇ  
ଚନକ୍-ଚନା ପୁଣ୍ଡୁକି  
ଚନ୍ଦନା  
ଚନ୍ଦନ  
ଚନ୍ଦା ପକ୍ଷୀ  
ଚମସା ଗାଈ  
ଚମ୍ପା

ଚରଚର  
ଚଣା ପକ୍ଷୀ  
ଚୁ' ଚଢ଼େଇ  
ଚୁଞ୍ଚି  
ଚୁଟ୍ ପକ୍ଷୀ  
ଚୁଣ୍ଡି ଖାଲ  
ଚୁଡକ  
ଚୁମଚ ଗୋଜା  
ଚୁମଚ ଦାଡ଼  
ଚୁରୁଡ଼ି  
ଚିହିତ-ହୋଷ୍ଟ

ଚିଲ  
ଚିଲ୍ ଚିଲ୍  
ଚିପକା  
ଚିଲିଆ  
ଚିଲିଆ ବଗ  
ଚେରଲ

ଛ

ଛୁସୁବାସୀ ଚରଚର  
ଛେଟ କାଣ୍ଡିଆ ବଗ  
ଛେଟ ସିନ୍ଧୁରମୁଣ୍ଡି  
ଛେଟ ସୁନ୍ଦରୀ  
ଛେଟ ହାଡ଼ଗିଲା

ଜ

ଜଙ୍ଗଲ ସୁନ୍ଦରୀ  
ଜଙ୍ଗଲ କୁକୁଡ଼ା  
ଜଳଗୁଡକ  
ଜାକାନିଡ଼ି



କାରଡ଼ନ	ଡକେଇଡ଼ି	
କାରିଆ		ଡ
କୋଷ୍ଠେସ୍‌ପିଡ଼ି	ଡୁବେନ୍	
	ଡୋଡ଼	
କଲିଆ ବଙ୍କ		ଡ
	ଡିରିର	
ଟାଇସ୍‌ହାର ସଞ୍ଜ	ଡିରିରି	
ଟାକି	ଡିଲେର ପକ୍ଷୀ	
ଟିଆ	ଡୁଡ଼ି	
ଟିକି ଚଢ଼େଇ	ଡୁରୁମ୍‌ଡ଼ି	
ଟିକେଲ ଫୁଲ୍‌ଗୁଣି	ଡେଲିଆ ବାରମାସୀ	
ଟିକ୍‌ଉ	ଡୋଡ଼ା	
ଟିଅଇ		ଧ
ଟିନଥୁନ	ଧେସ୍‌କିଓରନଥୁଡ଼ି	
ଟିମାଲ୍‌ନା		ଧ
ଟିହା	ଦକି ଟିକି ଚଢ଼େଇ	
ଟୁରୁଡ଼ିନ	ଦଦରାହଣା	
ଟେଟେଇ	ଦୟାଲ	
ଟେଣ୍ଡେଇ	ଦଳଫିର୍	
ଟେପେଇ	ଦହଗିଲ	
ଟେସ୍‌କେଡ଼ି	ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲ୍‌ବର୍	
	ଦାର୍ଦ୍‌ଚସ୍‌ ଶାଗୁଣା	
ଠେଙ୍ଗା	ଦୁଷ୍ଟ	
	ଦେଉଳିଆ ପାଗ	
	ଦେଶୀ ବଣି	
ଡାଇବ୍‌ରିଡ଼ି		ଧ
ଡାମର କାଉ	ଧଳା ଖଞ୍ଜନ	
ଡାଲ ଚମ୍ପା	ଧଳାଗାଲ ବୁଲବୁଲ	
ଡାହୁକି		

ଧଳାପେଟିଆ କଜଳପାତ  
ଧଳା ଭୂରୁ ନାରୁଣୀ ପକ୍ଷୀ  
ଧଳା ଲତୋରା  
ଧନେଶ  
ଧୋବକାଙ୍କ  
ଧୋବ ଚମ୍ପା

ନ

ନଦୀ ଭୂବେନ୍  
ନନ୍ଦୀ ବର  
ନବରଙ୍ଗୀ  
ନାରୁଣୀ ପକ୍ଷୀ  
ନାହାକା ଶୁଆ  
ନିଶା ବକ  
ନୀଳକଣ୍ଠ ସିନ୍ଧୁରମୁଣ୍ଡ  
ନୁନ୍ଦରୁନ୍ ନି  
ନେକ୍ଟାରିନଡ଼

ପ

ପଙ୍କା  
ପଣ୍ଡା ହଂସ  
ପଥୁରୁଆ ଝାଟି ପୁଣ୍ଡୁକ  
ପବ୍‌ଡିଆ କାଉ  
ପରା ନୀଳ ପକ୍ଷୀ  
ପାଉଁଶିଆ କଜଳପାତ  
ପାଣି କୁଆ  
ପାଣି କୁଆଳ  
ପାଣି ଡାହୁକ  
ପାଣି ହଂସ  
ପାତ କାଉ

ପାତ ହଂସ  
ପାନୁର ଝାଲେଇ  
ପାପିୟା  
ପାପିୟା-ଗୁଡକ  
ପାରା  
ପାରାବତ  
ପାରିଡ଼  
ପାସାରଫରମିସ  
ପିକ  
ପିକନୋନୋଟିଡ଼  
ପିକ୍‌ଡ଼  
ପିସିଡ଼  
ପିସିଫରମିସ  
ପୁଣ୍ଡୁକ  
ପୁଣ୍ଡୁକ, ଚନକ୍-ଚନା  
ପେଙ୍ଗୁଲିନ୍  
ପେଚକ  
ପେରୁ  
ପେରୁ ପକ୍ଷୀ  
ପେଲ୍‌କାନିଡ଼  
ପେଲ୍‌କାନିଫରମିସ  
ପୋଡ଼ିସିପେଡ଼ିଫରମିସ  
ପ୍ଲୋସେଇଡ଼

ଫ

ଫାଲ୍‌ହେ କୋରୁସିଡ଼  
ଫିକାମାଳ ମୁଷିଧାରକ ପକ୍ଷୀ  
ଫିଡା ବୁଲବୁଲ  
ଫିନ୍‌ରୁ

ଫି ନିଶିଛି ଡି  
ଫୁଲଗୁଣି  
ଫୁଲଗୁଣି  
ଫୁଟକ  
ଫେକାଣ୍ଡ ମୁରଗୀ  
ଫେଲକନଡ଼ି  
ଫେଲକନଫରମିସ  
ଫୋଏନକପଟେରିଡ଼ି

ବ

ବଗ  
ବଡ଼ କମ୍ପୋରାଣ୍ଡ  
ବଡ଼ ଖଞ୍ଜନ  
ବଡ଼ ଗୁଞ୍ଜି  
ବଡ଼ ଗୁଞ୍ଜି ଖାଇ  
ବଡ଼ ବଗ  
ବଡ଼ ବାଂଶପାତୁରି  
ବଡ଼ ହଂସରାଜ  
ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା  
ବଣି  
ବଳଦିଆ  
ବହରା  
ବାଇଗଣି ଫୁଲଗୁଣି  
ବାଇଗଣି ପିତ ଫୁଲଗୁଣି  
ବାଇଗଣି ବଗ  
ବାଦାମୀ ଗୁଟ୍  
ବାନ୍ଧୁ  
ବାବୁଇ  
ବାବୁନା

ବାୟା  
ବାରମାସୀ  
ବାଲି ଟେଣ୍ଡେଇ  
ବାଲି ଡୁରୁର  
ବାଂଶ ପାତୁରି  
ବୁରହନଡ଼ି  
ବୁଲବୁଲ  
ବୁସେରେଟିଡ଼ି  
ବେକାର  
ବେନବ  
ବୁଇଥ୍  
ବୁଇଫୋଡ଼ି

ଭ

ଭଇନ;  
ଭଦଭଦଳିଆ  
ଭରତ ପକ୍ଷୀ  
ଭରତିଆ  
ଭରଥୁଆ  
ଭରଦ୍ବାଜ ପକ୍ଷୀ  
ଭଇରା  
ଭଟ ଡିଭିର  
ଭରତିଆ  
ଭରତାୟ ଚରଚର  
ଭରତାୟ ସାଗ୍  
ଭରଥୁଆ  
ଭଲିଆଖାଇ  
ଭଲିଆ ଖାଇ ଶୁଆ  
ଭୁଇଁ ଭୁପୁଲି

ମ

କ

ମହିଆ ବଗ  
ମଦନା  
ମନ୍ତ୍ରୀ ଧାରକ ପନ୍ଥୀ  
ମାଛଖିଆ  
ମାଛରଙ୍ଗା  
ମାଟିଆ ଚଲ  
ମାଟିନ  
ମାର୍ଯ୍ୟାଲ ହୋଇଗୀ  
ମାଲବାର ବୁଲିଆ ଭରତ ପନ୍ଥୀ  
ମାହସିକାପିଡ଼ି  
ମେରୁ ମେରୋପିଡ଼ି  
ମୋଟାଥଣ୍ଡିଆ ଫୁଲଗୁଣି  
ମୋଟା ସିଲିଡ଼ି

ଯ

ୟୁରୋପୀୟ ପିକ  
ୟୁ ଡ୍ର କର୍ମୋରାଣ୍ଡ

ର

ରାଜ ପେରୁ  
ରାଜ ବଣି  
ରାଜ ମଇନା  
ରାଜ ହଂସ  
ରାଣୀ ବଗ  
ରାଜ ବଗ  
ରାବଣ  
ରାବଣ ଚଢ଼େଇ  
ରାମଗଙ୍ଗା ଚଢ଼େଇ  
ରାମା ଚଢ଼େଇ  
ରାଜିଡ଼ି

ଲଟୋର ପନ୍ଥୀ  
ଲଦମ ପାତିହଂସ  
ଲଦଡ଼ି  
ଲଲ କପୋତ  
ଲଲରୁଡ଼ି  
ଲଲ-ନିତମ୍ବ ବାବୁଇ  
ଲଲ ବାରମାର୍ଯ୍ୟା  
ଲଲମୁଣ୍ଡି ଗାନ୍ଧୀମ  
ଲିନିଆସ

ଶ

ଶଙ୍ଖଚଲ  
ଶାଗୁଣା  
ଶାଗୁଣା  
ଶାମା  
ଶୀର  
ଶୁଆ  
ଶୁକ ପନ୍ଥୀ

ଷ

ଷ୍ଟି ଜିଫରମିସ  
ଷ୍ଟୁଆଟ୍ ବେକା  
ଷ୍ଟୁରନଡ଼ି  
‘ଷ୍ଟେ ଫେଡାରସ’

ସ

ସରଗି  
ସଲ୍ଲୁରି  
ସାଇକସ ବୁଲିଆ ଭରତ ପନ୍ଥୀ  
ସାଗ୍

ସାନ କର୍ମେଶ୍ୱରୀ

ସାନ ବଗ

ସାରସ

ସାଲମ ଆଲ

ସାହାନ୍

ସିକୋନିଡ଼ି

ସିକୋନିଫରମିସ

ସିଫା ବାଳ

ସିଟା ସିଡ଼ି

ସିଟାସି ଫରମିସ

ସିଟିଡ଼ି

ସିଲୁର ମୁଣ୍ଡି

ସିଲଭନିଡ଼ି

ସୁଲ

ସୁଲଡ଼େନ୍

ସୁଲଗ

ସୁମେରୁ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଉଦ୍‌ବନ

ସୁର

ସୋର ବାୟା

ସୌଭାଗୀ ଚଢ଼େଇ

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ହଳଦୀବସନ୍ତ

ହ

ହଳଦୀନ

ହଂସ

ହଂସଗଲ

ହରଡ଼ିଆଲ

ହରଡ଼ି ଚଢ଼େଇ

ହରବା ଚଢ଼େଇ

ହଳଦି ଆଖିଆ କୁଣ୍ଡାଖାଲ

ହଳଦିଆ ଖଜୁଳ

ହଳଦିଆ ଗାଲ ଗୁମଗଙ୍ଗ । ପକ୍ଷୀ

ହଳଦୀବସନ୍ତ

ହାଡ଼ଗିଲା

ହାଡ଼ଗିଲା, ଗ୍ରେଟ

ହାଡ଼ଚଣ୍ଡି

ହରମ୍

ହମାଲୟ କମ୍ବୁର

ହମାଲୟ କଳକଳା

ହରୁନ୍‌ଡ଼ିନିଡ଼ି

ହୁକୁନା ପକ୍ଷୀ

ହୁ-ହୁ

ହେଲେନା ଗୁମଗଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ

ହୁ-ସଲର

□□□

ଅର୍ଦ୍ଧୋଲୋକ (Ornithology) ବା ପକ୍ଷୀବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରାକୃତିକ-ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ । ଆମ ଦେଶରେ ଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନୁର୍ଜାତକ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ପକ୍ଷୀ-ବିଜ୍ଞାନବିତ୍ ତତ୍ତ୍ୱର ଯାଲମ୍ ଅଲ୍ଲଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ । ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଆନୁର୍ଜାତକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଦୃତ ।

ଶ୍ରୀମତୀ ଲଲିତ୍ ଫତେଅଲ୍ଲ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ପ୍ରକୃତି-ପ୍ରେମୀ । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଣିଷ ଓ ପକ୍ଷୀମାନେ ବାସ କରପାରିଲେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । ଗ୍ରେଟ୍ ପିଲ୍ଲଙ୍କ ଲିଖିତ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକ **About Indian Birds** ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି । ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦ୍ଧି କାରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ।

**Rs. 18-25**

ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆ, ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ